



الدليل لمعالجة الأمراض الإنتانية

منتدى إقرأ الثقافي

www.iqra.ahlamontada.com



إعداد

الدكتور جبرائيل باسيل بيطار

طبيب القثطرة وتوسيع الشرايين الاكليلية

في مشفى فيشي في فرنسا

لتحميل انواع الكتب راجع: (مُنْتَدَى إِقْرَأِ النُّقَافِي)

پدای دانلود کتابهای مختلف مراجعه: (مُنْتَدَى إِقْرَأِ النُّقَافِي)

بۆدابهزاندهی جوهرها کتیب:سەردانی: (مُنْتَدَى إِقْرَأِ النُّقَافِي)

www.iqra.ahlamontada.com



www.iqra.ahlamontada.com

للكتيب (كوردی , عربي , فارسي)

الدليل لمعالجة
الأمراض الإنتانية

الدليل لمعالجة الأمراض الإنتانية

إعداد

الدكتور جبرائيل باسيل بيطار

طبيب القنطرة وتوسيع الشرايين الاكليلية

في مشفى فيشي في فرنسا



الدار العربية للعلوم - ناشرون
Arab Scientific Publishers, Inc. SAL

يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأي وسيلة
تصويرية أو إلكترونية أو ميكانيكية بما فيه التسجيل الفوتوغرافي
والسجل على أشرطة أو أقراص مقروءة أو أي وسيلة نشر أخرى
بما فيها حفظ المعلومات، واسترجاعها دون إذن خطي من الناشر

الطبعة الأولى

1428 هـ - 2007 م

ردمك 978-9953-29-393-6

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف



توزيع

الدار العربية للعلوم - ناشرون ش.م.ل

Arab Scientific Publishers, Inc. s.a.l

عين التينة، شارع المفتي توفيق خالد، بناية الريم

هاتف: 786233 - 785108 - 785107 (961-1)

ص.ب: 5574-13 شوران - بيروت 2050-1102 - لبنان

فاكس: 786230 (961-1) - البريد الإلكتروني: asp@asp.com.lb

الموقع على شبكة الإنترنت: http://www.asp.com.lb

التقسيط وفرز الألوان: أبجد غرافيكس، بيروت - هاتف 785107 (9611)

الطباعة: مطابع الدار العربية للعلوم، بيروت - هاتف 786233 (9611)

محتويات الكتاب

الجزء الأول: الانتانات حسب توضّعها

1. تعريفات 9
2. تجرثم الدم 11
3. الصدمة الإنتانية 17
4. التهاب شغاف القلب الإنتاني 24
5. طريقة العلاج العملية أمام التهاب السحايا الحاد 36
7. التهابات القصبات والرئة الشائعة 56
8. التهاب التأمور الإنتاني 69
9. الإسهالات الإنتانية الحادة 73
10. الإنتانات الهضمية 77
11. الإنتانات التناسلية والأمراض المنتقلة عن طريق الجنس 83
12. الإنتانات البولية 91
13. الإنتانات الجلدية 102
14. إنتانات الأجزاء الرخوة 111
15. أمراض الغدد للمفاوية الإنتانية 115
16. الإنتانات المنتقلة بواسطة التلقيح الجرثومي 121
17. الإنتانات العظمية المفصليّة 127
18. انتانات الأذن والأنف والحنجرة 135
19. الإنتانات الفموية السنية 148
20. الإنتانات العينية 157

الجزء الثاني: الانتانات حسب مسببها

21. الإنتانات العائدة لعصيات غرام السلبية 163
22. الإنتانات الشديدة العائدة للمكورات العنقودية 171
23. الإنتانات الشديدة العائدة للمكورات العقدية والمكورات المعوية 176
24. داء السل 181
25. التهاب الكبد الإنتاني 187
26. الإنتانات بفيروس الحلأ (العقيل) 201
27. الإنتان بفيروس الـ VIH تناذر عوز المناعة المكتسب الإيدز، السيدا 212
28. الأمراض العائدة لعوامل قابلة للانتقال غير مألوفة (ATNC). الإجراءات الوقائية في المشافي 236

الجزء الثالث: الانتانات وبعض الحالات الخاصة

29. الإنتانات النوزوكوميالية 242
30. الأسلحة البيولوجية الإرهابية 268
31. حوادث التعرض للدم وللوسائل البيولوجية 274
32. المعالجة الوقائية بالصادات الحيوية للحالات الجراحية 281
33. الإنتانات الشائعة عند المدمن على المخدرات 293
34. الإنتانات عند الأشخاص ناقصي الكريات البيض 296
35. الإنتانات والأعضاء المزروعة 300
36. الإنتانات عند مثبطي المناعة 302
37. الحمى والحمل 306
38. الحمى الحادثة عند العودة من سفر إلى بلاد ذات مستوى صحي منخفض 316

الجزء الرابع: المضادات الإنتانية

39. الصادات الحيوية: قواعد الاستعمال 330
40. المضادات الإنتانية وتداخلات تفاعلات الأدوية فيما بينها 338
41. الصادات الحيوية والمضادات الفيروسية 350
42. الأدوية المضادة للفظور ومعالجة الأمراض الفطرية 363
43. الأدوية المضادة للطفيليات 337
44. مضادات الالتهاب والأمراض الإنتانية 383
45. المطهرات Les antiseptiques 386
46. العناية الصحية والحجر الصحي 389
47. اللقاحات 398

1. تعريفات

1. الحمى:

تعرف الحمى بأنها ارتفاع في درجة الحرارة المركزية، بحيث تتجاوز الـ 37.5 درجة صباحاً و37.8 درجة مساءً، وذلك عند شخص في وضعية الراحة منذ ربع ساعة على الأقل، وصائم منذ ساعتين على الأقل. هذا ونقيس الحرارة الطبلية عادة، مع العلم أن الحرارة المأخوذة بواسطة الطريق الإبطي أو الفموي (مفضلة على الطريق الشرجي) تكون أعلى بنصف درجة من الحرارة المركزية.

الحمى بحد ذاتها بغض النظر عن سببها يمكن أن تكون خطيرة:

- عند الرضيع والطفل الذي لم يتجاوز الأربع سنوات: خطورة حدوث اختلاجات ناتجة عن فرط الحرارة وخطورة حدوث تجفاف.
 - عند الشيوخ: خطورة التجفاف، واضطرابات نفسية.
 - عند المصاب بأفة ما كامنة، حيث أن فقد المعاوضة الناتج عن الحرارة يمكن أن يجعل هذه الأفة أشد خطورة من المرض الإنتاني المسبب.
- هذا ومهما يكن عمر المريض، فإن الحرارة يمكن أن تكون العرض الأول لإنتان يمكن أن يتطور فيما بعد بشكل مهدد للحياة: لذلك يجب معرفة علامات الخطورة والبحث عنها، ومعرفة تقويم درجة الإسعاف: حالة المريض السابقة والصورة السريرية تساهمان في تقويم خطورة الحرارة.

2. تصنيف الأمراض الكامنة السابقة الوجود:

تصنيف ماك كاب Mac Cabe هو الأكثر استعمالاً:

- أمراض غير مميتة: مريض لا يحمل أي مرض سابق أو حامل لمرض سابق غير مميت مثل: فرط التوتر الشرياني المسيطر عليه، داء السكري الغير متعلق بالأنسولين، التهاب قصبات مزمن غير مؤثر على وظائف التنفس...

- أمراض تحمل خطورة حصول وفاة بعد فترة متوسطة: مريض مصاب بمرض يمكن أن يؤدي إلى الوفاة خلال 5 أعوام مثل: التهاب القصبات والرئة الساد المزمن، تشمع الكبد المعاوز، قصور الشرايين الإكليلية ذو الشدة المتوسطة والثابت.
- أمراض تحمل خطورة حصول وفاة بعد فترة قصيرة: مريض حامل لمرض سابق مميت خلال 6 أشهر مثل: اعتلال العضلة القلبية أو تشمع الكبد الغير معاوزين، التهاب القصبات والرئة الساد المزمن مع نقص كبير في أوكسجين الدم وقصور البطين الأيمن، نقص المناعة المزمن (السيدا في مرحلتها الأخيرة)، سرطان منتشر،...

3. تعريف الحالات الإنتانية:

1. الإنتان: هو النتيجة لمهاجمة عضو ما من قبل جرثومة، فيروس، طفيلي أو فطر. تجرثم الدم يترجم وجود جراثيم حية في الدم. هنا وإننا نصف بنفس الطريقة وجود فيروسات، فطور طفيليات أو عوامل ممرضة أخرى (تفريس الدم، تقطر الدم، إلخ...).
2. تناذر رد الفعل العام على الالتهاب: هو عبارة عن رد الفعل العام على بعض الالتهابات التي شكل اعتداءات سريرية خطيرة: التهاب البنكرياس الحاد، نقص التروية، الرضوض المتعددة، الصدمة النزفية، الأمراض الجهازية، هذا التناذر يتميز بوجود علامتين على الأقل من العلامات التالية:

- حرارة الجسم $>38^{\circ}$ أو $<36^{\circ}$.
- نظم القلب <90 دقة/دقيقة.
- نظم التنفس <20 /دقيقة أو فرط التنفس مترجم بـ $\text{PaCO}_2 < 32$ مم زئبقي ($\text{Kpa } 4.3$) في الهواء الطلق.
- الكريات البيض $<12000/\text{مم}^3$ أو أقل من $4000/\text{مم}^3$ أو $<10\%$ من الخلايا غير ناضجة (وذلك في غياب أسباب معروفة أخرى).



3. الحالة الإنتانية: هي عبارة عن الجواب الالتهابي العام لإنتان ما. يوصف مثل وصف تتأخر رد الفعل العام على الالتهاب (أنظر سابقاً). السبب الإنتاني لهذه الحالة يجب أن يشخص على الأقل سريريا.

4. الحالة الإنتانية الخطرة: هي عبارة عن حالة إنتانية مترافقة مع قصور عضوي، نقص في الضغط أو نقص في التروية.

- نقص الضغط يوصف عادة بـ $\text{BPN} < 90$ مم زئبقي أو هبوط قدره 40 مم زئبقي على الأقل لأرقام الضغط العادية عند المريض وذلك في غياب أسباب أخرى معروفة لهبوط الضغط (أدوية خافضة للضغط، صدمة قلبية).

- نقص التروية يترجم عادة، ولكن ليس بشكل حصري، بحماض لبني، شح البول، اضطراب شديد في الوعي.

5. الصدمة الإنتانية: هي عبارة عن حالة إنتانية مترافقة مع هبوط مستمر في الضغط، بالرغم من ملئ وعائي مناسب من الناحية النوعية والكمية، مترافق أو لا مع علامات نقص التروية. المرضى المعالجين بأدوية مقوية للانقباضية القلبية أو مقلدة للأوعية يمكن أن يكون ضغطهم طبيعياً، ولكن علامات نقص التروية تكون موجودة، هؤلاء المرضى يعتبرون كمصابين بصدمة إنتانية.

هذا وفي حالة وجود حالة إنتانية خطيرة أو صدمة إنتانية، فإن وضع المريض في المشفى في وحدة العناية المشددة يعتبر القاعدة التي يجب اتباعها.



2. تجرثم الدم

يعرف تجرثم الدم بوجود جراثيم في الدم. هذا ويجب طرح هذا التشخيص أمام كل تناذر إنتاني واضح (حرارة مرتفعة وقشعريرة) مع العلم أن هذا التناذر غير ثابت. تحقيق زرع الدم في شروط جيدة (جدول 1) يسمح بتأكيد التشخيص.

حال تحقيق زرع الدم (وأخذ العينات) فإنه يجب البدء بمعالجة مناسبة بواسطة الصادات الحيوية وذلك في الحالات التالية:

- عند تشخيص مكان الإنتان الأولي (جدول 2 و4).
- أمام وجود علامات خطورة (أنظر الفصل الأول).
- أمام وجود عاهة كامنة (جدول 3 و4) وذلك لتجنب تطور محتمل نحو حالة إنتانية خطيرة أو صدمة إنتانية (تطور أكثر شيوفاً في حالة الإصابة ببعض العضويات كعصيات غرام \ominus).

هذا ويجب معالجة فوهة دخول الجرثوم والتوضعات الثانوية (تفجير، جراحة)، والعوامل المسهلة لحدوث الإنتان.

في حالة وجود زرع دم إيجابي، يؤكد تشخيص تجرثم الدم. عزل ومعرفة الجرثوم يسمح إما بإعادة تقويم المعالجة السابقة بالصادات الحيوية أو بوصف معالجة مناسبة وذلك في حالة عدم وجود معالجة سابقة.

سلبية زرع الدم لا تسمح بنفي تشخيص تجرثم الدم، المعالجة بالصادات الحيوية تتلخص بمعالجة بؤرة إنتانية محتملة.

متابعة العلاج:

الإنذار الفوري لتجرثم الدم مرتبط بخطورة حدوث صدمة إنتانية، مما يفرض مراقبة صارمة (نظم القلب، الضغط الشرياني، كمية البول، نظم التنفس). تقويم فعالية المعالجة بواسطة الصادات الحيوية يكون سريرياً (مراقبة منحى الحرارة، زوال الحمى خلال 3 - 5 أيام، ومراقبة الحالة العامة، فوهة

دخول الجرثوم، والتوضعات الثانوية) وبيولوجياً (الفحوص المخبرية الخاصة بالالتهاب).

استمرار وجود ارتفاع الحرارة يتطلب:

- التأكد من تطور الإنتان (تكرار زرع الدم وأخذ عينات من الأماكن المصابة بالإنتان، مراقبة تعداد الكريات البيض والفحوص البيولوجية الخاصة بالإنتان، البحث عن توضعات ثانوية جديدة للإنتان وقليلة الحساسية للصادات الحيوية).
- التأكد من أن اختيار الصاد الحيوي سليم: تطابقه مع الحساسية داخل الزجاج (اختبار التحسس الجرثومي للصادات الحيوية، التركيز المثبط الأصغر) الجرعة وعدد مرات إعطائه في اليوم، انتشاره في مكان الإنتان. ومن المفيد في بعض الأحيان معايرة الصاد الحيوي في الدم.
- البحث عن حصول اختلاطات عائدة للمعالجة (التهاب متوضع على القثطرة أو أي إنتان أصيب به في المشفى - نوزوكوميالي -، عدم تحمل دوائي) أو سبب غير إنتاني (خثرة وريدية).
- مدة المعالجة بالصادات الحيوية تتراوح بين 10 - 15 يوماً. وهي أكثر طولاً في حالة كون المريض ذو حالة عامة سيئة (ناقص المناعة)، أو في حالة توضعات ثانوية معينة (التهابات العظم والمفاصل، التهاب شغاف القلب) أو حسب طبيعة العامل المسبب للالتهاب (متعددة المقاومة).

جدول 1 - كيفية القيام بزرع الدم

-
- متى يجب وصف زرع الدم؟
-
- حرارة $> 38^{\circ}\text{C}$ / مغ/أو قشعريرة تجعلنا نشك بوجود إنتان جرثومي.
 - انخفاض في درجة الحرارة.
 - حالة إنتانية شديدة أو صدمة إنتانية.
 - حمى منذ فترة طويلة من دون سبب واضح.
- يجب وصف 2 - 3 زروع دم بفواصل قدره 30 - 60 دقيقة بين الواحد والآخر (من المفضل القيام بالزرع عند كون الحرارة في قمته).

كيف تسحب العينة لزرع الدم؟

- احترام الاحتياطات الأساسية.
- تطهير جلدي بواسطة مواد يودية أو كلورهيكزدين كحولي (توضع لمدة 30 ثانية قبل تحقيق سحب الدم).
- بزل وريدي: يجب تجنب سحب الدم بواسطة القططرة إلا إذا كان هناك شك بوجود إنتان على هذه القططرة مترافق بنفس الوقت بزراعة دم محيطية.
- حقن العينة مباشرة في جهاز معد لزراعة الدم (جاو على راتين خاص بالصادات الحيوية، هذا إذا كان المريض قد عولج سابقاً بهذه الصادات: جهاز بكتيك Bactec). بعض العضويات الممرضة الخاصة (فطور، أو جراثيم فطرية) تعزل بشكل أفضل على أجهزة خاصة (إيزولاتور Isolator).
- سحب 20 مل على الأقل (من أجل تمديد قدره الأعظمي 10/1 من وسط الزرع).
- يجب وضع العينة المسحوبة في زجاجتين: هوائية وغير هوائية.

كيف نفهر نتائج زرع الدم؟

- بعض العضويات المجهرية تكون دائماً مرضية. المكورات العنقودية الذهبية، الجراثيم المعوية، عصبية القليح الأزرق، المكورات الرئوية، المبيضة البيضاء Candida Albicans.
- البعض الآخر هي نتيجة تلوث: المكورات العنقودية البشروية، كورنيباكتيريا سيبسيا، عصيات سيبسيا، بروبيونيكتيريوم. الأمراض لا يمكن تأكيدها في هذه الحالات إلا في حال وجود زراعتي دم إيجابيتين على نفس العضوية المسببة، ومتطابقتين مع الحالة السريرية (عند الخدج، أو في حال وجود أدوات دخيلة).

جدول 2 - الجرثوم المحتمل حسب العضو المصاب

العضو المصاب	الجرثوم المحتمل	العوامل المؤهبة
الجلد	المكورات العنقودية المكورات العقدية	جرح، حرق، نقص تروية قئطرة وريدية، إبرة (المدمن على المخدرات)
الأنبوب الهضمي	الجراثيم المعوية المكورات العقدية D المكورات المعوية، اللاهوائيات	ورم، رتج ارتفاع التوتر الباهي، جراحة
الطرق الصفراوية	الجراثيم المعوية المكورات المعوية، اللاهوائيات	حصيات، قئطرة بالطريق الراجع، جراحة
الرئة	المكورات الرئوية الكليبيلا الرئوية	الكحوليين، الشيوخ، المدخنين
شغاف القلب	المكورات العقدية المكورات المعوية المكورات العنقودية	المرض الدسامي، التداخل السني قئطرة وريدية، إبرة (المدمن على المخدرات)

الطرق البولية	الجراثيم المعوية (العصيات الكولونية) البسودوموناس	عائق في المجرى البولي، تدخل بواسطة أدوات، قنطرة بولية دائمة، حمل، جراحة
الأوعية	المكورات العنقودية عصيات غرام \ominus المكورات العنقودية	تغذية بواسطة الوريد، قنطرة وريدية وشرائية، إبرة (المنمن على المخدرات)

جدول 3 - الجرثوم المحتمل حسب الشخص المصاب وحالته

الجرثوم المحتمل	حالة المصاب
المكورات العنقودية، المكورات المعوية، الجراثيم المعوية، المكورات العنقودية	انعدام الكريات المحببة لفترة قصيرة
المكورات العنقودية، المكورات العنقودية، المكورات المعوية، الجراثيم المعوية، البسودوموناس	انعدام الكريات المحببة الشديد والطويل المدة
المكورات الرئوية، هيروفيلوس أنفلونزا، الجراثيم المعوية	طحال مستأصل أو انعدام الطحال
المكورات الرئوية	الورم النقوي
المكورات العنقودية، البسودوموناس، المبيضات البيض	المنمن على المخدرات
السالمونيلا	سفر قريب خارج فرنسا، أمراض في الهموغلوبين
المكورات الرئوية، الجراثيم المعوية	الكحوليين
المكورات العنقودية، المكورات الرئوية، الجراثيم المعوية	الداء السكري
المكورات الرئوية، السالمونيلا، المكورات العنقودية	VIH
الجراثيم المتعددة المقاومة	الإنتان المنقول في المشفى (نوزوكوميال)

جدول 4 - المعالجة الاحتمالية بالصادات الحيوية حسب الجرثوم

المسبب وفي حال وجود بؤرة إنتانية بدنية

الجرثوم المسبب	الصاد الحيوي المقترح	الصاد الحيوي البديل
المكورات العنقودية (الشائعة)	بنيسيلين M	سيفالوسبورين ج
	في حال إنتان خطير: + جنتاميسين أو نيتيلميسين	أو أفلووروكينولون \pm حمض الفوسيديك أو الريفاميسين]]
المكورات العنقودية (المصاب بها في المشفى)	[غليكوبينيد + جنتاميسين أو فوسفوميسين أو حمض الفوسيديك أو ريفاميسين]]	[سيفوتاكسيم + فوسفوميسين] أو لينزوليد أو اينوبريستين - والفوريسين
المكورات الرئوية	أمينوبينيسيللين داخل الوريد	غليكوبينيد (في حال التحسس)

(ما عدا التهاب السحايا)	في حال إثنان خطير:
المكورات السحائية	سيفترياكسون أو سيفوتاكسيم جرثوم غير مقاوم: متابعة العلاج بالأمينوغليكوسايد
المكورات العقدية غير الـ D	أمينوبنسيللين في حال إثنان خطير: + أمينوزيد
المكورات العقدية D المكورات المعوية	[أمينوبنسيللين + جنتاميسين أو نتيليميسين]
الجراثيم المعوية (الشائعة)	في حال غياب علامات الخطورة: معالجة بصاد حيوي وحيد سيفالوسبورين جيل 3 أو فلوروكينولون أو آزتريونام في حال حالة إثنائية شديدة: معالجة بصادين حيويين: أحدهما سيفالوسبورين ج3 الفلوروكينولون، أمينوزيد
سالمونيللا سيبسيا الجراثيم المعوية (المصاب بها في المشفى) البسودوموناس أيروجينوزا (الشائعة، مقاومة للتيتارسيللين)	فلوروكينولون سيفترياكسون [سيفيديم أو سيفيروم أو إيميبينيم أو بيبيراسيللين - تازوباكتام] + أميكاسين أو إيسياميسين]] [تيتارسيللين أو بيبيراسيللين] + أميكاسين أو إيسياميسين]] أو إيزياميسين]]
بسودوموناس إيروجينوزا (نوزوكومالية، مقاومة للتيتارسيللين)	[سيفتازيدين أو بيبيراسيللين - تازوباكتام أو سيفيديم أو إيميبينيم أو آزتريونام] + (أميكاسين أو إيزياميسين)]
أسينيتوباكتر بوماني الجراثيم اللاهوائية (عصيات غرام السلبية)	[إيميبينيم + (أميكاسين أو إيسياميسين) ± سولباكلام] إيميدازول (إذا لم تكن مغطاة بصاد حيوي موصوف سابقاً) الببتاكتاماز أو بيبيراسيللين - تازوباكتام أو [إيميبينيم]
علامات خطيرة من دون فوهة التهابية أولية ظاهرة (شائعة)	[سيفوتاكسيم أو سيفترياكسون] + جنتاميسين أو نتيليميسين]
علامات خطيرة من دون بؤرة أولية ظاهرة (نوزوكومالية)	[سيفيديم أو سيفيروم] + (أميكاسين أو إيزياميسين) + غليكوبينيد]

3. الصدمة الإنتانية

تعريف الصدمة الإنتانية يتضمن: إصابة إنتانية مؤكدة على الأقل سريرياً، ضغطاً شريانياً انقباضياً >90 مم زئبقي (أو هبوط الضغط الشرياني أكثر من 40 مم زئبقي مقارنة مع قيمته العادية سابقاً)، بالرغم من ملئ وعائي مناسب من الناحية النوعية والكمية. بالإضافة إلى ذلك يوجد نقص في التروية الخلوية (حمض لبنى، نقص كمية البول، اضطراب حاد في الوعي،...) استمرار هذه الصدمة يؤدي إلى تفاقم الحالة الهيموديناميكية الذي ينتهي في بعض الحالات بحصول تنذر القصور المتعدد الأعضاء. الانتقال من الحالة الإنتانية إلى حالة الصدمة يمكن أن يحصل في أية لحظة؛ ولهذا فإنه من الضروري معالجة حالة الإنتان الخطير بصورة مبكرة. خطورة الصدمة تعود إلى الفوعة الإمراضية للمسبب وإلى حالة المريض العامة (الوراثة، المناعة).

التشخيص للصدمة

أعراض الصدمة الإنتانية غير وصفية نسبياً، بالإضافة إلى هبوط الضغط الشرياني المعروف سابقاً، توجد بعض العلامات الصغيرة التي يجب أن تجلب الانتباه: الترافق ما بين علامات عصبية، قلبية، وعائية وتنفسية يجب أن نقود إلى التشخيص (جدول 1).

جدول 1 - أعراض الصدمة الإنتانية

عصبية	قلبية وعائية	تنفسية
قلق	هبوط الضغط	تسرع التنفس الذي يمكن أن
تخليط	علامات نقص التروية:	يقود إلى التعب، الإنهاك،
اضطرابات في التصرف	- أطراف باردة ومزرقة	وتوقف التنفس
تهيج	- لون جلدي مرمرى	
وهن	- شح البول أو انقطاعه	
سبات		

2. تأكيد السبب الإنتاني للصدمة ونفي الأسباب الغير إنتانية (جدول 2)

يجب جمع الأدلة المشيرة إلى وجود إنتان (حالة إنتانية، علامات توضع عضوي، فوهة دخول...) ارتفاع أو انخفاض الحرارة، ارتفاع الكريات البيض أو نقصها تشير فقط إلى رد فعل عام على الالتهاب وهي ليست خاصة بالإنتان.

جدول 2 - التشخيص التفريقي للصدمة الإنتانية

الألمية	الأسباب	الأدلة السريرية	الفحوص المكملة
عائق في وجه الملى البطيني	● الصمامة الرئوية	ألم صدري، قصور البطين الأيمن، التهاب وريد	ECG، غازات الدم، د - ديمير إيكودوبلر للأطراف السفلية تصوير رئوي ومضاني، تصوير وعائي طبقي محوري للركبتين
	● التهاب التامور العاصر	نبض عجائبي، قصور البطين الأيمن قصور قلب عام	ECG، إيكوكربي
قصور العضلة القلبية	● احتشاء العضلة القلبية	خناق صدر، قصور البطين الأيسر	ECG، تروپونين، إيكوكرب
	● اضطرابات نظم	قصور قلب عام	
نقص حجم السوائل حقيقي أو نسبي	● تجفاف خطر ● نزف ● تحسس ● التهاب البنكرياس	ثنية جلدية شحوب، نزف خارج الجسم احمرار جلد (ونمة كوينك) ألم بطني	بروتين الدم، هيماتوكريت تعداد وصيغة أميلاز الدم

3. تفريق نتائج الصدمة

سريرياً: هبوط الضغط الشديد ونقص الدوران المحيطي، يؤدي إلى انعكاسات عضوية: كلوية (انقطاع البول - قد يتطلب تحالفاً بالكلى الاصطناعية)، تنفسية (تتأثر القصور التنفسي الحاد - قد يتطلب اللجوء إلى التنفس الاصطناعي)، عصبية (مجاري تنفسية سالكة، قنطرة معدية، جهاز تنفس اصطناعي)، هضمية (خطر النزف، الانسداد، التهاب الكولون نتيجة نقص التروية).

مخبرياً: يجب إجراء الفحوص التالية: تعداد وصيغة، نسبة البروترومبين، غازات الدم الشرياني، اللاكتات، شوارد الدم، البولة، الكرياتينين، فحوص الكبد، البحث عن اضطرابات تخثر في الدم. الهدف هو البحث عن اضطرابات استقلابية (ارتفاع اللاكتات > 2 ملي مول/لتر، صوديوم الدم، بوتاسيوم الدم، كرياتينين الدم)، كبدية (ركودة صفراوية، انحلال خلوي، قصور كبدي خلوي)، تخثرية دموية (تخثر منتشر داخل الأوعية، انحلال الفيبرين).

4. البصمة عن السبب الإنتاني

العزل السريع للجرثوم المسبب بواسطة زرع الدم، عينات إسعافية (فحص مباشر) على مستوى فوهات الدخول أو في (البول، السائل الدماغي الشوكي، سائل الجنب، وأحياناً عينات موجهة شعاعياً في حالة وجود خراج تحت الجلد أو عميق، تجمع سائل في البطن...).

الفحوص الأخرى تستطب حسب الحالة السريرية جدول 3.

جدول 3 - بعض النصائح لكيفية التصرف عملياً عند مريض

ذو حرارة مرتفعة وفي حالة صدمة

اعراض موجهة	التشخيص الأكثر احتمالاً	كيفية التصرف الإسعافي
أ - عند دخول المريض إلى المستشفى		
صداع، اضطرابات في الوعي من دون علامات توّضع	التهاب دماغ وسحايا	في حال وجود فرغية، سيفالوسبورين جيل 3 بشكل إسعافي.
		في حال عدم وجود فرغية: بزل قطني (انظر الفصل 5)، تصوير طبقي محوري دماغي، مرنان مغناطيسي.
صداع، اضطرابات في الوعي مع علامات توّضع	التهاب عصبي - سحائي	تصوير طبقي محوري أو مرنان مغناطيسي ومن ثم بزل قطني، المعالجة تكون حسب نتيجة البزل
فرغية لغزبية مصممة	المكورات السحائية، المكورات الرئوية	سيفالوسبورين الجيل 3
فرغية لغزبية متوضعة	تجرثم دم بالمكورات العنقودية، اللاهوائيات	بيبتاكتامين ± أمينوزيد ± ميرونيدازول

يرقان نتيجة ركودة في الطرق الصفراوية	التهاب الطرق الصفراوية	إيكو، صورة بسيطة للبطن
آلام بطنية	التهاب البريتون	إيكو، فتح بطن استقصائي
آلام قطنية + علامات بولية	التهاب الحويضة والكلية حاد انسداد المجاري البولية خراج كلية	فحص بول وراسب، إيكو، تصوير طبقي محوري بولي إيكو، من الممكن وضع قنطرة فحص بول وراسب، تصوير طبقي محوري بولي إيكو.
علامات تنفسية	التهاب الرئة	صورة صدر، غسل قصبي سخي (إذا كان المريض ذو مناعة ناقصة أو أن الالتهاب غير حاد) بزل جنب، مولدات ضد للجيبونيللا في البول
احمرار جلد منتشر	صدمة سمية بالمكورات العنقودية أو العقدية	البحث عن باب الدخول أو التوضعات الثانوية والمعالجة التي من الممكن أن تكون جراحية
التهاب الجلد والطبقة ما تحت الجلد النخري مع خراخر	غغريفة باللاهوائيات	جراحة (++) صادات حيوية (أنظر الفصل 14)
التهاب الجلد والطبقة ما تحت الجلد	التهاب بالمكورات العقدية أو حتى بالمكورات العنقودية المذهبة	جراحة، صادات حيوية (أنظر الفصل 14)
ب - مريض في المستشفى منذ أكثر من 48 ساعة		
قنطرة وريدية مركزية أو محيطية	التهاب وريد خثري إنتاني (مكورات عنقودية مذهبة مقاومة للبنيسيلين، أو عصيات غرام سلبية	سحب القنطرة، ربط الوريد في بعض الأحيان، غليكوبيبتيد + أمينوزيد، موجهة بواسطة فحص مباشر بانتظار نتائج للزرع
قنطرة مثانة	التهاب بول نتيجة وجود عائق	إزالة انسداد القنطرة، أو تغييرها
جراحة حديثة أو استعمال أدوات تداخلية (بولية أو هضمية)	التهاب بعد العمل الجراحي (مكورات غرام إيجابية أو عصيات غرام ⊖)	البحث عن إنتقاب عضو ما، انفكاك الخياطة تجمع قيحي (تصوير طبقي محوري، جراحة، صادات حيوية)

3. الدم الدوراني للصدمة (جدول 4)

1. معطيات عامة:

بالإضافة إلى الإجراءات العلاجية العادية (الصادات الحيوية الأكثر ملاءمة، إزالة فوهة دخول الجرثوم أو التوضعات الإنتانية، معالجة قصور عضوي...) فإن معالجة الأعراض يجب أن تحقق في وسط العناية المشددة وهي تركز على معالجة كل القصورات العضوية:

قصور القلب والدوران:

وضع قنطرة مركزية يسمح بمراقبة الإملء واستعمال الأمينات المقبضة للأوعية (جدول 4). الملء الوعائي هو المرحلة الأولية الأساسية والإجبارية لمعالجة الحالة الإنتانية الخطرة. حصول توسع وعائي (معطيات هيموديناميكية) أو حالة نقص انقباضية العضلة القلبية يتطلب استعمال الكاتيكول أمين. إذا كان هناك انخفاض شديد في الضغط الشرياني وحياة المريض في خطورة فإن وصف الكاتيكول أمين يكون ضرورياً مهما كانت حالة السوائل في الجسم (تجفاف أو زيادة في السوائل). استعمال الكورتيزون بجرعات ضعيفة يسمح بإنقاص خطر الوفاة (هيموسوكسينات الهيدروكورتيزون 50 مغ كل 6 ساعات). تقويم فعالية هذه المعالجة يركز بصورة أساسية على المعطيات السريرية: اختفاء اللون المرمري للجلد، تحسن حالة الوعي، عودة التبول أو الحفاظ على مستوى جيد له، وأهم شيء هو عودة الضغط الشرياني المتوسط لمستوى أعلى من 70 ملم زئبقي.

قصور الجهاز الدموي:

أظهرت دراسة حديثة فعالية إيجابية للبروتين C الفعال (المحرض) عند المرضى الذين عندهم حصيلة أباش $Apache < 25$. تقويمه ما زال قيد الدراسة. الكزيجريس Xigris (بروتين مفعّل) يمكن استعماله في حالة الصدمة الإنتانية مع قصور متعدد الأحشاء.


2. حالة الطفل الحديث الولادة:

الخطّة العلاجية تكون حسب الترتيب الزمني التالي:


- ملء بدئي بمقدار 20 مل/كغ خلال 20 دقيقة.
- إعطاء الدوبامين (10 - 20 مكغ/كغ/دقيقة أو أكثر وتتم زيادته تدريجياً بمقدار 2 مكغ/كغ/دقيقة) مع أو بدون ملء آخر.
- تقويم الحالة الهيموديناميكية بواسطة إيكو - دوبلر أو قثطرة وريدية مركزية.
- في حالة الفشل فإنه من الممكن استبدال الدوبامين بالأدرينالين (البدء بـ 0.1 مكغ/كغ/دقيقة مع زيادة الجرعة تدريجياً بمقدار 0.1 مكغ/كغ/دقيقة).
فعالية كل تغيير في الجرعة يعاد تقويمه كل 15 - 20 دقيقة.

جدول 4 - معالجة الصدمة الإنتانية

تجميع المعطيات السريرية التي تطورها بوجه المعالجة



تجميع معطيات مكملّة التي تطورها بوجه المعالجة



4. التهاب شغاف القلب الإنتاني

نسبة حدوث التهاب شغاف القلب الإنتاني في فرنسا هي 25 حالة/مليون مواطن/سنة (1300 حالة سنوياً)، ونسبة الوفيات نتيجة هذا المرض هي 16% (أنظر جدول 1 و2).

جدول 1 - العضويات المجهرية المسؤولة عن التهاب شغاف القلب الإنتاني		
التهاب شغاف القلب	على الصمام الأصلي	على طعم صمامي
مكورات عقدية	55 - 60%	30%
مكورات عقدية	25%	45%
جراثيم أخرى + خمائر	5 - 10%	15 - 20%
زرع دم سلبي	10%	5%

جدول 2 - العضويات المسببة لالتهاب شغاف القلب الإنتاني

حسب بوابة الدخول	
سنية	مكورات عقدية غير قابلة للتصنيف جراثيم فئة HACEK*
جلدية	مكورات عقدية
بولية، هضمية، تناسلية	مكورات عقدية بقرية، مكورات معوية، عصيات غرام Ⓟ

* كلمة HACEK هي تجميع لأول حرف من أسماء الجراثيم الخمسة المكونة لهذه الفئة وهي: هيومفيلوس *Haemophilus*، لكتينوباسيلوس *Lactinobacillus*، لكتينوميسيتومكوميتانس *Actinobacillus actinomycetemcomitans*، كاربديوباكتريلوم هومينيس *Cardiobacterium hominis*، ليكتيللاكورودينس *Eikenellacorodens*، كينجوللا كينجا *Kingella kingae*.

1 - المعالجة الشافية بالصادات الحيوية

1. مبادئ المعالجة:

1. مبادئ المعالجة بالصادات الحيوية:

جدول 3 - المعطيات الفيزيولوجية المرضية الأساسية التي يجب أخذها بعين الاعتبار من أجل معالجة فعالة لالتهاب شغاف القلب الإنتاني

البؤرة الإنتانية (البراعم)	المتطلبات العلاجية
تكتلات فيبرينية صغيرية خالية من الخلايا	ضرورة المعالجة بالصادات الحيوية الفعالة للجرثوم (عدم وجود الخلايا البالعة)

مؤء انتشار الصاء الءوىى	ءءم البراءم
ضرورة استعمال أكثر من صاء ءوىى واءء	تلقء ءرئومى مرئع
ءطوءة ءولء ءرائم مقاوءة	
نقص فعالة الصاء الءوىى المؤثر على ءءار ءرئومى	ءرائم فى ءالة زفاءة ءابئة
ضرورة استعمال صاء ءوىى لءءة طوءلة	فعالة اسءلاءبة ءرئومفة بطئفة
إنقاص انتشار الصاء الءوىى	ءولء الأوكسوبولفسكارفء من قبل بعض
	المءوءفاء المءءرفة

ءءول 4 - المءوءوء المفكروبفولوجفة الضروءفة

لءءسفن اءءفار الصاء الءوىى البءئى

المءوءوء العقءفة العفر ءالفة للئئصف والمءوءوء العقءفة البفرفة	
- للءركفز المئبط الأصفر للئئسفللن G.	
المءوءوء المءوءفة	
الءركفز المئبط الأصفر للئئسفللن G وللاموكسففللن	
- البءء عن مسءوى مقاوءة عال فى وءه الأمفوزفء	
- ءساءفة على الفلفكوبفئءء	
- ءراءفة الفعالة الفاءة للءرئوم وقوءة المفعول بإضاففة الأمفوزفءاء	
المءوءوء العقءوءفة	
- ءساءفة على الأوكساءسفللن	
- ءساءفة على ءءئامفسفن؁ الفلفكوبفئءء؁ وعلى مضاءاء المءوءوء العقءوءفة الأءرى	
بالنسبة للمءوءوء العقءوءفة المقاوءة للمفئسفللن	
ءرائم الفئفة هاسفك HACEK	
- ءساءفة على الأموكسففللن وعلى السففالوسفورفن ءفل 3	
- البءء عن ءولء البفئالاكءاماز	

ءءول 5 - ءوصفاء من أءل استعمال الصاءاء الءوىفة فى ءالة

الءهاب شغاف القلب الإنتانى

1. البئئسفللن	
- ضرورة معايرة كرفاءفئفن ءم.	
- من المفضل ءءفن المسممر.	
- ءءم إعطاء ءرعة ءءومفة.	
- معافرءه فى ءم فقط فى ءالة وءوء قصور كلوى.	
2. الأمفوزفءاء	
- 2 إلى 3 ءرعاء فى الءوم (ءءم إعطاء ءرعة وءفءة).	
- ضرورة معافرءها فى ءم لكفففف العلاء.	

- التركيز الباقي المرغوب - خطر التسمم
جنتاميسين، نيتيلميسين > 1 - 2 مغ/ل
أميكاسين (في حالة العصيات غرام ⊖) > 5 مغ/ل
- تركيز القمة (15 - 30 دقيقة بعد انتهاء الجرعة) = مشعر الفعالية
جنتاميسين، نيتيلميسين < 15 - 20 مغ/ل
أميكاسين (في حال عصيات غرام ⊕) < 40 مغ/ل

3. غليكوبيبتيد

- فانكوميسين بطريقة الحقن المستمر أو نيكوبلانتين بحقن متفرقة (تركيز باقي: < 20 مغ/ل من أجل النيكوبلانتين، < 30 مغ/ل من أجل الفانكوميسين).
- ضرورة معايير دموية لتكثيف الجرعة.

المراقبة: المعالجة بالصادات الحيوية يجب أن تراقب بواسطة معايير دموية لبعض الصادات الحيوية (أنظر سابقاً الجدول 5)، كما يجب مراقبة الوظائف الكلوية والسمعية بشكل منتظم (الأمينوزيد، الغليكوبيبتيد).

2 - المبادئ الجراحية:

معالجة التهاب شغاف القلب الإنتاني حالياً هي معالجة دوائية - جراحية في نصف الحالات.

المعالجة الجراحية مستطبّة في 3 حالات - أحياناً متداخلة - هذه الحالات هي: عدم السيطرة على الإنتان بواسطة المعالجة بالصادات الحيوية، قصور القلب العائد إلى تخرب الدسامات، حصول صمامة في أحد الأجهزة. في المرحلة الحادة لالتهاب شغاف القلب الإنتاني خصوصاً عند بدء المعالجة، فإنه من الصعب تحديد اللحظة المناسبة للتدخل الجراحي. إذا كان استئطاب الجراحة عائد إلى اضطراب في الحالة الهيموديناميكية أو إلى شدة الآفات الدسامية فإن المداخلة الجراحية لها أهميتها هنا.

2 - الخطط العلاجية الأساسية

1. التهاب شغاف القلب الإنتاني العائد إلى المكورات العقدية والمكورات

المعوية (جدول 6):

المكورات العقدية الغير قابلة للتصنيف هي من أصل فموي حنجري

(المكورات العقدية سانغي، ميتيس، سالفاريس، موتانس). المكورات العقدية البقرية *bovis* (السبب الأكثر شيوعاً) والمكورات المعوية (فيكالييس، فاسيوم، دورانس) أصلها بولي أو هضمي.

هذا ونميز عادة المكورات العقدية الحساسة عادة على البنيسيللين (التركيز المثبط الأصغر < 0.1 مغ/ل) والمكورات العقدية ذات الحساسية الأقل (تركيز مثبط أصغر < 0.1 مغ/ل) وهي تضم المكورات المعوية والمكورات العقدية القاصرة والتوليرانس.

لمعالجة التهاب شغاف القلب الإنتاني الناتج عن المكورات المعوية يجب الأخذ بعين الاعتبار الحساسية المنخفضة على البنيسيللين (تركيز مثبط أصغر < 1 مغ/ل) والمقاومة للسيفالوسبورين، وغالباً مستوى مقاومة مرتفع على الأمينوزيد (تركيز مثبط أصغر < 2000 مغ/ل) في هذه الحالة الأخيرة لا يوجد تعاضد قائل للجرثوم بيتالاكتامين + أمينوزيد.

في حال غياب مستوى المقاومة المرتفع على الأمينوزيد، فإن مشاركة الأموكسيسيللين + الأمينوزيد أو الغليكوبيبتيد + الأمينوزيد منصوح بها. مدة المعالجة 6 أسابيع.

في حال مستوى مقاومة مرتفع على الأمينوزيد ينصح المعالجة بالفانكوميسين مفرداً لمدة 6 أسابيع. التيكوبلانيين يمكن أن يشكل بديلاً للفانكوميسين خصوصاً في بعض زمر المكورات المعوية المقاومة للفانكوميسين والحساسية على التيكوبلانيين. في حال المقاومة على البنيسيللين والفانكوميسين فإنه لا يوجد معالجة أخرى منصوح بها. المعالجة يجب أن تتم في مركز مختص. في حال كون المكورات العقدية قليلة الحساسية للبنيسيللين وذات مستوى مقاومة عالٍ على الجنتاميسين فإن تركيزات عالية سريرية - بيولوجية تكون ضرورية وينصح هنا بإعطاء 3 صادات حيوية الغليكوبيبتيد + الأموكسيسيللين + الجنتاميسين.

الحالة السريرية

المدّة	الجرعة	الجرعة	اسم الدواء	الجرعة	اسم الدواء	غراب النخس على البينسيلين	الجروم	الحالة السريرية
2 (مر القتها مع جنتاميسين إجاري) إلى 4 أسابيع (مع أو من دون جنتاميسين)	30 مع/كغ/يوم 6 مع/كغ/يوم 4 - 3 مع/كغ/يوم	30 مع/كغ/يوم 6 مع/كغ/يوم 4 - 3 مع/كغ/يوم	[[فلنكسيمين* أو تيكروميسين]] ± جنتاميسين [2]	300000 - 200 وحدة/كغ/يوم 100 مع/كغ/يوم 2 غ/يوم × 1 يوم 4 - 3 مع/كغ/يوم	بنيسيلين G* أو أموكسيسيلين أو سيفترياكسون ± جنتاميسين	مكررات عشوية حساسة على البينيسيلين تركيز مثبط أصغر > 0.1 مع/ل	التهاب الشغاف على نسام أصلي أو طعم نسامي	
أسبوعين معالجة بصاد حيوي ومن ثم 4 - 3 أسابيع معالجة بصاد حيوي وحيد	30 مع/كغ/يوم 6 مع/كغ/يوم 4 - 3 مع/كغ/يوم	30 مع/كغ/يوم 6 مع/كغ/يوم 4 - 3 مع/كغ/يوم	[[فلنك* أو تيكروميسين]] + جنتاميسين [2]	400000 - 300 وحدة/كغ/يوم 200 مع/كغ/يوم 4 - 3 مع/كغ/يوم	[[بنيسيلين G* أو أموكسيسيلين]] + جنتاميسين [2]	مكررات عشوية ذات حساسية أقل على البينيسيلين (تركيز مثبط أصغر < 0.1 مع/ل)	التهاب الشغاف فوق نسام أصلي أو طعم نسامي	
6 - 4 أسابيع	30 مع/كغ/يوم 6 مع/كغ/يوم	30 مع/كغ/يوم 6 مع/كغ/يوم	فلنكسيمين* أو تيكروميسين	400 - 300 وحدة/كغ/يوم	بنيسيلين G* أو أموكسيسيلين	مكررات معوية ذات مستوى مقاومة مرتفع على الأمينوزيد	كل الأشكال السريرية	
6 - 4 أسابيع	30 مع/كغ/يوم 6 مع/كغ/يوم	30 مع/كغ/يوم 6 مع/كغ/يوم	[[فلنكسيمين* أو تيكروميسين]] + جنتاميسين [2]	400 - 300 وحدة/كغ/يوم	بنيسيلين G* أو أموكسيسيلين	مكررات معوية فيكليس، فالسكوم	كل الأشكال السريرية	

من المفضل إعطاؤها بواسطة حقن مستمر.

* حاوية على المكورات العنقوية تونيزانس (CMB)/تركيز مثبت أصفر <32) والتي من أجلها الأموكسيسيللين مفضل على النيمسولين G.

اختیار آخر محتمل: نیبیلیمسین (5-6 مغ/کغ/یوم).

*** جرعة هجوبية 6 مغ/كغ/12 ساعة حتى الحصول على تركيز باق ما بين 20 - 30 ملغ/ل ومن ثم تكيف جرعة الصداد الحيوي حتى الحصول على تركيز باق ما بين 20 - 30 ملغ/ل.

2. التهاب شغاف القلب الإنتاني العائد للمكورات العنقودية:

التهابات الشغاف فوق دسام أصلي يكون سببها عادة المكورات العنقودية المذهبة وإذا كان الجرثوم من أصل خارج المشفى فإن الزمر المسببة تكون عادة حساسة على الميثيسيلين. الدسامات المصابة هي دسامات القلب الأيسر عادة. التهابات الشغاف فوق طعم دسامي تعود إلى مكورات عنقودية ذات خميرة تخزينية سلبية غالباً مقاومة للميثيسيلين. عند المدمنين على المخدرات، يجب البحث روتينياً عن التهاب الشغاف للقلب الأيمن (الدسام ثلاثي الشرف) الشائع وذو الخطورة الأقل.

2. 1 التهاب الشغاف المسبب من المكورات العنقودية فوق دسام أصلي (جدول 7):

معالجة التهاب الشغاف المسبب من المكورات العنقودية المقاومة للميثيسيلين يجب أن تحتوي بصورة إجبارية على الغليكوبيبتيد. ومع ذلك فإن القوة القاتلة للجرثوم بطيئة والاستجابة على المعالجة متأخرة. تجرثم الدم يمكن أن يدوم عدة أيام (حتى اليوم السابع) بعد بدء المعالجة. عند المدمن على المخدرات، الطرق الوريدية تسبب مشاكل غالباً. اللجوء إلى الغليكوبيبتيد كخيار أولي مفضل. الخطط العلاجية التي تستعمل للطريق الفموي والتي تدمج ما بين السيبروفلوكساسين (750 مغ × 2 باليوم) والريفامبيسين (600 مغ × 2 باليوم) وذلك بعد معالجة قصيرة المدة 3 - 4 أيام عن طريق الوريد فعالة ولكن تعرض لخطورة انتقاء جراثيم مقاومة خلال فترة المعالجة. التهاب الشغاف العائد للمكورات العنقودية الحساسة على الميثيسيلين مرافقة ((أوكساسيلين أو سيفاماندول) + أمينوزيد + ريفامبيسين) منصوص بها. مدة المعالجة يجب أن تكون 6 أسابيع، منها أسبوعين على الأقل معالجة بصادات حيوية حاوية على الأمينوزيد. المعالجة الجراحية غالباً ضرورية.

جدول 7 - اقتراحات لمعالجة التهاب شغاف القلب العائد للمكورات العنقودية

المدّة	تحسن على البنيسيلين	اسم الدواء	الجرعة	اسم الدواء	غياب التحسن على البنيسيلين	الجرثوم	الحالة السريرية
4 - 6 أسابيع (منها 5 - 7 أيام مرافقة علاجية)	30 مع/كغ/يوم 4 مع/كغ/يوم	أفانكوسمين ⁴ ± جنتاميسين ²	15 مع/كغ/يوم 4 مع/كغ/يوم		مكورات عنقودية حساسة على الميتيسيلين	الصلام الأصلي	
6 أسابيع (أمينوزيد 15 يوماً فقط)							طعم صمامي (نفس الخلطة العلاجية)
4 - 6 أسابيع (أمينوزيد محدد — 7 أيام فقط)	30 مع/كغ/يوم 4 مع/كغ/يوم	أفانكوسمين ⁴ + جنتاميسين ²	30 مع/كغ/يوم 4 مع/كغ/يوم		مكورات عنقودية مقاومة للميتيسيلين	صلام أصلي	
		أو مضادات مكورات عنقودية أخرى حسب الحساسية الجرثومية]]					
6 أسابيع (أمينوزيد محدد — 15 يوماً)	30 مع/كغ/يوم 4 مع/كغ/يوم 20 مع/كغ/يوم	أفانكوسمين ⁴ + جنتاميسين ² + ريفايميسين ⁵	30 مع/كغ/يوم 4 مع/كغ/يوم 20 مع/كغ/يوم		مكورات عنقودية مقاومة للميتيسيلين	طعم صمامي	
		أو صادات أخرى حسب الحساسية الجرثومية]]					

1. الجراحة ضرورية غالباً.
2. كبديل: نيفلأميسين (5 - 6 مغ/كغ/يوم).
3. 6 حقن/يوم. كبديل كلوكساسيلين: 100 - 150 مغ/كغ/يوم، سيفاماندول: 75 - 100 مغ/كغ/يوم.
4. كبديل نيكلولانين، مع الحفاظ على العيار الباقي في الدم ما بين 20 - 30 مغ/ل.
5. في حال وجود زمر مقاومة للريفايميسين، يجب مرافقة الأفانكوسمين بواحد أو اثنين من الصادات الحيوية الأخرى، حسب اختبار التحسن الجرثومي للصدادات الحيوية.
6. متابعة المعالجة عن الطريق القنوي ممكنة في بعض الحالات (أنظر فصل إنتانات المكورات العنقودية).

3. التهاب الشغاف العائد للحمي Q (كوكسيللا بورنيتي)

المعالجة تتضمن الدوكسيسيكلين 200 مغ/يوم جرعة وحيدة، وفلوروكينولون موصوف حسب جرعته العادية. من الممكن مرافقة هذه المعالجة مع الهيدروكسيكلوروكين (بلاكينيل) بجرعة 2 - 3 حبوب/يوم (عيار الهيدروكسيكلوروكين في الدم يجب أن يكون من 1 - 2 مكغ/ل). المعالجة يجب أن تكون على الأقل 3 سنوات، ويمكن أن توقف إذا أظهرت الفحوص المصلية أن IgG المرحلة I هي >200 وحدة عالمية/ل و IgA المرحلة >50 وحدة عالمية/ل.

4. التهاب شغاف القلب ذو زرع الدم السلبي:

1. التهاب شغاف القلب ذو زرع الدم السلبي على دسام أصلي (جدول 8):

يجب تنبيه مخبر الفحوص البيولوجية الجرثومية، وبانتظار نتيجة زرع الدم والفحوص المصلية الخاصة يجب البدء بالمعالجة بواسطة الأموكسيسيلين + أمينوزيد على فرض أن التهاب الشغاف عائد إلى المكورات العنقودية القاصرة (أنظر جدول 6).

2. التهاب شغاف القلب ذو زرع الدم السلبي على طعم دسامي:

في حال التهاب شغاف القلب على طعم، فإن اختيار المعالجة يتعلق بالفترة الفاصلة ما بين تاريخ وضع الطعم الدسامي وتاريخ حدوث التهاب شغاف القلب. في حال التهاب شغاف باكراً (أقل من سنة بعد العمل الجراحي) فإن احتمال مسؤولية المكورات العنقودية خاصة ذات الخميرة النخرية السلبية والمقاومة للميتيسيلين، كبيرة.

يوصى هنا بإعطاء 3 صادات حيوية فانكوميسين + ريفاميسين + أمينوزيد. تبديل الطعم الدسامي يجب مناقشته باكراً في حالة تطور سريري غير مناسب. في حال التهاب شغاف على طعم موضوع منذ أكثر من سنة فإن مسؤولية المكورات العنقودية تبقى واردة ولكن هناك عضويات مجهرية أخرى يمكن أن تكون مسؤولة: مكورات عنقودية أو جراثيم الفئة HACEK. المرافقة ما بين الفانكوميسين والأمينوزيد كمعالجة أولية منصوح بها هنا. وإضافة السيفالوسبورين جيل 3 منصوح به في حالة فشل المعالجة الأولية.

جدول 8 - أسباب التهاب الشغاف ذو زرع الدم السليبي ظاهرياً
والطرق المقترحة لتحسين تشخيص مسبباته

الأسباب	التشخيص
معالجة مسبقة بالصادات الحيوية	إيقاف المعالجة بالصادات الحيوية إذا كان ممكناً + تقنية زرع دم خاصة
جراثيم ذات نمو صعب	تقنية زرع دم خاصة
مكورات عقدية قاصرة	تقنية زرع دم خاصة
جراثيم فئة HACEK	تقنية زرع دم خاصة
بروسيللا سيبسيا	تقنية زرع دم خاصة + فحوص مصلية
ليجيونيللا سيبسيا	تقنية زرع دم خاصة + فحوص مصلية
نيسيريا سيبسيا	تقنية زرع دم خاصة
نوكراديا سيبسيا + جراثيم فطرية	تقنية زرع دم خاصة
جراثيم ذات نمو داخل الخلايا	
كلاميديا سيبسيا	فحوص مصلية
كوكسيلا بورنيتي	فحوص مصلية
بارتونيلا سيبسيا	فحوص مصلية + مضخم جيني
ميكوبلازما رئوية	فحوص مصلية
توفريما وبييلي	مضخم جيني
الفطور	
المبيضات	تقنية زرع دم خاصة + فحوص مصلية
إسبيرجيلوس سيبسيا	تقنية زرع دم خاصة + فحوص مصلية

ج - الوقاية (جدول 9، 10، 11، 12)

تعتبر الوقاية الاستراتيجية الأساسية القادرة على إنقاص حدوث هذا المرض الخطير. وهي تركز على الكشف والمعالجة المبكران للبؤر الإنتانية ولا سيما السنية، والبؤر المتوضعة في مجاري الأذن - الأنف - الحنجرة، والبؤر البولية والهضمية عند مرضى الدسامات القلبية. هؤلاء المرضى يجب أن يتلقوا تعليمات خاصة عن العناية بصحة أسنانهم، ويجب أن يستشيروا طبيبهم أمام كل ارتفاع في درجة الحرارة وأن يراجعوا طبيب أسنانهم بصورة منتظمة.

3.3 الفصل 4: التهاب شغاف القلب الإنتاني

ترتكز الوقاية أيضاً على المعالجة بالصادات الحيوية في الحالات التي تزيد احتمال حدوث تجرثم الدم عند المرضى الحاملين لأفات قلبية دسامية، أو الحاملين لطعم دسامي أو اللذين أصيبوا سابقاً بالتهاب شغاف القلب الإنتاني. التوصيات ملخصة عرضت في الجدول 12.

جدول 9 - الأمراض القلبية المؤهية لحدوث التهاب شغاف القلب الإنتاني

الفئة أ: الأمراض القلبية المؤهية بنسبة كبيرة	الفئة ب: الأمراض القلبية المؤهية بنسبة لكل
- طعوم دسامية (ميكانيكية، بيولوجية أو ذاتية	- مرض دسامي: قصور أبهري، قصور تاجي، تضيق أبهري
- مرض قلب ولادي مزرق لم يعالج جراحياً والمفاغرات الجراحية (الرئوية - الجهازية)	- تدلي النمام التاجي مع قصور تاجي، تسك للنام
- سوابق التهاب شغاف القلب الإنتاني	- النمام الأبهري ثنائي الشرفة
	- مرض قلبي ولادي غير مزرق ما عد الفتحة ما بين الأذنين
	- اعتلال العضلة القلبية الضخامي الساد (مع نفخة على الإصغاء)

جدول 10 - مداخلات تتطلب معالجة وقائية بالصادات الحيوية عند المرضى المؤهين للإصابة بالتهاب شغاف القلب الإنتاني

فموية سنية: وضع حشوة سنية، عناية غير جراحية لما حول الأسنان، عناية داخل سنية، تركيب طعوم سنية قد تختلط بنزوف، مداخلات جراحية، مداخلات فكية سنية.

مداخلات أنف، أنف، حنجرة: استئصال اللوزتين، استئصال غدد، جراحة تنظيرية لالتهاب الجيوب المزمن، تنظير قصبات.

معدية - معوية: توسيع المري، تصوير الطرق الصفراوية الراجع وخزاع المعصرة في حال وجود عائق صفراوي أو كيسة بانكرياسية، خياطة دوالي المري، تنظير الكولون، المعالجة المصلية Sclérothérapie.

بولية تناسلية: نزع قثطرة كانت قد وضعت خلال عمل جراحي بولي وبوجود بول مجرثم، خزعة بروتستائية، توسيع الحالب، تقنيات الحصيات خارج الجسم، ولادة بالطريق الطبيعي.

جلدية: معالجة جراحية لخراج.

جدول 11 - مخطط استطبائات المعالجة الوقائية بالصادات الحيوية عند المرضى الخاضعين لمعالجة قلبية - سنوية وذلك حسب تصنيف مرضهم القلبي في الفئة أ أو ب

المعالجة الوقائية بالصادات الحيوية		فئة أ	فئة ب
الأمراض القلبية المؤهبة	الأمراض القلبية المؤهبة	للإصابة بنسبة مرتفعة	للإصابة بنسبة أقل ارتفاعاً
مداخلة قلبية سنوية مؤهبة بنسبة مرتفعة	معالجة مستتبطة	معالجة أقل استتبائياً	معالجة غير مستتبطة

جدول 12 - نماذج المعالجة بالصادات الحيوية الوقائية لالتهاب شغاف القلب الإلتهابي

المداخلات السنوية وعلى الطرق التنفسية العليا			
1. مداخلات لا تتطلب الإقامة في المشفى	اسم الدواء	الجرعة، وطريق الإعطاء، جرعة وحيدة خلال الساعة السابقة للمداخلة	لا يوجد تحسس على البيتا لاكتامين
لا يوجد تحسس على البيتا لاكتامين	أموكسيسيللين	3 غ، فم	لا يوجد تحسس على البيتا لاكتامين
يوجد تحسس على البيتا لاكتامين	كلينداميسين أو بريسيتناميسين	600 مغ، فم 1 غ، فم	لا يوجد تحسس على البيتا لاكتامين
2. تخدير عام	اسم الدواء	الجرعة وطريق الإعطاء	لا يوجد تحسس على البيتا لاكتامين
لا يوجد تحسس على البيتا لاكتامين	أموكسيسيللين	2 غ، وريد (خلال 30 دقيقة)	لا يوجد تحسس على البيتا لاكتامين
يوجد تحسس على البيتا لاكتامين	فانكوميسين أو تيكونولان	1 غ، وريد (حقن خلال 60 دقيقة) 400 مغ، وريد (حقن مباشر)	لا يوجد تحسس على البيتا لاكتامين
مداخلات بولية تناسلية أو هضمية			
اسم الدواء	الجرعة وطريق الإعطاء	الجرعة وطريق الإعطاء	لا يوجد تحسس على البيتا لاكتامين
أموكسيسيللين + جنتاميسين	2 غ، وريد (حقن خلال 30 دقيقة) 1.5 مغ/كغ، وريدياً (حقن خلال 30 دقيقة) أو عضلياً	خلال الساعة السابقة للمداخلة (بعد 6 ساعات كحد أقصى)	لا يوجد تحسس على البيتا لاكتامين

35 الفصل 4: التهاب شغاف القلب الإنتاني

لا يوجد جرعة أخرى	لا يوجد جرعة أخرى	لا يوجد جرعة أخرى	لا يوجد جرعة أخرى	لا يوجد جرعة أخرى	لا يوجد جرعة أخرى
لا يوجد جرعة أخرى	لا يوجد جرعة أخرى	لا يوجد جرعة أخرى	لا يوجد جرعة أخرى	لا يوجد جرعة أخرى	لا يوجد جرعة أخرى
لا يوجد جرعة أخرى	لا يوجد جرعة أخرى	لا يوجد جرعة أخرى	لا يوجد جرعة أخرى	لا يوجد جرعة أخرى	لا يوجد جرعة أخرى
لا يوجد جرعة أخرى	لا يوجد جرعة أخرى	لا يوجد جرعة أخرى	لا يوجد جرعة أخرى	لا يوجد جرعة أخرى	لا يوجد جرعة أخرى

الجرعة عند الأطفال: أموكسيسيللين دون تخدير: 75 مغ/كغ، فموياً. مع تخدير 50 مغ/كغ وريدياً قبل المداخلة ومن ثم 25 مغ/كغ فموياً بعد 6 ساعات كحد أقصى. كلينداميسين فموياً 15 مغ/كغ، بريسيتناميسين فموياً 25 مغ/كغ؛ فانكوميسين 20 مغ/كغ (كحد أقصى 1 غ)، تيكوبلانتين: عند الطفل ذو العمر < (1) شهر (جرعة وحيدة 10 مغ/كغ)، جنتاميسين 2 مغ/كغ (كحد أقصى 80 مغ).

* 2 غ إذا كان الوزن > 60 كغ أو عدم وجود تحمل مسبق لـ 3 غ.

5. طريقة العلاج العملية أمام التهاب السحايا الحاد

يعرف التهاب السحايا الحاد بوجود تناذر سحائي وإنتاني مع وجود أكثر من 10 خلايا/مم³ في السائل الدماغي الشوكي. بزل السائل الدماغي الشوكي يجب أن يسبق المعالجة بالصادات الحيوية. ومع ذلك فإن ترافق آفات فرغرية وكدمية مع ما وصفناه سابقاً يدعو للشك بتجرثم دم عائد للمكورات السحائية، الذي يمكن أن يتطور إلى فرغرية صاعقة تتطلب إعطاء إسعافياً للبيتا لاكتامين (جدول 1).

جدول 1 - المعالجة الإسعافية بالصادات الحيوية في حال وجود آفات فرغرية

قبل نقل المريض إلى المشفى يجب إعطاؤه جرعة من السيفترياكسون داخل الوريد ببطء أو أموكسيسيلين في حال عدم توفر السيفترياكسون. الطريق العضلي (أو الفموي) ممكن اللجوء إليها في حال غياب الطريق الوريدي.

1. سيفترياكسون: عند الطفل 50 مغ/كغ دون أن تتجاوز الـ 1 غ، عند البالغ 1 غ.
2. أموكسيسيلين: عند الطفل، 25 مغ/كغ داخل الوريد وببطء دون أن تتجاوز الـ 1 غ عند البالغ: 1 غ معندة بـ 20 مل سيروم معد للحقن.

أ. المضبوطات العلاجية الأولية

في حالة الشك بالتهاب السحايا الجرثومي فإنه يجب البدء بالمعالجة بالصادات الحيوية بشكل إسعافي حال تحقيق أخذ العينات (بزل قطني، زرع الدم). يركز اختيار الصاد الحيوي بشكل أساسي على نتائج الفحص الخلوي الكيميائي للسائل الدماغي الشوكي وعلى تلوين غرام. يجب الحصول على هذه النتائج بأسرع ما يمكن بعد تحقيق البزل القطني. في حال عدم إمكانية الحصول على نتائج سريعة لتلوين غرام أو إذا كان الفحص المباشر سلبي فإن إعطاء الصادات الحيوية الاحتمالي يستند على عمر المريض، والمظهر العياني للسائل الدماغي الشوكي، كما يمكن الاستعانة أحياناً ببعض المعطيات الوبائية، واحتمال الإصابة بجرثوم معين ومقاومة هذا الجرثوم، وكون التهاب السحايا بدئي أو ثانوي (بعد رض، أو مسبب في المشفى)، ووجود علامات خطورة أو لا.

استطابات التصوير الطبقي المحوري في حال التناثر السحائي الحاد والمترافق مع حرارة مرتفعة تبقى محدودة جداً. كما أن خطورة البزل القطني تبقى ضعيفة وأقل بكثير من خطورة التهاب السحايا. إن تحقيق تصوير طبقي محوري قبل البزل القطني يؤدي إلى تأخير بدء المعالجة بالصادات الحيوية، مع العلم أن فائدته التشخيصية وتأثيره على مسار المعالجة ضعيفان. من أجل هذه الأسباب مجتمعة فإن البزل القطني يجب أن يسبق التصوير الطبقي المحوري، حتى في حال وجود اضطرابات في الوعي (كثيرة المصادفة في حالة التهاب السحايا بالمكورات للرئوية). طبعاً يجب استثناء وجود علامات عصبية موضعية، عندها احتمال وجود تشخيص آخر أو احتمال وجود اختلاطات داخل الجمجمة يفرض تغيير الخطة العلاجية، حيث أن البزل القطني يمكن أن يكون خطيراً هنا. زرع الدم والمعالجة بالصادات الحيوية يجب أن تبدأ هنا، قبل الحصول على الصور التشخيصية.

أمام هذه الحالة الإسعافية التصوير الطبقي المحوري لا يسمح بتشخيص التهاب السحايا ولكن يسمح في حالة وجود علامات توضع عصبية بتشخيص أغلب الاختلاطات: استسقاء الدماغ، خراج، دبيلة دماغية، احتشاء نزفي، التهاب البطين. هذا ومن المفضل استعمال المرنان المغناطيسي لتشخيص التهاب وريد خثري.

2. المعالجة بالصادات الحيوية لالتهاب السحايا الأولي (البكتيري)

1. مظهر السائل الدماغي الشوكي:

- سائل دماغي شوكي نزفي: إذا لم يكن البزل القطني رضياً (نسبة كريات حمراء/كريات بيضاء > 1000 تشير إلى أن البزل القطني كان رضياً)، فهذا يعني أن هناك نزفاً سحائياً. الاستقصاءات الشعاعية العصبية يجب أن تحقق بسرعة. ولتجنب عدم تشخيص التهاب السحايا الجرثومي أو السبلي المختلط، فإن السائل الدماغي الشوكي يجب أن يزرع بشكل روتيني.
- سائل دماغي شوكي عكر أو قيحي: التشخيص هنا هو التهاب سحايا قيحي وهذا يعني جرثومي. المعالجة الاحتمالية بالصادات الحيوية يجب أن يبدأ بها إسعافياً، ومن المفضل توجيه هذه المعالجة حسب نتائج الفحص المباشر

بعد تلوين غرام. هذا وتجدر الإشارة إلى أن بعض التهابات السحايا الفيروسية تترافق بسائل دماغي شوكي عكر (خلايا بيضاء <800/مم³).

- سائل دماغي شوكي صاف: المعالجة بالصادات الحيوية - إذا كانت مستطبة - تؤجل بانتظار نتائج الفحوص الخلوية الجرثومية والبيولوجية الكيميائية للسائل الدماغي الشوكي. وذلك في حال غياب علامات الخطورة أو الفرورية الصاعقة.

2. الدراسة الخلوية والبيوكيميائية للسائل الدماغي الشوكي:

الدراسة الخلوية والبيوكيميائية للسائل الدماغي الشوكي، والتي يجب الحصول على نتائجها خلال الـ 30 دقيقة التالية للبلز، تسمح بطرح الاحتمالات التالية (صورة 1).


أ - فرط الخلايا مع أغلبية الخلايا المتعددة النواة:

على الأغلب الحالة هنا هي التهاب سحايا جرثومي، المعالجة بالصادات الحيوية يجب أن يبدأ بها بشكل فوري (جدول 6).

- إذا كان الفحص المباشر للسائل الدماغي الشوكي إيجابياً، فإن المعالجة بالصادات الحيوية تختار حسب الجرثوم، ومقاومته وهذه النتيجة تعدل فيما بعد حسب نتيجة اختبار التحسس الجرثومي للصادات الحيوية.
- إذا كان الفحص المباشر سلبياً (صورة 2) فالأمر يتعلق إما:

- بالتهاب سحايا جرثومي أخفي بمعالجة سابقة بالصادات الحيوية.
- التهاب سحايا بجرثوم صعب العزل أو التهاب سحايا في بدايته.
- التهاب سحايا فيروسي في بدايته.
- ورم التهابي أو لا ماس للسحايا، مما يفرض إجراء تصوير طبقي محوري: خراج دماغ، دويلة تحت الجافية، أم دم فطرية، ورم داخل الجمجمة.
- اختيار الصاد الحيوي هنا يستند إلى عمر المريض (جدول 2)، وجود عناصر موجهة لنوع العنصر المسبب (جدول 3) أو وجود علامات خطورة (جدول 4) ومقاومة الجراثيم.

صورة 1 - المعالجة حسب نتائج السائل الدماغي الشوكي



صورة 2 - معالجة التهاب السحايا الإنتاني

التهاب سحايا إنتاني خلايا <10/مم³، متعددة النوى <=50%

- إختبار صاد حيوي احتمالي استنادا إلى
- عمر المريض (جدول 2)
- علامات خطورة (جدول 4)
- عناصر موجهة وبائية (جدول 3)
- المقاومة الجرثومية (جدول 5)

الاقتراحات العلاجية

- فحص مباشر إيجابي
- زرع واختبار التحسس الجرثومي للصاد الحيوي ومن ثم تكييف المعالجة (تصوير طبقي محوري)
- فحص مباشر وزرع سلبي
- التهاب سحايا إنتاني ولكن - معالجة سابقة بالصادات الحيوية - جرثوم هش أو صعب العزل
- إثنان جرثومي أو ورم غير إنتاني بتماس السحايا (تصوير طبقي محوري)

ب - فرط الخلايا مع أغلبية الخلايا اللمفاوية:

الخيار العلاجي يتعلّق بالفحص العصبي، وبالنتائج البيوكيميائية للسائل الدماغي الشوكي (صورة 1).

- في حال نقص سكر السائل الدماغي الشوكي (نسبة سكر الس. د. ش/سكر الدم >0.5) أو وجود اضطرابات في الوعي أو تظاهرات عصبية موضعية أو لا فإن احتمال الليستيريا أو السل كبير هنا، والمعالجة يجب أن تبدأ بشكل إسعافي (أنظر صورة 1).

الليستيريا - والتي تتظاهر عادة بشكل تحت الحاد - تترافق عادة بعلامات التهاب دماغ مؤخر، الخلايا في السائل الدماغي الشوكي غالباً مختلطة (متعددات النوى وخلايا لمفاوية). في حال وجود التهاب السحايا السلي، فإن السائل الدماغي الشوكي يكون صافياً والخلايا اللمفاوية هي الغالبة. سوابق سلية، تدهور تدريجي للحالة العامة، اضطرابات الوعي، علامات عصبية لقاعدة الجمجمة (شلل الأعصاب القحفية، ارتفاع التوتر داخل الجمجمة) كلها عناصر توجه التشخيص.

هذا وقبل البدء بمعالجة خاصة بالسل حاوية على الإيزونيازيد (5 مغ/كغ/يوم)، ريفامبيسين (10 مغ/كغ/يوم)، إيتامبوتول (20 مغ/كغ/يوم) وبيرازيناميد (30 مغ/كغ/يوم) فإنه يجب التأكد من أن السائل الدماغي الشوكي كان قد زرع على وسط خاص للبحث عن عصيات كوخ.

عند المريض ذو المناعة الناقصة والمصاب بالفيروس VIH، يجب البحث عن أصل فطري (كريبتوكوكوس نيوفورمانس)؛ الفحص المباشر بواسطة الحبر الصيني، والبحث عن مولدات الضد في السائل الدماغي الشوكي والدم يجب أن يحقق ومن ثم المعالجة تكون بالأمفوتيريسين B + فلويسيتوزين أو فلوكونازول في الحالات الشديدة.

الفصل 5: طريقة العلاج العملية أمام التهاب السحايا الحاد 41

جدول 2 - الأسباب الرئيسية لالتهاب السحايا القيحي الشائع الأولي وعلاقته بالعمر

البالغ والطفل < 5 سنوات: نيسيريا سحائية، مكورات عقدية رئوية، لистерيا مونوسيتوجين
الرضيع والطفل > 5 سنوات: نيسيريا سحائية، مكورات عقدية رئوية، هيروفيلوس أنفلونزا
حديث الولادة: مكورات عقدية أغلاتيكا (مكورات عقدية B)، جراثيم معوية، لистерيا مونوسيتوجين

جدول 3 - عناصر موجهة نحو السبب

القصة السريرية	الأعراض
- مريض كحولي مزمن	- بداية مفاجئة
- سوابق رض جمجمة، جراحة قاعدة الجمجمة	- تهيج، سيات، اختلاجات، علامات عصبية متوضعة تحت الخيمة
- سوابق لتهاب سحايا بالمكورات الرئوية	- إبتان حديث أو حالي للطرق الهوائية: التهاب أنف، التهاب جيوب، ذات رئة
- رشح	
- تدهور وسائل الدفاع ضد الإبتان	
- عدم وجود الطحال، إبتان بالـ VIH، ورم نقوي	
التشخيص يمكن أن يؤكد بواسطة زرع الدم	

2. النيسيريا السحائية:	
- فصل الشتاء	- بداية مفاجئة
- قصة عدوى أو وباء	- فرفرية، خصوصاً إذا كانت منتشرة
- نقص في المتممة	- غياب العلامات العصبية الموضعية
التشخيص ممكن بواسطة زرع الدم \pm PCR على المصل أو السائل الدماغي الشوكي	

3. لистерيا مونوسيتوجين:	
- عمر < 50 سنة	- بداية تدريجية
- حمل	- علامات التهاب دماغ مؤخر
- نقص المناعة: معالجة بالكورتيزونات ورم نقوي	- س. د. ش قليل العكورة، صيغة مختلطة، أحياناً هناك أغلبية للمقاويات ولكن الصيغة الكيميائية هي صيغة تقيح (فرط بروتين لـ س. د. ش وللنسبة ما بين سكر س. د. ش/سكر الدم > 0.5)

4. هيروفيلوس أنفلونزا:	
- عمر < 5 أعوام	- بداية مفاجئة (حادّة)
- غياب الطعم المضاد للهيروفيلوس	- ترافق التهاب الأذن مع التهاب الملتحمة

جدول 4 - علامات الخطورة

- صدمة إنتانية	- الفرفرية الصاعقة
- مرض سابق كامن يمكن أن يفقد معاوضته:	- سيات (محصلة غلاسكو < 8)
- قصور قلب، قصور تنفس، قصور وعائي دماغي، سكري معالجات بالأنسولين	- ضغط شرياني انقباضي > 90 مم زئبقي
	- تسرع التنفس < 30/دقيقة
	- اضطرابات في البلع
كل علامة خطورة تتطلب وضع المريض في قسم العناية المشددة	

جدول 5 - حساسية الجراثيم

المكورات العقدية الرئوية

- عدد الجراثيم الحساسة للبنيسيلين في نقص: <50% عند الأطفال، <30% عند البالغ و1/3 من هذه إلى 30% هو ذو مستوى مقاومة مرتفع. نقص الحساسية على السيفالوسبورين جيل 3 هو حوالي 25% عند الطفل و15% عند البالغ؛ ولكن مع ذلك فإن المقاومة ذات المستوى المرتفع (≤ 4 مغ/ل) تبقى نادرة.

- للعوامل المؤهبة لنقص حساسية المكورات الرئوية على البنيسيلين:

- عمر >5 سنوات.
- معالجة بالبيتا لكتامين خلال الأشهر الـ 6 الماضية.
- إبتان بالـ VIH.
- أسباب أخرى لنقص المناعة.
- إن تحديد سريع للتركيز المثبط الأصغر للبيتا لكتامين (اختبار الأوكساسيلين، اختبار E) ضروري أمام كل عزل لمكورات رئوية في السائل الدماغي الشوكي.

البنيسيلين السحائي:

- عدد الجراثيم الحساسة على البنيسيلين في نقص = 10 - 30% ولكن لا يوجد مقاومة للسيفالوسبورين جيل 3.

الهيموفيلوس أنفلونزا:

- المقاومة على الأموكسيسيلين نتيجة إفراز البيتالكتاماز: 35 - 40% من الحالات.

ليستيريا:

- مقاومة طبيعية للسيفالوسبورين جيل 3.

- في حال عدم وجود نقص سكر الـ س. د. ش (سكر س. د. ش/سكر الدم <0.5) وإذا كان التناذر السحائي غير مترافق مع أعراض أخرى، فالمعالجة تتعلق ببروتين الـ س. د. ش.

- إذا كان البروتين >1 غ/ل، فالأمر يتعلق غالباً بالتهاب سحايا لمفاوي حاد على الأغلب فيروسي. التطور سليم مع شفاء من دون معالجة خلال بضعة أيام. هذا ويجب البحث أمام ظهور أقل عرض عصبي موضع أو اضطراب في الوعي عن التهاب السحايا والدماغ الحثي: تصوير طبقي محوري إسعافي، تخطيط دماغ كهربائي، PCR حثي في السائل الدماغي الشوكي.

- الالتهاب الأولي بالـ VIH يجب التفكير به خاصة عند المريض الشاب إذا كان قد تعرض لتلوث بالـ VIH أو في حال ترافق الصورة

- السريرية مع شلل في أحد الأعصاب القحفية أو مع تناذر وحيد النوى.
- إذا كان بروتين الس. د. ش < 1 غ/ل، فهناك احتمال لالتهاب سحايا بالليستيريا، أو التهاب سحايا سلي، أو بالكريبتوكوك (VIH) أو حثي. وأقل شك في أحد هذه العناصر يجب أن يوجهنا إلى البدء بالمعالجة المناسبة الاحتمالية.
- أسباب جرثومية أخرى أشد ندرة يمكن أن نشك بها وذلك حسب القصة السريرية: بروسيللا (دوكسيسيكالين + ريفامبين)، ليبتوسبيروز (بنيسيلين ج) مرض لايم Lyme (سيفترياكسون).

ج - عدد الخلايا طبيعي:

لا يوجد هنا التهاب سحايا، ولا يوجد أي استطباب لاستعمال الصادات الحيوية، ومع ذلك فإنه أمام حالة تناذر سحائي، هناك احتمال وجود التهاب سحايا جرثومي في بدايته (المكورات الرئوية، المكورات السحائية) أو التهاب سحايا بالكريبتوكوك (عند ناقصي المناعة) وهذا يدفعنا إلى الاحتفاظ بالمريض تحت المراقبة، مع العلم أن السائل الدماغي الشوكي قد أرسل للزرع. التشخيص هنا هو تفاعل سحائي نتيجة التهاب آخر. التهاب الجيوب، التهاب الحويضة والكلية، إلخ...

3. المعالجات المتممة أو المرافقة:

وجود علامات الخطورة تتطلب نقل المريض إلى العناية المشددة.

لا يوجد هناك استطباب للمعالجة بالصادات الحيوية داخل السائل الدماغي الشوكي في حالة التهاب السحايا البدئي أو الأولي.

هذا وينصح بإعطاء الكورتيزونات عند الطفل وعند البالغ لأنها تنقص الوفيات ونسبة حدوث العقابيل السمعية أو العصبية الحركية، يعطى هنا الديكساميثازون بوضع دقائق قبل إعطاء جرعة الصاد الحيوي الأولى، وذلك داخل الوريد بجرعة 0.6 مغ/كغ/يوم على 4 دفعات خلال 2 - 4 أيام. في حال التهاب السحايا السلي فإن فائدة الكورتيزونات تكون واضحة في الأشكال المختلطة بعلامات عصبية (1 مغ/كغ/يوم خلال 10 - 15 يوماً على الأقل).

جدول 6 - المعالجة المفضلة الواجب البدء بها في حالة التهاب السحايا الفيحي البدني (يجب إعادة تقويمها خلال 36 - 48 ساعة)

الفحص المباشر سلبي مع غياب عناصر موجهة للمسبب وغياب علامات الخطورة		
طريق الإعطاء	الجرعة مع/كغ/يوم	المصاد الحيوي
حديث الولادة > 3 أشهر	300 - 200	[سيفوتاكسيم
4 حقن	100 - 70	أو سيفترياكسون)
1 - 2 حقنة	300	+ أموكسيسيلين]
4 - 6 حقن	300 - 200	سيفوتاكسيم
4 حقن	100 - 70	أو سيفترياكسون
1 - 2 حقنة	فحص مباشر سلبي مع وجود عناصر موجهة للمسبب ووجود علامات خطورة	
العلاج المناسب	المسبب المحتمل	
حديث الولادة > 3 أشهر		
أموكسيسيلين	مكورات عقدية B	
[سيفالوسبورين ج3 + أمينوزيد]	جراثيم معوية	
[أموكسيسيلين + جنتاميسين]	ليستيريا مونوسيتوجين	
رضيع أو طفل < 5 سنوات		
سيفالوسبورين* جيل 3 مفضلة على الأموكسيسيلين	نيسيريا سحائية	
[سيفالوسبورين* جيل 3 + فانكوميسين**]	مكورات عقدية رئوية	
سيفالوسبورين جيل 3	هيموفيلوس أنفلونزا	
بالغ أو طفل < 5 سنوات		
[سيفالوسبورين* جيل 3 + فانكوميسين**]	مكورات عقدية رئوية	
[أموكسيسيلين ± جنتاميسين أو كوتريموكسزول]	ليستيريا مونوسيتوجين	
سيفالوسبورين* جيل 3 بشكل مفضل	نيسيريا سحائية	
[أموكسيسيلين + جنتاميسين]	ليستيريا مونوسيتوجين	
الحمل		
غياب العناصر الموجهة للمسبب مع وجود علامات خطورة		
حديث الولادة > 3 أشهر		
[أموكسيسيلين + سيفالوسبورين* جيل 3 + أمينوزيد]		
رضيع، طفل أو بالغ		
[أموكسيسيلين + سيفالوسبورين* جيل 3 + فانكوميسين**]		
* سيفالوسبورين جيل 3؛ سيفوتاكسيم أو سيفترياكسون.		
** فانكوميسين: 40 - 60 * مع/كغ/يوم، 4 حقن/يوم أو حقن مستمر (جرعة هجومية بنيتية 15 مع/كغ)		

* سيفالوسبورين جيل 3: سيفوتاكسيم أو سيفترياكسون.

** فانكوميسين: 40 - 60* مغ/كغ/يوم، 4 حقن/يوم أو حقن مستمر (جرعة هجومية بدنية 15 مغ/كغ)

4. إعادة التقويم

يجب القيام به بعد 36 - 48 ساعة وذلك حسب المعطيات السريرية.

البزل القطني مستطب فقط في حالة تطور سريري غير مناسب. وهو يفيد في

الحكم على فعالية المعالجة إذا كان السائل الدماغي الشوكي قد أصبح عقيماً وإذا كان هناك عودة إلى النسبة الطبيعية للسكر في السائل الدماغي الشوكي. المشعرات الأخرى الخلوية والبيوكيميائية ليست لها أية قيمة تشخيصية أو إنذارية. في حالة فشل المعالجة فإنه من المحبذ تعيير نسبة الصاد الحيوي في السائل الدماغي الشوكي.

5. مدة المعالجة

في حالة الاستجابة للمعالجة فهي 7 أيام بالنسبة للمكورات السحائية، 14 يوماً بالنسبة للمكورات الرئوية و 3 أسابيع بالنسبة لليستيريا.

3. المعالجة بالحقنات الحيوية لإلتهابات السحايا الثانوية

تحدث التهابات السحايا الثانوية بعد الرضوض (كسر جمجمة مغلق أو مفتوح، ثر أذني otorhée، ثر أنفي rhinorrhée) أو بعد تدخّل علاجي (مداخلّة عصبية جراحية، بزل قطني، حقن قرب الفقرات) التهابات السحايا هذه والحاصلة في المشفى (نوزوكوميالية) تسببها عضويات مجهرية آتية من المشفى، غالباً متعددة المقاومة (مكورات عنقودية مذهبية، مكورات عنقودية جلدية، عصيات غرام سلبية). الصاد الحيوي الأمثل لا يمكن اختياره إلا حسب معطيات اختبار التحسس الجرثومي للصاد الحيوي (أنظر فصل "21" عصيات غرام Θ ، و 23 "المكورات العقديّة والمكورات المعوية").

الصورة السريرية غالباً ما تكون خادعة، مع غياب التناثر السحائي في 50% من الحالات. هذا وإن وجود حمى معزولة، أو تغييرات في الحالة العصبية أو تطوّر غير طبيعي بعد الجراحة العصبية كلها تفرض القيام بالبزل القطني. المظهر العياني والنتائج الخلوية العضوية الكيميائية للسائل الدماغي الشوكي يمكن أن تتغير حسب الحالة (سائل نزفي، فرط بروتينات السائل الدماغي الشوكي بعد المرض...). الخلايا المحببة للسائل الدماغي الشوكي، نقص سكر هذا السائل، الفحص المباشر والزرع، كلها تسمح بالتشخيص الصحيح في الحالات الصعبة.

1. المعالجة بالصادات الحيوية:

المعالجة بالصادات الحيوية البدئية تُختار حسب المسبب المشكوك به، وحسب عوامل الخطورة الخاصة بالمريض (جدول 7 وجدول 8). المعالجة يجب أن تمتد عدة أسابيع مع تكييفها والمعطيات الجرثومية، والتطور السريري ومعطيات السائل الدماغي الشوكي. في حالة التهاب السحايا بالمكورات العنقودية الآتية من أجهزة التحويل أو التفجير، فإنه من المفضل غالباً سحب هذه الأجهزة ووضع تحويلات خارجية مؤقتة مكانها وذلك للحصول على تعقيم للسائل الدماغي الشوكي. في هذه الحالة الأخيرة استعمال الصادات الحيوية أصبح نادراً.

جدول 7 - عوامل الخطر

لانتهاج السحايا الجرثومي الثانوي

عوامل الخطر	العامل المسبب
كسر الجمجمة المغلق	مكورات رئوية، جراثيم معوية، هيروفيلوس أنفلونزا
كسر جمجمة مفتوح	مكورات رئوية، جراثيم معوية، هيروفيلوس أنفلونزا، مكورات عنقودية مذهب
ثر أنفي، ثر أنفي	مكورات رئوية، جراثيم معوية
جراحة عصبية	مكورات عنقودية (1)، عصيات غرام (2) (2)
لصام شرياني بطني	مكورات عنقودية مذهب، مكورات عنقودية جلدية

(1) بصورة عامة مقاومة للمبتيسيلين ومتعددة المقاومة (إنتان نوزوكوميالي).

(2) جراثيم معوية، بسودوموناس، عادة متحدة المقاومة (إنتان نوزوكوميالي).

جدول 8 - المعالجة بالصادات الحيوية

لانتهاجات السحايا الجرثومية الثانوية

العوامل المسبب	المعالجة بالصادات الحيوية
مكورات رئوية	إسيفالوسبورين جيل 3 ⁽¹⁾ + فانكوميسين ⁽²⁾
هيروفيلوس أنفلونزا	سيفالوسبورين جيل 3 ⁽¹⁾
جراثيم معوية ⁽³⁾	سيفالوسبورين جيل 3 ⁽¹⁾
بسودوموناس أيروجينوز ⁽³⁾	إسيفتازيديم + (فوسفوميسين) ⁽⁴⁾ أو سيروفلوكساسين ⁽⁵⁾
مكورات عنقودية مذهب ⁽⁵⁾	فانكوميسين ⁽²⁾ . إذا كانت حساسة على الفوسفوسين: سيفالوسبورين
مكورات عنقودية جلدية ⁽⁵⁾	جيل 3 ⁽¹⁾ + فوسفوميسين ⁽⁴⁾

تعديل المعالجة حسب اختبار التحسس الجرثومي للصاد الحيوي
إجباري

- (1) سيفوتاكسيم 200 - 300 مغ/كغ/يوم أو سيفترياكسون 70 - 100 مغ/كغ/يوم.
- (2) فانكوميسين: 40 - 60 مغ/كغ/يوم، 4 حقن أو حقن مستمر (جرعة هجومية 15 مغ/كغ).
- (3) جراثيم معوية، بسولوموناس سيبسيا، بشكل عام متعددة المقاومة (إنتان نوزوكوميالي).
- (4) فوسفوميسين 200 مغ/كغ/يوم.
- (5) بشكل عام مقاومة للميتيسيلين ومتعددة المقاومة (إنتان نوزوكوميالي).

2. المعالجة المرافقة:

لا يوجد هنا استطباب لاستعمال الكورتيزونات، حتى في حال وجود صورة سريرية خطيرة مع صدمة إنتانية. هذا وإن وجود احتمال حدوث إصابة للوظائف الحياتية أو صدمة إنتانية فهذا يتطلب نقل المريض إلى وحدة عناية مشددة.

المعالجة الوقائية

1. المعالجة الوقائية بالصادات الحيوية في حالات التماس مع المريض:

1. المعالجة الوقائية بالصادات الحيوية لالتهاب السحايا بالمكورات السحائية: تطبق هذه الوقاية على الأشخاص الذين كانوا بتماس شديد أو متكرر مع المريض خلال الأيام العشرة السابقة لبداية علامات المرض، بشكل خاص الأشخاص الذين يعيشون معه في المنزل نفسه، أو الذين ناموا في غرفته، والأشخاص العاملين معه أو المرافقين له (مدارس، حضانات إلخ...). القانون الفرنسي DGS/SD5C/2002/40 الصادر في 15 تموز 2002 يستطب (صورة 3): إعطاء الريفامبيسين لمدة يومين (عند البالغ 600 مغ مرتين/يوم، عند الطفل من 1 - 15 سنة: 10 مغ/كغ/يوم، عند الطفل أقل من شهر: 5 مغ/كغ مرتين باليوم). عندما يكون هناك مضاد استطباب للريفامبيسين (حمل، عدسات لاصقة، إلخ...) يمكن استعمال السبيراميسين (3 ملايين وحدة عالمية مرتين باليوم عند البالغ و 75000 وحدة عالمية/كغ مرتين باليوم عند الطفل لمدة 5 أيام). في حالة التهاب بالمكورات السحائية A، C، W135، أو Y فإننا نرفق

هذه المعالجة بالطعم (الزمرة الجرثومية يجب أن ترسل إلى المركز الوطني المرجعي).

المريض نفسه يجب أن يتلقى هذه المعالجة الوقائية، وذلك بعد المعالجة الشافية (هذه الأخيرة لا تسمح في أغلب الحالات بالقضاء على بوابة الدخول الحنجرية) إلا إذا كانت المعالجة بواسطة السيفالوسبورين جيل 3.

كل حالة التهاب سحايا بالمكورات السحائية يجب أن تعلن مباشرة للجهات المختصة.

2. المعالجة الوقائية بالصادات الحيوية لالتهاب السحايا بالهيموفيلوس أنفلونزا:

إنها تستند على إعطاء الريفامبيسين 20 - 40 مغ/كغ/يوم لمدة 4 أيام من دون تجاوز 600 مغ/يوم، هذه الجرعة يمكن تطبيقها منذ عمر الشهر وهي تطبق على الأشخاص الذين كانوا بتماس مع المريض: عائلة المريض حتى البالغين منهم، وتعطى هذه المعالجة للطفل إذا كان عمره أقل من 4 سنوات إذا كان يعيش في نفس المنزل، وأخيراً فإنها تعطى للأطفال والبالغين المرافقين للطفل مكان وجوده (حضانة، إلخ...).

2. اللقاح:

1. اللقاح المضاد للمكورات السحائية:

يوجد حالياً 3 لقاحات: لقاحان متعدد السكاكر $Y+W135+C+A$ و $C+A$ (Ménomune) ولقاح C conjugué monovalent (Meningitec، Méninact)، وهذا ولا يوجد لقاح مضاد للمكورات السحائية زمرة B. • في حالة وجوب التهاب سحايا فإن اللقاح يقترح على عائلة المريض وعلى هؤلاء الذين يتواجدون مع المريض في منطقة تجمع (حضانة، مدرسة، إلخ...).

في هذه الحالات يجب أن يعطى اللقاح بأسرع ما يمكن وخلال العشرة أيام الأولى التي تلي دخول المريض إلى المشفى.

المضادات الجسمية تظهر خلال 5 - 8 أيام وتبقى 3 - 4 سنوات.
 اللقاح C conjugué monovalent هو الوحيد الفعال عند الأطفال وذوي
 الأعمار أقل من عامين.

• حالات أخرى:

- مسافرون أو مقيمون في منطقة موبوءة أو منطقة يوجد فيها المرض
 بشكل دائم، اختيار اللقاح يكون حسب الزمرة الجرثومية المسببة
 وحسب العمر.
- أطفال يشكون من نقص في الجزء النهائي للمتمة، (مرضى فاقدن
 للطحال تشريحياً أو وظيفياً).

2. اللقاح المضاد للهيموفيلوس أنفلونزا زمرة B:


يعطي اللقاح حماية كاملة تقريباً ضد التهاب السحايا المسبب من
 الهيموفيلوس أنفلونزا وبفضله اختفى هذا الالتهاب بشكل كامل تقريباً من
 فرنسا. إنه يشكل جزءاً من رोजनाة لقاحات الرضع. ويعطى منذ عمر
 الشهرين، في نفس الوقت مع اللقاح DTC. Polio، وذلك بتحقيق 3 حقن
 متباعدة الواحدة عن الأخرى بفترة شهر. مع حقنة تذكير في الشهر الـ 18.
 إذا لقح الطفل ما بين 6 - 12 شهراً فإنه يعطى حقنتين بفارق شهر
 بين الواحدة والأخرى ومن ثم حقنة التذكير في الشهر 18. إذا لقح الطفل ما
 بين 1 - 5 سنوات: يعطى هنا حقنة واحدة.

3. اللقاح المضاد للمكورات الرئوية:

كل مريض شفي من التهاب سحايا بالمكورات الرئوية يجب أن يتلقى
 اللقاح.

يوجد لقاحان مضادان للمكورات الرئوية:

- لقاح متعدد السكاكر ذو 23 مكافئ.
 - لقاح مرافق (conjugué) ملتصق على 7 مكافئات.
- هذا وتحمي هذه اللقاحات من الإنتانات الاختراقية للمكورات الرئوية التي
 لها نفس زمرة اللقاح.



6. إنتانات الجهاز العصبي المركزي (باستثناء التهاب السحايا)

تتضمن هذه الإصابات التهابات الدماغ، التهابات السحائية - الدماغية الحادة، الخراجات والدَّبِيلَة (empyème) داخل الجمجمة، التهابات الوريد الخثرية الإنتانية، الإنتانات النخاعية وإنتانات الأم الجافية. هذه الإصابات يجب أن تفرق عن التهابات الدماغ الحادة السمية، أو الاستقلابية أو الهيموديناميكية أو حتى المناعية والتي يمكن أن تحدث عند الإصابة بمرض إنتاني ما. هذه الإنتانات يمكن أن تتطلب معالجة إسعافية خاصة، لذلك تشخيصها السريع له أهمية بالغة.

1. التهابات الدماغ والتهابات السحائية الدماغية

1. العلامات السريرية:

اضطرابات في الوعي (نتراوح من الخدر حتى السبات) وفي التصرف، اختلاجات وعلامات توضعية عصبية تشكل الصورة السريرية الرئيسية. الحمى تكون موجودة ومرتفعة في بعض الحالات (الحال)، أو غائبة في حالات أخرى (فيروس بابوفا). في بعض الأحيان تترافق الصورة السريرية مع تناذر سحائي، هذا ويجب البحث عن علامات أخرى غير عصبية (طفح، ضخامة طحال...).

2. الاستجواب:

السوابق (طعوم، سفر ومعالجة وقائية مضادة للملاريا (البرداء)، المهنة، الهوايات، الإيجابية المصلية للـ (VIH)، تاريخ وكيفية ظهور العلامات الأولى والمعالجة السابقة.

3. الفحوص المكملة:

- التصوير الطبقي المحوري والمرنان المغناطيسي يظهران صوراً خاصة للآفات: خراج، تنخر (بصورة خاصة صدغي في حالة الحلا)، التهاب الدماغ بفيروس الشلل، أو التهاب الدماغ الشامل، وذمة، علامات انضغاط.
- السائل الدماغي الشوكي: كونه طبيعياً لا ينفي الإصابة بالتهاب الدماغ. في حال كونه صاف مع صيغة ذات لمفاويات مسيطرة أو مختلطة يؤدي إلى الشك بأصل فيروسي مع العلم أنه لا يمكن نفي سبب جرثومي بشكل قاطع، أما إذا كان السائل الدماغي الشوكي قحيماً فالسبب جرثومي بالتأكيد.
- تخطيط الدماغ الكهربائي: يمكن أن يظهر علامات لنوبات صرعية (صرع تحت السريري) علامات أذية دماغية موضعية (وحيدة أو ثنائية الصدغ، باكرة في حالة الحلا) أو منتشرة.
- العينات:

- سحب الدم: زرع الدم، البحث عن الملاريا فالسياروم، هذا البحث يجب إعادته إذا كانت الوقاية غير مناسبة، الفحوص المصلية.
- السائل الدماغي الشوكي: زرع (جرثومية، فيروسية، وفطرية)، PCR فيروسي (حلاً) عيار الأنترفرون (يثير الشبهة بالأصل الفيروسي إذا كان مرتفعاً)، البحث عن المكورات المستخفية (Cryptocoque) (حبر الصين، مستضدات).

4. الأسباب:

- التهاب السحايا والدماغ الفيروسي (جدول 1). السبب الحثي خطر ويجب التفكير به دائماً: يمكن أن يحدث في أي عمر، عادة في غياب أي نقص للمناعة. المعالجة الاحتمالية بواسطة الأسيكلوفير داخل الوريد يجب أن توصف عند أدنى شك. التهابات الدماغ بالـ VIH وفيروس الاندخال الخلوي العرطل CMV (في حالة الإصابة بالسيدا) وبفيروس الحلا المنطقي، تعالج كل منها معالجة خاصة بها، هذا ولا يوجد معالجة مضادة للفيروس فعالة في حالة فيروس بابوفا (LEMP) أو التهابات الدماغ الفيروسية الأخرى.

جدول 1 - التهابات الدماغ الفيروسية: الأسباب الرئيسية

فيروس الحلأ البسيط، VIH (الإنتان الأولي أو إنتان منطور)، فيروسات معوية، فيروس الاندخال الخلوي العرطل (سيدا)، فيروس الحلأ المنطقي، فيروس أربو، أدينوفيروس، فيروس النزلة الوافدة، فيروس بابوفا (LEMP)، الكلب، الحصبة، الوردية الوافدة، النكاف، الحمق.

جدول 2 - أسباب جراثومية، فطرية أو طفيلية لالتهابات الدماغ الإنتانية

(مسائل دماغية شوكي صافي)

جراثومية: سل، ليستيريا، بروسيللا، مرض لاي، لبيتوسيرا

طفيلية: بالوديزم فالسيباروم، توكسوبلاسموز (سيدا)، تريبانوزوما

فطرية: للمكورات المستخفية (Cryptococque)

جدول 3 - معالجة التهابات السحائية الدماغية الحادة مع عناصر موجهة

عناصر موجهة	المسبب	المعالجة الأولية الواجب اتباعها
التهاب دماغ حاد متوضع (تخطيط)	فيروس الحلأ	أسيكلوفير داخل الوريد (في حالة الحاجة يمكن مرافقته في الأيام الأولى مع معالجة أخرى احتمالية)
التهاب دماغ متوضع (أعصاب)	ليستيريا	أموكسيسيلين، أمينوزيد
قحفية، التهاب مؤخر الدماغ)	سل	مضادات السل
غياب العناصر الموجهة	فيروس الحلأ	أسيكلوفير داخل الوريد
	ليستيريا	أموكسيسيلين + أمينوزيد
	سل	مضادات السل
إقامة في بلد موبوء	بالوديزم فالسيباروم	كينين داخل الوريد
سيدا (تصوير طبقي محوري، مرنان)	توكسوبلاسموز	بيريميثامين + سلفاديازين
سيدا (حبر صيني، اختبار المستخفية)	المستخفية (كريبيتوكوك)	أفونيريسين $5FC \pm B$

2. التهابات الدماغية المعدية

التهاب الوريد الخثري

يجب الشك بها عندما يوجد التهاب في منطقة مجاورة للسحايا (التهاب جيوب، التهاب أذن، التهاب أسنان)، أو بعد الجراحة العصبية. الخطورة الكبيرة هنا هي حصول اندخال مفاجئ للدماغ بسبب الودمة الدماغية. إن مضاد استطباب البزل القطني قطعي هنا.

بزل الدبيلة الدماغية أو الخراج - إذا كان ممكناً - يسمح بالفحص المباشر وزرع القيح، ويساعد على اختيار المعالجة مع العلم أن زرع اللاهوائيات هو زرع مشكوك فيه وتعدد العضويات المجهرية كثير المصادفة. في حال غياب هذا الفحص فالمعالجة تبقى احتمالية وتوجه حسب فوهة دخول الإنتان واستطاعة الصاد الحيوي الوصول إلى الدماغ (جدول 4).

جدول 4 - المعالجة الاحتمالية بالصادات الحيوية للخراجات والدبيلات الدماغية ولالتهاب الوريد الخثري الإنتاني

باب الدخول	المسبب	المعالجة	المعالجة البديلة
أنفي، نكفي، جيبى	مكورات عقدية هوائية ولاهوائية	أسيكلوسبورين جيل + 3 ميترونيدازول	إيميبينيم أو فليكنول
قصبي رئوي	باكثيرويد سيبسيا		
سني	جراثيم معوية		
بعد الرض	مكورات عقدية	[(سيفوتاكسيم أو سيفترياكسون) + فوسفوميسين]	[إيميبينيم + فانكوميسين]
وبعد العمل الجراحي	مكورات عقدية جراثيم معوية		
	كلوستريديام سيبسيا		

3. الإنتانات الإنتاعية وإنتانات الأم الحبيطة

- الصورة السريرية: تتضمن حمى، آلام فقرية وعلامات نخاعية. هذا ويجب البحث عن التهاب شغاف قلب إنتاني، حادثة تجرثم دم، بؤرة إنتانية بولية، تناسلية، جلدية، إلخ...، حالي أو خلال الأسابيع السابقة، الفحوص المكملّة تضم صور النخاع الشوكي (المرنان المغناطيسي يعطي علامات أبكر من التصوير الطبقي المحوري)، زرع الدم، البزل القرصي الفقري في حالة التهاب الجسم الفقري أو في حالة احتمال وجود خراج حول الفقرة، فحوص مصلية، تحليل السائل الدماغي الشوكي، البزل القطني يجب ألا يجرى إلا بعد النفي القاطع لوجود أي شك بانضغاط النخاع الشوكي.

- الأسباب مختلفة حسب المظهر السريري:
 - التهاب الأم الجافية: مكورات عنقودية مذهبية، سل.
 - التهاب الفقرات: مكورات عنقودية مذهبية، سل، عصيات غرام \ominus ، بروسيللا.
 - التهاب النخاع الشوكي الحاد: الفيروسات المعوية (المتضمنة فيروس شلل الأطفال)، فيروس الحلا المنطقي، فيروس الاندخال الخلوي العرطل، التهاب الجذور العصبية (سيدا)، مرض لايم.
 - التهاب الدماغ والنخاع الشوكي: مرض لايم، ميكوبلاسما، الكلب.
- المعالجة: يجب أن تكون إسعافية وهي تتضمن:
 - معالجة جراحية في حالة وجود علامات نخاعية، خراج.
 - معالجة مضادة للمكورات العنقودية.

7. التهابات القصبات والرئة الشائعة

الخطوط العريضة التي يجب اتباعها:

- التعرف على الإنتان التنفسي العميق: تشخيص الإنتان التنفسي العميق يركز على العلامات التالية: الحمى + العلامات المرافقة للإنتان (ارتعاشات، آلام عضلية إلخ...) مترافقة مع:
 - سعال ± قشع قيحي.
 - ألم صدري ثابت ومستمر.
 - إصابة تنفسية عميقة مثبتة بالفحص السريري (بؤرة، خراخر قصبية...).
- هذا وينصح بإجراء صورة للصدر، إذا كانت هذه الأخيرة غائبة أو غير نموذجية وعند المرضى ذوي الخطورة المرتفعة أو الهشين فإنها تسمح برؤية الإصابة النسيجية، وامتدادها وهل هي سنخية أو بين الخلوية، أو مرض آخر مرافق (سل، سرطان، انصباب جنب).
- قرار وضع المريض في المشفى استناداً إلى خصائص معينة.
- تقويم خطورة ذات الرئة الشائعة.
- تطبيق معالجة احتمالية بالصادات الحيوية آخذين بعين الاعتبار الوبائية، ماهية وحساسية المسبب، الخصائص الحركية والدوائية الهيموديناميكية للصادات الحيوية، حالة المريض ووجود علامات خطورة.

1. ذات الرئة الحادة، الإنتان

1. توجيه المريض المصاب بإنتان تنفسي عميق:

1. الخصائص الموجهة إلى إدخال المريض إلى المشفى (جدول 1):

الطبيب المعالج يقرر إدخال المريض إلى المشفى ليس فقط وفقاً للخصائص السريرية، ولكن أيضاً وفقاً لمعرفة لحالة المريض العامة ولمحيطه الاجتماعي - الاقتصادي.

2. الخصائص الموجهة إلى إدخال المريض إلى قسم العناية المشددة (جدول 2):
2. تقويم مستوى الخطورة:

من المهم تعيين مستوى الخطورة الفوري للإنتان (جدول 3).

3. تقويم إنذار المرض عند فحص المريض الأولي:

محصلة فين Fine، التي استعملت كثيراً في الدراسات السريرية، تسمح بوضع إنذار باكر للمرضى المصابين بذات الرئة. مرض الصف الأول (عمر ≥ 50 عاماً، لا يوجد أي مرض مرافق، غياب العلامات الخمسة المبحوث عنها بالفحص السريري) إنهم مرضى غير مهددين أو مهددين بشكل قليل (نسبة الوفيات = 0.1%) وهم يعالجون في المنزل عادة.

جدول 1 - متى يجب إدخال المريض إلى المشفى

عند ترافق تشخيص التهاب الرئة بخاصتين على الأقل	بقاء المريض في المنزل غير ممكن
من الخواص التالية	
● عمر < 56 عاماً	● شروط معيشية اجتماعية اقتصادية سيئة
● ارتفاع الحرارة < 38.3°	● مريض يعيش وحيداً
● نقص المناعة	● مريض غير قادر على متابعة العلاج
● خطورة فقد معاوضة تنفسية قلبية، كلوية أو سكري	
● ذات رئة استشفائية أو نتيجة وجود عائق تنفسي	
● مسبب إنتاني ذو إنذار سيئ	
● مكورات عنقودية، عصيات غرام ⊖	

جدول 2 - متى يجب إدخال المريض إلى العناية المشددة

- نظم التنفس < 30 دقيقة عند فحص المريض.
- $250 > \text{FiO}_2 / \text{PaO}_2$ مم زئبقي.
- ضرورة اللجوء إلى جهاز التنفس الاصطناعي.
- إصابة ثنائية الجانب أو متعددة الفصوص أو زيادة حجم الآفة الظليلة على الصورة الشعاعية < 50 % خلال الـ 48 ساعة التالية لقبول المريض في المشفى.
- حالة صدمة (ضغط شرياني انقباضي < 90 مم زئبقي أو ضغط شرياني انقباضي < 60 مم زئبقي)، ضرورة معالجة بالأدوية المقبضة للأوعية خلال مدة < 4 ساعات.
- كمية البول < 20 مل/سا أو كمية البول خلال 4 ساعات < 80 مل وذلك في غياب وجود سبب آخر لشح البول هذا، أو قصور كلوي حاد يتطلب تحاللاً اصطناعياً.

جدول 3 - تقويم الخطورة الفورية لذات الرئة الحادة الشائعة

سريريا	شدة حياتية (Détresse vitale)	ضغط شرياني انقباضي >90 مم زئبقي
		نظم القلب <140/دقيقة
		نظم التنفس <30/دقيقة
		اضطرابات في الوعي، زرقة، تعرق، لون رخامي، شح البول
	انتشار الإنتان	التهاب مفاصل إنتاني، تظاهرات عصبية
شخص مخبرية	PaO_2 >60 مم زئبقي	هيماتوكريت <30%
	Na <130 ملي مول/ل	كرياتينين الدم <250 ملي مول/ل
	نقص الكريات البيض >1000/مم ³	

جدول 4 - محصلة فين Fine

العوامل	التقاط	العوامل
عوامل ديموغرافية		
العمر	ذكور	عمر
إناث		
10 +		إقامة في تجمع
30 +	أمراض سرطانية	الأمراض المرافقة
20 +	مرض كبدي	
10 +	قصور قلب احتقاني	
10 +	أمراض وعائية دماغية	
10 +	أمراض كلوية	
		معطيات الفحص الفيزيائي
20 +	إصابة الوظائف الدماغية	
20 +	نظم التنفس <30/دقيقة	
20 +	الضغط الانقباضي <90 مم زئبقي	
15 +	حرارة >30° أو <40°	
10 +	نظم القلب <125/دقيقة	
		معطيات بيولوجية وشفاعية
30+	PH شرياني >7.35	
20 +	بولة <11 ملي مول/ل	
20+	Na <130 مل مول/ل	
10+	سكر الدم <14 ملي مول/ل	
10+	هيماتوكريت <30%	
10+	PaO_2 >60 مم زئبقي	
10+	انصباب جنب	

صف II:
نقاط ≤70
وفيات 0.6 - 0.7%
صف III:
71 - 90 نقطة
وفيات 0.9 - 2.8%
صف IV:
91 - 130 نقطة
وفيات 8.2 - 9.3%
صف V:
نقاط <131
وفيات 27 - 31%

4. تشخيص السبب (جدول 5، جدول 6):

1. التشخيص الميكروبيولوجي:

يحقّق في 30 - 50% فقط من حالات ذات الرئة الحادة الشائعة. زرع الدم يبقى أفضل وسيلة لكشف العامل الجرثومي المسبب لذات الرئة. باستثناء بعض الحالات السريرية الخاصة المثيرة للشبهة بجرثوم معين (ذات الرئة الحادة الواضحة الفصية والعائدة للمكورات الرئوية) فإن أغلب الإنتانات القصصية الرئوية لا تدخل في تصنيف مرضي محدد. ولهذا فإن المعالجة بالصادات الحيوية تكون احتمالية في أغلب الحالات. عمر المريض والقصة السريرية (قصة الحالة الحالية، السوابق، حالة المريض العامة، عاداته الحياتية...) تساهم كلها في توقع الإصابة بجرثوم معين (جدول 5، جدول 6).

من المهم أيضاً معرفة إذا كان هناك قصة وباء أو لا:

- نزلة وافدة، فيروسات تنفسية أخرى، إثنان بالفطريات الرئوية
- *Mycobacterium Pneumonia* أو بالكلوستريديام الرئوية.
- في حال حدوث عدة حالات متزامنة بعد إصابة معينة، يجب أن يدفعنا للبحث عن فيروس السعال الديكي، الليجيونيللا، الحرارة Q، السل.

2. متى يجب تحقيق سحب العينات:

كل ذات رئة حادة شائعة تطلبت المعالجة في المشفى يجب معرفة سببها الجرثومي (زرع دم، المستضدات البولية بالنسبة لليجيونيللا والمكورات الرئوية، بزل الجنب). العينات الموضعية (شفط داخل قصبي كمي، غسل قصبي سنخي، الجرف البعيد المحمي) مستطبة في حالة وجود علامات خطورة، أو فشل المعالجة بالصادات الحيوية أو وجود سوابق قريبة لإنتان قصبي رئوي، أو لمعالجات متكررة بالصادات الحيوية لمريض هش أو ضعيف المناعة.

3. المقاومة الجرثومية وانعكاساتها العلاجية:

إن العدد المتزايد من زمر المكورات الرئوية ذات الحساسية الناقصة على البنيسيللين فرض استعمال جرعات دوائية عالية، وهكذا فإن جرعة 1 غ/8

ساعات فمويًا من الأموكسيسيلين لها توزع بيولوجي في النسيج الرئوي والقصبات بشكل يكون فيه الدواء فعال حتى على الزمر المقاومة (التركيز المثبط الأصغر يعادل 4مغ/ل).

هذا ويجب ألا يستعمل السيفالوسبورين جيل 1 في معالجة ذوات الرئة الحادة (لأن هذه الأدوية غير فعالة بشكل كاف على المكورات العقدية الرئوية والجراثيم المعوية) والسيفالوسبورين جيل 3 فمويًا (غير فعالة بصورة كافية على المكورات العقدية الرئوية، وذلك لخواص الحركة الدوائية الغير نموذجية، مع إمكانية معاوضة هذا النقص بواسطة زيادة الجرعة حيث أن هذه الزيادة تكون غير محتملة من قبل المريض، بالإضافة إلى عدم التوزع البيولوجي الجيد والسعر المرتفع).

البفلوكساسين، الأوفلوكساسين والسيبروفلوكساسين غير مستطبة في معالجة ذوات الرئة المسببة من المكورات الرئوية. الكينولونات المضادة للمكورات الرئوية (ليفوفلوكساسين، موكسيفلوكساسين) وذلك بفضل تركيزها المثبط الأصغر للخاص بها وخواصها الحركية الدوائية، فعالة على المكورات العقدية الرئوية (حتى زمرها المقاومة للبنيسيلين) مما يسمح باستعمال هذه الأدوية وحيدة. بالطبع الحالات الشديدة تتطلب استعمال صادات حيوية عن طريق الوريد منذ البداية.

التيليتروميسين (أول كيتوليد مستعمل)، فعال على المكورات العقدية الرئوية المقاومة للماكروليد والبنيسيلين وهو مستطب كنواء بديل للأموكسيسيلين وللماكروليدات، في حالات ذوات الرئة ذات الخطورة الضعيفة إلى المتوسطة.

فيما يتعلق بالهيموفيلوس أنفلونزا، فإن الزمر المعزولة ذات الإفرازات القصبية تكون مقاومة للبنيسيلين A بنسبة 35%، وما بين 35 - 50% بالنسبة للماكروليدات، الهيموفيلوس أنفلونزا قليلة الحساسية على التيليتروميسين، الجراثيم الفطرية كاتارليس مقاومة غالباً للبنيسيلين وذلك لإفرازها للبيتا لاكتاماز. هذا وإن مثبطات البيتا لاكتاماز تسمح باستعادة الحساسية لغالبية هذه الزمر على الأمينوبنيسيلين، السيفالوسبورين جيل 2، والسيفالوسبورين جيل 3 فعالة على هذه الجراثيم.

الجراثيم داخل الخلوية أو الغير عادية atypiques مقاومة عادة للبيتا لاكتامين. الصادات الحيوية المرجعية هي: السيكلين، الماكروليد، الكيتوليد، الكينولون بالنسبة للجراثيم الفطرية الرئوية وللكلاميديا الرئوية، الكينولون والماكروليد والريفاميسين بالنسبة لليجيونيلا الرئوية، السيكلين بالنسبة للكلوستريديام بيسيتاسي، والكلوستريديام بورنيتي.

5. القرارات العلاجية:

مهما كان العلاج فإن إعادة تقويم الحالة ضروري بعد 48 - 72 ساعة، في حالة فشل المعالجة، وبعد التحليل الدقيق لهذا الفشل، فإنه من المفضل تكميل طيف المعالجة بالصادات الحيوية أو توجيهها حسب المعطيات الجرثومية إذا كانت متوفرة. هذا وكون الإنتان موجوداً منذ فترة طويلة يجب أن يدفعنا للشك بداء السل. تقويم الخطورة، المقدرة على متابعة العلاج، حالة المريض العامة، العمر، الصورة التشريحية السريرية التي تقوم بشكل أفضل بواسطة الفحوص المكملة (صورة شعاعية، تصوير طبقي محوري) كلها تتدخل في القرار العلاجي.

6. اللقاحات:

1. اللقاح المضاد للمكورات الرئوية:

اللقاح المتعدد السكاكر ذو 23 مكافئ، مستطب عند الأشخاص الذين أعمارهم > سنتين والذين تعرضوا لإنتانات خطيرة أو متكررة عائدة للمكورات الرئوية.

- الأشخاص ذوي المناعة الناقصة: مستأصلي الطحال، أشخاص مصابين بالتناذر النفروزي.

- الأشخاص المصابين بقصور تنفسي، قلبي، كلوي، كبدي...

- الأشخاص المصابين بالتهاب القصبات المزمن، الكحوليين.

- المرضى الذين أصيبوا بواحد أو عدة إنتانات شديدة بالمكورات الرئوية.

هذا وإن إعطاء اللقاح بشكل روتيني للأشخاص المسنين (< 65 سنة)،

ولا سيما الذين يعيشون في مجتمعات، يعتبر ضرورياً.

2. اللقاح المضاد للنزلة الوافدة:

إعطاء هذا اللقاح سنوياً للمرضى ذوي المقاومة الضعيفة والمعرضين للإصابة بالتهاب القصبات والرئة مفيد وقد أثبت ذلك بشكل واضح. منذ عام 2000 هذا اللقاح منسوح به (وهو معوض من قبل التأمين الصحي) للأشخاص الذين عمرهم < 65 سنة أو مصابين بأمراض مزمنة. لللقاحات المضادة للنزلة الوافدة والمضادة للمكورات الرئوية إذا أجريت في وقت واحد، يبدو أنها ذات فائدة متكاملة عند المرضى الذين عمرهم < 65 سنة أو المصابين بمرض تنفسي مزمن.

2. الإحتلالات القصبية (جدول 10)

المعالجة تتعلق بوجود التهاب قصبات مزمن أو عدمه، وبشدة القصور التنفسي في حال حدوثه.

1. التهاب القصبات الحاد:

التهاب القصبات الحاد عند الشخص السليم لا يتطلب معالجة بالصادات الحيوية.

2. التهاب القصبات المزمن:

استمرار القشع لفترة أكثر من 7 أيام ليست كافية للمعالجة بالصادات الحيوية.

3. التفاقم الحاد لالتهاب القصبات المزمن:

ليس كل تفاقم حاد لالتهاب القصبات المزمن يكون من أصل إنتاني. المعالجة بالصادات الحيوية لمدة 7 - 10 أيام يجب أن يحتفظ بها للحالات التي يكون فيها الشك مرتفع بوجود إنتان: حرارة مترافقة على الأقل بـ 2 - 3 علامات مذكورة في تصنيف أنتونيزن Anthonisen (اشتداد الزلة التنفسية، ازدياد حجم القشع، وخاصة عندما يصبح القشع قيحياً). كما يجب أن نأخذ بعين الاعتبار:

- وجود تناذر تنفسي ساد.
- العدد السنوي لهجمات التفاقم الحاد (جدول 10).

4. المعالجة المرافقة:

المعالجة الفيزيائية لإزالة المفرزات مستطبة لفترة قصيرة. مضادات السعال غير مستطبة. من الموصى به البدء بإعطاء أو زيادة جرعة الموسعات القصبية المحرصة لمستقبلات B أو المضادة للفعل الكولينري. في حالة تشنج قصبات مرافق، فإنه يمكن اقتراح المعالجة بالكورتيزونات عن الطريق الفموي لفترة قصيرة إلا في حالة وجود مضاد استطباب.

5. الفحوص المكملّة الممكن إجراؤها بعد فترة:

تنظير القصبات عند المدخنين، فحوص أنف، أنف، حنجرة (صور للجيوب)، البحث عن وجود بؤرة سنية.

جدول 5 - الدراسة الوبائية الجرثومية لذات الرئة الحادة الشائعة

وذلك استناداً إلى العمر

- طفل > 6 سنوات، إبتان النزلة الوالدة، الحصبة، السعال الديكي: هيروفيلوس أنفلونزا، مكورات عقدية رئوية، مكورات عقدية مذهبية، مكورات عقدية قبيحية.
- طفل < 6 سنوات: مكورات عقدية رئوية.
- مرافق أو بالغ شاب: جراثيم فطرية رئوية، كلوستريديام رئوية.
- بالغ < 44 سنة: مكورات عقدية رئوية، ليجيونيللا رئوية.
- الشخص المسن: مكورات عقدية رئوية، هيروفيلوس أنفلونزا.

جدول 6 (1) - الدراسة الوبائية الجرثومية لذات الرئة الحادة الشائعة

وذلك استناداً إلى المظهر السريري

- قصور تنفسي حاد، التهاب قصبات ساد مزمن: مكورات عقدية رئوية، جراثيم معوية، مكورات عقدية، هيروفيلوس أنفلونزا، جراثيم فطرية كاتارليس. في مرحلة متقدمة للسودوموناس سيبسيا.
- الكحوليين: مكورات عقدية رئوية، كليبيسيلا رئوية، اللاهوائيات.
- داء الزوجة المخاطية: Mucoviscidose: بسودوموناس سيبسيا، مكورات عقدية.
- ذات الرئة الاستشفائية: ترافق عصيات غرام سلبية مع اللاهوائيات.
- VMI: مكورات عقدية رئوية، هيروفيلوس أنفلونزا، بسودوموناس أيروجينوزا.

جدول 6 (2) - الدراسة الوبائية الجرثومية

استناداً إلى المظهر السريري

المسبب الإثنائي	حالة المريض العامة
مكورات عقدية رئوية	عمر < 65، كحولي، إثنان بالـ VIH
الجراثيم الفطرية الرئوية	شخص يعيش في مجمع: مدارس، إلخ...
ليجيونيلا سيبريا	مدخن، كحولي، ناقص المناعة، مصدر تلوث مائي هوائي
النزلة الوافدة	وجود وباء
بسودوموناس كاريني	مدمن على المخدرات، إثنان VIH معروف، ممارسات جنسية ذات خطورة
العصيات السلية	كحوليين، نقص مناعة (إثنان بالـ VIH، معالجة بالكورتيزونات) وسط اجتماعي منخفض، إيمان على المخدرات

جدول 7 - المعالجة بالصادات الحيوية لذات الرئة الحادة الشائعة

عند البالغ السليم من دون علامات خطورة

الحالة العامة	الصاد الحيوي ذو الخيار الأول	عدم التحسن بعد 48 ساعة
عمر ≤ 40 سنة أو ذات رئة	أموكسيسيلين 1 غ \times 3/يوم	ماكروليد أو كينولون مضاد
حادة شائعة سنخية	فموياً أو تيلتروميسين	للمكورات الرئوية فموياً أو منفرداً
ذات رئة حادة شائعة ما بين	ماكروليد (باستثناء	أموكسيسيلين أو كينولون
الخلايا وعمر < 40 سنة	الأزيترومايسين) أو تيليتروميسين	مضاد للمكورات الرئوية فموياً ومنفرداً

جدول 8 - المعالجة بالصادات الحيوية

لذات الرئة الحادة الشائعة، من دون علامات خطورة عند البالغ،

الذي عنده عوامل خطر، المعالجة خارج المشفى

أو في شعبة الأمراض الداخلية في المشفى

الخيار شخصي هنا، وهو يأخذ بعين الاعتبار طبيعة عوامل الخطر، الحالة السريرية، الجراثيم المختلفة المشكوك بمسؤوليتها، المكورات الرئوية تبقى السبب الرئيسي.

للمعالجة يمكن أن تكون مماثلة لتلك المطبقة على البالغ السليم (أموكسيسيلين 3 غ/يوم، أو

تيليتروميسين) أو يمكن أن يلجأ إلى معالجة ذات طيف أوسع (أموكسيسيلين - حمض

الكلافولينيك، سيفالوسبورين جيل 2 أو جيل 3 عن طريق الحقن أو فلوروكينولون مضاد للمكورات الرئوية).

جدول 9 - المعالجة بالصادات الحيوية لذات الرئة الحادة الشائعة عند البالغ

والتي تتطلب وضع المريض في قسم العناية المشددة

الحالة العامة [[أموكسيسيلين + حمض الكللافينيك داخل الوريد

1 غ × 4 - 6/يوم، أو سيفترياكسون 1 - 2 غ

أو سيفوتاكسيم 3 - 6 غ/يوم) + (ماكروبيد أو فلووروكينولون

حقن]]

إذا كان هناك شك بالليجيونيللا المعالجة السابقة ذاتها + ريفامبيسين داخل الوريد

جدول 10 - المعالجة بالصادات الحيوية لالتهابات القصبات

التهاب القصبات الحاد عند الشخص السليم عدم إعطاء صاد حيوي

التفاقم الحاد لالتهاب القصبات المزمن

التهاب قصبات مزمن بسيط	التهاب قصبات مزمن ساد	التهاب قصبات مزمن ساد مع قصور تنفسي
تحديد الدرجة	زلة جبهية	زلة حتى في حالة الراحة
لا يوجد زلة	35% > VEMS > 80%	نقص O ₂ الدم
VEMS < 80%	لا يوجد نقص أوكسجين الدم	في حالة الراحة
	في وضع الراحة	VEMS > 35%
لا	نعم إذا كان	
يوجد	هناك خاصتين	
استطباب	لأنتوزين	نعم
استطباب استعمال	إذا الحرارة < 38	
صاد حيوي في	في اليوم الثالث	
حالة إعادة تقويم	أو ظهور	
الحالة أو في حالة	خاصتين	-
استشارة متأخرة	لأنتوزين	
لصاد الحيوي المستعمل	معالجة بالصادات الحيوية فئة (1)	الصادات الحيوية فئة (2)
أموكسيسيلين	إذا كانت أول معالجة، والتفاقم	أموكسيسيلين،
سيفالوسبورين جيل (1)، مكاروليد،	قليل للحنوث	حمض الكللافينيك،
بريستيناميسين	صادات حيوية فئة (2)	سيفوروكسيم - أكسيل،
دوليسكلين،	إذا كان هناك فشل أول معالجة	سيفيدوكسيم - بروكسيتيل،
تيليتروميسين	أو إذا كان التفاقم متكرراً	سيفوتيام - هيكسيتيل،
	< 4/سنة	مولسيفلوكساسين،
		سيروفلوكساسين*

* يحتفظ بها لمعالجة الإنتانات المسببة من قبل العصيات غرام سلبية ولا سيما البسودوموناس أيروجينوزا.

3. الخزرجات الرئوية

السبب الأكثر شيوعاً هو نتيجة استنشاق اللعاب أو أشياء صلبة من أصل فموي حنجري (لاهوائيات، مكورات عقدية غير قابلة للتصنيف) أو ذات رئة نتيجة مرور المفرزات الهضمية في الرئة، هذا ويمكن أن تحدث كتوضع ثانوي لتجرثم الدم.

جدول 11 - الخزراج الرئوي

- من أصل تنفسي:
 - شائع: أموكسيسيللين + حمض الكلافولنيك أو سيفاميسين.
 - مصاب به في المشفى (نوزوكوميالي): [أميبينيم أو بيبيراسيللين - تازوبكتام] + [أميكاسين أو إيزياميسين].
 - نتيجة تجرثم الدم: أنظر الفصل (2) تجرثم الدم.

4. المصادات الحيوية المتوفرة (جدول 12، جدول 13)

جدول 12 - الجرعات اليومية لذوات الرئة

عدد الجرعات	الطفل	البالغ	الاسم التجاري	المصاد الحيوي
				أمينوبينيسيللين
2 - 3	50 - 100 مغ/كغ	3 غ	متعددة	أموكسيسيللين
				أمينوبينيسيللين + مثبطات البيبتاكتاماز أموكسيسيللين +
3 - 4	40 - 50 مغ/كغ	1.5 - 3 غ	لوجمونتان، سينلور	حمض الكلافولنيك
				سيفالوسبورين جيل 2
2	30 مغ/كغ	1 غ	زينات، سيبازين	سيفوروكسيم أكسيتيل
	-	-	زينفل داخل العضل	سيفوروكسيم داخل العضل
				سيفالوسبورين جيل 3 حقن
حقنة واحدة داخل للعضل والوريد	50 مغ/كغ	1 غ	روسيفين	سيفترياكسون
3 حقن داخل الوريد	50 مغ/كغ	3 غ	كلافوران	سيفوتاكسيم

67 الفصل 7: التهابات القصبات والرئة الشائعة

ماكروبيد				
إيريتروميسين	متعددة	1 غ	25 - 50 مغ/كغ	3
سبيراميسين	روفايميسين	6 - 9	1.5 مليون وحدة	2
		مليون وحدة	عالمية/10 كغ	
جوزاميسين	جوساسين	1 - 2 غ	50 مغ/كغ	2
روكسيثروميسين	كلاراميد، روليد	0.3 غ	5 - 8 مغ/كغ	2
كلاريتروميسين	ناكسي، زيكلار	1 غ	15 مغ/كغ	2
ديريثروميسين	ديناباك	0.5 غ	-	1
كينوليد				
تيليثروميسين	كيتيك	0.8 غ		1
سيكلين	فيبراميسين	0.2 غ	مضاد استطباب	1
فلووروكينولون*				
سبيروفلوكساسين	سيفلوكس	1 - 1.5 غ	مضاد استطباب**	2
أوفلوكساسين	أوفلوسيت	0.4 غ	مضاد استطباب**	2
ليفوفلوكساسين	نافانيك	0.5 - 1 غ	مضاد استطباب**	1 - 2
موكسيفلوكساسين***	إيزيلوكس	0.4 غ	مضاد استطباب**	1

* بعد 3 سنوات.

** مضاد استطباب عند الطفل حتى نهاية فترة النمو.

*** متوفرة فقط عن طريق الهم.

جدول 13 - الجرعات اليومية لالتهابات القصبات

الصاد الحيوي	الاسم التجاري	البالغ	الطفل	عدد الجرعات
أمينوبينيسيللين				
أموكسيسيللين	متعددة	3 غ	50 - 100 مغ/كغ	2 - 3
أمينوبينيسيللين + ميثيلات البيتا لاكماساز				
أموكسيسيللين + حمض	أوجمونتان،	1.5 - 3 غ	40 - 50 مغ/كغ	3 - 4
الكلافوليتيك	سيلور			
سيفالوسبورين جيل 2				
سيفوروكسيم أكسيتيل	زينات، سيبازين	0.5 غ	-	2
سيفوروكسيم أكسيتيل	زينات داخل العضل	1.5 غ	-	2 حقن
سيفالوسبورين جيل 3 حقن				
سيفيدوكسيم بروكسيتيل	أوريكلوس	0.4 غ	8 مغ/كغ	2
سيفوتيام	تاكيتيام، تيكسوديل	0.4 - 0.8 غ	-	2
سيفالوسبورين جيل 3 حقن				
سيفترياكسون	روسيفين	1 غ	50 مغ/كغ	حقنة واحدة

داخل العضل
أو الوريد

صاكروليد			
إيريتروميسين	متعددة	1 - 3 غ	25 - 50 مغ/كغ
سبيراميسين	روفاميسين	6 - 9 مليون	1.5 مليون وحدة
جوزاميسين	جوساسين	1 - 2 غ	عالمية/10 كغ
روكسيتروميدين	كلاراميد، روليد	0.3 غ	50 مغ/كغ
كلاريتروميدين	ناكسي، زيكلار	0.5 - 1 غ	5 - 8 مغ/كغ
ديريتروميدين	دينابالك	0.5 غ	-
أزيتروميسين*	زيتروماكس	0.5 غ يوم (1) ومن ثم 0.25 غ/يوم × 4	-
كيتوليد			
تيليتروميسين	كيتيك	0.8 غ	
ستريبتوغرامين	بيوستاسين	2 - 3 غ	2 - 3
بريستينايميسين	بيوستاسين	2 - 3 غ	2 - 3
ميكلين	فيبراميسين	0.2 غ	مضاد استطباب
دوكسيسيكليين	فيبراميسين	0.2 غ	مضاد استطباب
فلووروكينولون**	سيفلوكس	1 - 1.5 غ	مضاد استطباب**
سيبروفلوكساسين	أوفلوسيت	0.4 غ	مضاد استطباب**
أوفلوكساسين	تافاتيك	0.5 - 1 غ	مضاد استطباب**
ليفوفلوكساسين	إيزيلوكس	0.4 غ	مضاد استطباب**
موكسيفلوكساسين***	إيزيلوكس	0.4 غ	مضاد استطباب**

* بعد 3 سنوات.

** مضاد استطباب عند الطفل حتى نهاية فترة النمو.

8. التهاب التأمور الإنتاني

التهاب التأمور ينتج عن التهاب الوريقتين التأموريتين مع أو بدون انصباب تأموري.

1. تشخيص التهاب التأمور

إن ترافق الألم الصدري مع الحرارة مع الاحتكاكات التأمورية تجعلنا نشك بوجود التهاب التأمور. العلامات التخطيطية هي: ترحل القطعة S-T نحو الأعلى، تسطح الموجة T، ترحل القطعة P-R نحو الأسفل، صغر الـ QRS، اضطرابات نظم فوق البطينية. صورة الصدر يمكن أن تظهر زيادة حجم القلب. الإيكو القلبي فحص أساسي لأنه يظهر تفرق الوريقتين التأموريتين الواحدة عن الأخرى، ويسمح بتقويم كمية الانصباب، وبالبحث عن انعكاسات الالتهاب على الوظيفة الانبساطية للقلب. الدخول إلى المشفى ضروري.

2. البحث عن علامات الانصباب التأموري المعاصر

- تسرع التنفس مع عدم المقدرة على التنفس في وضعية الاستلقاء، زرقة، هبوط الضغط، ضخامة الكبد المؤلمة، توسع الأوردة الوداجية وازدياد توسعها بضغط الكبد.
- الإيكو القلبي: انصباب دائري، انضغاط البطين الأيمن أو انعدام الانبساط، مما يفرض تحقيق البزل الإسعافي.

3. البحث عن الأسباب لتوجيه التشخيص والمعالجة

1. التهاب التأمور الفيروسي أو المجهول السبب:

الأكثر مصادفة >80%، ويجب الشك به عند توفر الخصائص التالية:

شاب غير مصاب بأمراض، ألم صدري متوضع خلف القص وشديد، علامات إصابة بنزلة وافدة كاذبة منذ فترة قريبة (آلام مفاصل، آلام عضلية، سعال)، احمرار جلدي، التهاب المجاري التنفسية.

أهم الفيروسات المسببة: الفيروسات المعوية (كوكساي A و B، إيكوفيروس)، أدينو فيروس، ميكسوفيروس، فيروس الحلا، فيروس التهاب الكبد الإلتهائي، VIH، بزل التأمور ذو الأهمية التشخيصية الضئيلة غير ضروري. العينات المأخوذة من البلعوم أو الغائط غالباً سلبية. الفحوص المصلية الخاصة تساعد على معرفة الفيروس المسبب.

المعالجة: راحة في السرير، مسكنات، أسبيرين بجرعة مضادة للالتهاب (3غ/يوم) بالنسبة لمضادات الالتهاب الستيروئيدية وغير الستيروئيدية فالآراء متضاربة حول استعمالها. التطور سليم غالباً خلال 2 - 6 أسابيع مع احتمال النكس في 15 - 25% من الحالات.

2. التهاب التأمور القلحي (المعتبر جرثومي):

أكثر ندرة وهو يحدث كاختلاط لتجرثم الدم أو لبؤرة إنتانية داخل الصدر (ذات رئة في أغلب الحالات)، أو يأتي نتيجة تلقيح جرثومي مباشر نتيجة حادث رضّي أو بعد الجراحة. الأعراض الأكثر مصادفة هي الحرارة، الزلة التنفسية وتسرع القلب، الألم الصدري واحتكاكات التأمور لا تصانف في كل الحالات.

هذه الحالة من التهاب التأمور تعتبر حالة إسعافية لأن تطورها السريع نحو الوفاة ممكن الحدوث. الجراثيم الأساسية المسببة هي المكورات الرئوية (غالباً ذات الرئة تكون هنا مرافقة لالتهاب التأمور)، المكورات العنقودية المذهبة (التهاب رئة، تلقيح جرثومي)، العصيات غرام \ominus ، اللاهوائيات. التهابات التأمور المسببة من قبل المكورات العقدية، المكورات السحائية، الفطور الجرثومية الرئوية، ليجيونيللا أو الهيموفيلوس أنفلونزا نادرة.

التشخيص يستند إلى القصة السريرية (جدول 1)، زرع الدم، عينات أخرى مختارة حسب القصة السريرية ونتيجة بزل التأمور (أو الخزعة الجراحية عند القيام بالتفجير). المعالجة: معالجة بالصادات الحيوية + التفجير الجراحي.

جدول 1 - الجراثيم المحتملة
وفقاً للقصة السريرية

القصة السريرية	الجراثيم المحتمل
ذات رئة	مكورات عقدية رئوية
التهاب البلعوم	مكورات عقدية A أو نيسيريا SP
التهاب أنف	هيموفيلوس SP
التهاب شغاف القلب	مكورات عقدية SP
الحمى التيفية	سالمونيلا SP
رض صدري	مكورات عنقودية
جراحة صدر	مكورات عنقودية، عصيات غرام سلبي

3. التهاب التأمور السلي:

العلامات المثيرة للشك: بداية تدريجية، ألم صدري، فقد الوزن، تعرق، سعال، زلة تنفسية. هذه العلامات تكون غالباً مترافقة مع آفات رئوية وغدية لمفاوية صدرية. نادر في أوروبا وأكثر مصادفة في أفريقيا. يجب اقتراح عمل الفحوص المصلية الخاصة VIH. المعالجة الرباعية للسلي يجب أن تترافق بالمعالجة بواسطة الكورتيكوستيرويدات (بريدنيزون عن طريق الفم 1 مغ/كغ خلال 4 - 6 أسابيع).

التهاب التأمور العاصر هو التطور الأكثر خطورة، نسبة حدوثه حوالي 50% ويمكن أن يؤدي إلى وضع استطباب استئصال التأمور.

4. التهاب التأمور الفطري:

كثير الندرة، وهو يحدث غالباً كاختلاط لجراحة قلبية صدرية أو تنبيط مناعة شديد (مبثبات SP، أسبيرجيلوس SP، كريبتوكوك SP).

5. التهابات التأمور الغير إنتانية:

ذات أسباب مختلفة: سرطانة، تالية لاحتشاء العضلة القلبية، تالية لمعالجة شعاعية، أمراض جهازية خاصة خلال الإصابة بالذئبة الحمامية المنتشرة، قصور الدرق، قصور كلوي.

4. إلتوجيه العملي للعمليات والفحوص المكملة

1. البزل تحت مراقبة الإيكو لم يعد يقام به إلا في الحالات الإسعافية (التهاب التأمور العاصر).
2. التفجير الجراحي عن طريق تحت القص مع أخذ خزعة (\pm نافذة جنبية - تأمورية) مستطب إذا كان التهاب التأمور محتمل أنه جرثومي أو في حال كونه مجهول السبب ولا يتراجع مع المعالجة خلال 4 - 8 أسابيع مما يدعو للشك بالسل.
3. التصوير الطبقي المحوري يسمح باكتشاف ورم، عقد بلغمية منصفية، آفات رئوية. هناك تقنيات حديثة تسمح بدراسة حركية التأمور لا سيما عند وجود شك بوجود التهاب تأمور عاصر.
4. المرنان المغناطيسي يشكل فحصاً بديلاً للتصوير الطبقي المحوري.
5. فحوص جرثومية بيولوجية: زرع الدم، عينات مأخوذة حسب توجيه القصة السريرية (عينات مأخوذة موضعياً، خزعة تأمورية، تنبيب رئوي للبحث عن عصيات كوخ)، عينات مأخوذة من البلعوم والغائط للزراعة الفيروسية (غالباً سلبية) فحوص مصلية موجهة حسب القصة السريرية (VIH، فيروس الاندخال الخلوي العرطل، فيروس إيبشتاين بار، إلخ...).

9. الإسهالات الإنتانية الحادة

كثيرة المصادفة، قد تكون وبائية في حالة التسمم الإنتاني الغذائي الجماعي، أو فردية. معالجة الإسهالات الحادة يجب أن تأخذ في الحسبان المسبب، شدة الأعراض السريرية والوضعية العامة للمريض (خطورة كامنة عند الأشخاص الهشين).
كل تسمم إنتاني غذائي جماعي مؤكد التشخيص أو حتى مشكوك به يبرر القيام بتحقيق وبائي.

جدول 1 - استطلاعات زراعة الغائط في حالة الإسهال

الحالة	فحوص أخرى ممكن طلبها
حرارة	زرع الدم
عودة من بلاد مدارية	فحوص خاصة بالطفيليات
نقص المناعة	فحوص خاصة بالطفيليات
رضيع، شيخ	-
بعد معالجة بالمضادات الحيوية	البحث عن تسمم، تنظير الكولون
تسمم إنتاني غذائي جماعي (الهدف معرفة سبب الوباء)	-
إسهال ≤ 3 أيام	-

1. المعالجة الإسهالية

المعالجة هنا لها 3 أهداف: تصحيح التجفاف أو الوقاية منه، إنقاص حدة ومدة الإسهال، معالجة الإنتان الهضمي.

- هذا وتوجه المعالجة أولاً حسب المسبب للإسهال وحسب نتائج زرع الغائط:
- إصابة عائدة إلى السم المعوي (أنتيروثوكسين enterotoxine): معالجة هذه الإسهالات التي غالباً تكون غير مترافقة بترفع حروري (مثل الكوليرا) تركز بصورة خاصة على إعادة التوازن السائلي الشاردي.
 - إصابة التهايبية ناتجة عن اجتياح المخاطية، المؤدي إما إلى تخريب شديد فيها (التناذر الزحيري الناتج عن الشيغيللا) أو إلى رد فعل مخاطي أقل

شدة ولكنه مترافق مع خطورة انتشار عام (التناذر الهضمي المعوي للسالمونيلا)، الصورة السريرية هنا تكون حادة، ويوجد ترفع حروري، المعالجة تستند على تعويض السوائل وأحياناً إعطاء الصادات الحيوية.

1. تصحيح التجفاف:

التجفاف يوجد في كل حالات الإسهال، وهو أسرع ظهوراً وأكثر شدة في حالة كونه شديد السيولة، متعدد ومترافق مع إقياءات وحمى، وفي حالة كون المصاب شيخ أو رضيع. هذا ويمكن تصحيح التجفاف استناداً إلى فقد الوزن الناتج عنه:

- إما عن طريق الفم: غالباً ممكن، وهو يستند على إعطاء سائل مع سكر وشوارد، هناك بعض المستحضرات المتوفرة في الأسواق ومكيفة من أجل الرضع (آدياريل، آلهدرات، ليترين، GES 45 ملوباً). السائل المنصوح به من قبل منظمة الصحة العالمية لمعالجة التجفاف عن الطريق الفموي له التركيب التالي: من أجل لتر من الماء يضاف: 20 غ سكر، 3.5 غ NaCl، 2.5 بيكرونات الصوديوم، 1.5 كلورات البوتاسيوم.

- عن طريق الوريد: يستطب في حال فقدان $\leq 10\%$ من وزن الجسم، إقياءات شديدة، علامات وهط نموي، أو إذا كان المريض في حالة سبات. من الممكن استعمال سائل له التركيب التالي: سيروم سكري 5% لتر واحد نضيف إليه 4 - 6 غ NaCl (ما يعادل 86 - 102 ملي مول من شوارد الصوديوم)، 1 - 2 غ كلورات البوتاسيوم (ما يعادل 13.4 - 26.8 ملي مول من شوارد البوتاسيوم K^+) و 1 غ من كلورات الكالسيوم أو غلوكونات الكالسيوم (ما يعادل 363 مغ كالسيوم للمركب الأول و 93 مغ المركب الثاني)، كما يجب تصحيح الحمض بواسطة سائل بيكرونات الصوديوم 14%. الجرعة الوسطية هي 100 مل/كغ خلال الـ 4 - 6 ساعات الأولى ومن ثم 100 - 120 مل/كغ/يوم، هذا وإن متابعة تصحيح التجفاف تستند إلى حالة المريض (تصحيح فقد الوزن) شدة الإسهال ونتائج الفحوص المكملة.

2. معالجة الإسهال:

- التوقف عن الطعام والشراب (الذي يحدث غالباً بشكل عفوي في حال وجود غشيان، إقياءات، ألم بطني) ينقص من تون شك من شدة الإسهال ولكن يزيد من حدة نقص التغذية. للتغذية - باستثناء مشتقات الحليب - يجب أن يستمر بها وذلك حسب تحمل المريض لها ولا سيما عند الرضع والشيوخ الضعاف.
- فائدة الـ (aliments-lests) - جزر،... أو الضمادات الهضمية المعوية لم تثبت.
- مبطئات الحركات المعوية (مشتقات المورفين، الأتروبين، لوبيبراميد)، تنقص كمية الإسهال، وذلك بإنقاص المفرزات المعوية. ولكن استعمالها غير منصوح به في حالة الإسهالات الجرثومية لأنها تسهل حدوث الركودة المعوية وبالتالي تزيد من خطورة انتشار الجرثوم العام.
- الأسيتورفان (تيروفان) له مفعول انتقائي مضاد للإفراز المعوي، وبالتالي فهو لا يؤدي إلى هذه الخطورة.
- بعض هذه المستحضرات لها مضاد استطباب عند الأطفال، لكنها عند الرضع لها مضاد استطباب ما عدا الأسيتورفان.

3. معالجة الإنتان (جدول 2):

المعالجة المضادة للإنتان يمكن أن تكون مستطبة في حالة وجود صورة سريرية لالتهاب هضمي معوي مع ترفع حروري أو وجود تناذر زحاري. هذا ولهذه المعالجة 3 أهداف: إنقاص حدة ومدة الإسهال، إنقاص خطر انتشار الجرثوم خارج الأمعاء (سالمونيلا، إنتانات عائدة للكامبيلوباكتير SP)، الحد من العدوى عن طريق الغائط (كوليرا، سالمونيلا، شيغيلا، إنتانات عائدة للإيشيريشيا كولي أو الكلاميديا).

المعالجة بالصادات الحيوية للسالمونيلا موجهة إلى إنقاص خطر الانتشار الجرثومي العام في الحالات التالية: إسهال شديد أو مترافق بترفع حروري كبير، عمر > 3 أشهر أو < 65 عاماً، نقص مناعي، دريبانوسيتوز،

طعم قلبي أو وعائي أو عظمي مفصلي. مدة المعالجة تكون عادة من 3 - 10 أيام من أجل السالمونيلا و 14 يوماً من أجل الإسهال الحاد العائد إلى الكامبيلوباكتريز.

جدول 2 - المعالجة بالصادات الحيوية للإسهالات الجرثومية

العامل المسبب	الصاد الحيوي	المدة	البنيل
سالمونيلا سيبيا	فلوروركينولون	5 أيام	أمينوبيسيللين أو كوتريموكسازول
كامبيلوباكتريز جوجيني	ماكروليد	14 يوما	فلوروركينولون
برزيتيا أنتيروكوليتيكا	سيكلين	10 أيام	كوتريموكسازول أو فلوروركينولون
إيشريشيا كولاي	كوتريموكسازول أو فلوروركينولون	5 أيام	
كلوستريديام ديفيسيل	ميترونيدازول	10 أيام	فانكوميسين (عبر الفم)
فيبريوكوليرا	سيكلين	3 أيام	كوتريموكسازول أو فلوروركينولون

* مضاد استطباب عند الأطفال.

2. المعالجة الوقائية

سواء كانت هذه المعالجة جماعية أو فردية فإنها تركز على العناية بنظافة الطعام والشراب ونظافة الأيدي. هذه الإجراءات يجب أن تستهدف تحضير الأطعمة، غسل الأيدي في التجمعات والحضانات. وهي تتوافق بالبحث عن حملة الجرثوم ومعالجتهم ومراقبة مراحل تحضير الأطعمة.

هذه النصائح تكتسب أهمية خاصة في حال السفر إلى المنطقة المدارية.

وفي النهاية يجب أن نتذكر أن كل تسمم إنتاني طعامي جماعي يجب أن يُبلغ عنه إلى السلطات الصحية.

10. الإختانات الهضمية

كل عرض بطني مترافق مع ترفع حروري يجب أن يدفعنا إلى التفكير بإنتان داخل البطن والبحث عن استطباب جراحي.

1. الطرق الصفراوية والتجيد

1. التهاب المرارة الحاد:

وهو يحدث غالباً كنتيجة لانسداد حصوي، ويشاهد بشكل خاص عند المرأة المسنة والسمنة.

- البداية بصورة عامة مفاجئة مع قشعريرة. حرارة مرتفعة وآلام في المراق الأيمن، مع علامة مورفي.
- هذه الصورة السريرية تترافق مع فرط الكريات البيض المتعددة النوى المعتدلة، ومع ارتفاع معتدل للترانس أميناز، وتناذر احتباس معتدل وغير ثابت. زرع الدم تكون أحياناً إيجابية.
- صورة البطن البسيطة يمكن أن تظهر حصاة مرارية ولكن، بشكل خاص إيكو البطن يظهر مرارة ذات جدار سميك (> 5 مم) مع وجود حصاة أو أكثر فيها، وأحياناً يظهر حصاة في الطريق الصفراوي الأساسي الذي من الممكن أن يكون متوسعاً.
- المعالجة بالصادات الحيوية (جدول 1) تعتبر إسعافية. إنها تستهدف أولاً الجراثيم المعوية واللاهوائيات. استئصال المرارة يحقق بعد فترة. أما نقيح المرارة فهو يعالج - حسب الحالة السريرية للمريض - إما بتفجير عبر الجلد أو بواسطة الجراحة.

2. التهاب الطرق الصفراوية:

يشتبّه به عند ترافق الثلاثي الكلاسيكي الآم، حرارة وبقراق. الآلام

الشرسونية أو في المراق الأيمن أو الاثنين معاً، والتي تزداد عند نفخ الصدر، تكون مترافقة مع غثيانات وإقياءات، مع حرارة مرتفعة ومنتومة وقشعريات ومن ثم تترافق ببرقان احتباسي سواء وجد سوابق لحصيات مرارية أو لا. الفحوص البيولوجية تؤكد وجود الاحتباس الصفراوي (مع أو بدون وجود انحلال خلوي)، مترافق مع ارتفاع في عدد الكريات البيض المتعددة النوى. الإيكو يبحث عن وجود توسع في الطرق الصفراوية داخل أو خارج الكبد مع احتمال وجود حصاة صفراوية، كما يبحث عن وجود تسمك في جدار المرارة. العائق غالباً يكون عبارة عن حصاة في القناة الصفراوية، وبشكل أكثر ندرة انضغاط نو منشأ خارجي. هذا ويجب تحقيق زراعات دم قبل البدء بالمعالجة بالصادات الحيوية، وذلك بهدف كشف تجربهم دم ثانوي للاحتباس الصفراوي الإنتاني.

من الواجب تحرير الطرق الصفراوية من العائق سواء بالجراحة أو عن طريق التنظير، مع معالجة بالصادات الحيوية عبر الوريد، هذه المعالجة تكون موجهة ضد الجراثيم المسببة والتي هي غالباً (الإيشيريشيا كولاي، الكليسيلا سيبيسيا، الجراثيم المعوية سببسيا واللاهوائيات (جدول 1)).

3. خراج الكبد:

أ - التشخيص الإيجابي:

يكون سهل أمام وجود آلام في المراق الأيمن، منتشرة إلى الكتف الأيمن، وأمام وجود ألم في المراق الأيمن محرض بجس الكبد، كل ذلك ضمن صورة سريرية لترفع حروري. هذا التشخيص يكون أكثر صعوبة أمام وجود التهاب جنب ورئة لقاعدة الرئة اليمنى، أو وجود حرارة منعزلة أو ألم في الكتف الأيمن. التصوير بالإيكو أو الطبقي المحوري يكشف الخراج أو الخراجات، ويحدد أبعادها وتوضعها بالنسبة للطرق الصفراوية. التشخيص الجرثومي يستند على زرع الدم وبزل الخراج الموجه بالمراقبة بواسطة الإيكو أو التصوير الطبقي المحوري. الفحوص البيولوجية تظهر وجود تناثر التهابي (سرعة التثفل تكون غالباً مرتفعة جداً)، كما يوجد فرط في الكريات البيض وانحلال خلوي كبدي.

ب - الأسباب:

في فرنسا الأسباب غالباً جرثومية قبحية، هذا ويجب الشك بالمتحول الزحاري (أميب) في حالة إقامة المريض ولو سابقاً في البلاد المدارية، وهنا لتأكيد التشخيص يجب القيام بالفحوص المصلية.

ج - المعالجة:

المعالجة بالصادات الحيوية تكيف حسب الجرثوم المسبب (عصيات غرام سلبية، لاهوائيات) جدول 1. مدة المعالجة هي من 6- 8 أسابيع، في حال وجود خراج ذو حجم كبير فإن التفجير عبر الجلد أو الجراحي الموجه بواسطة الإيكو يمكن أن يكون ضرورياً. الاستطباب يرتكز على حجم الخراج، وجود احتمال لانفجاره في البريتوان أو الجنب ولعدم وجود تحسن أو نقص في حجمه بالرغم من المعالجة المناسبة بالصادات الحيوية.

جدول 1 - المعالجة بالصادات الحيوية للإلتهابات داخل البطنية

وذلك حسب التظاهر السريري

التظاهر السريري	الخيار العلاجي الأول	البدايل
1. التهاب المرارة، التهاب سيني، التهاب الطرق الصراوية، إنتان صفراوي خطير	سيفترياكسون 1 - 2 غ أو 3 - 6 غ	بيبيراسيلين - تازوباكتام 12 غ
	+ ميترونيدازول 500 مغ × 3/يوم	± جنتاميسين 6 مغ/كغ/يوم
	± جنتاميسين 6 مغ/كغ/يوم	إذا كان هناك تحسس للبيبتاكتامين:
	أو فلوروكينولون (سبيروفلوكساسين	كلينداميسين 600 مغ داخل الوريد ×
	أو أوفلوكساسين)	3/يوم + جنتاميسين 6 مغ/كغ/يوم

2. المتحول الزحاري الكبد (الأميب):

ميترونيدازول (قاتل للأميب داخل النسيج) 300 مغ/كغ/يوم ثلاثة جرعات عبر الوريد أو الفم وذلك لمدة 10 أيام متبوع بإعطاء الأنتيتركس (والذي هو عبارة عن قاتل للأميب الاحتكاك أو التماس) 4 - 6 حبوب/يوم، مدة المعالجة 10 أيام.

3. التهاب الحين في حالة وجود تشمع كبد:

سيفترياكسون 1 - 2 غ أو سيفوتاكسيم 3 - 6 غ.
إذا كان هناك فشل في المعالجة بعد 48 ساعة: فلوروكينولون (سبيروفلوكساسين أو أوفلوكساسين)، مدة المعالجة 5 - 10 أيام.

2. المطابق ما تحت المساريقي Sous mésocolique

الجرانيم للمسؤولة تكون مختلطة هوائية ولاهوائية: جرانيم معوية (إيشيريشيا كوللي) مكورات معوية، مكورات عقدية سببسية، عصيات فرجليس، المكورات العقدية، بيبتيو Pepto، كولستريديام سببسية.

1. التهاب الزائدة الدودية الحاد:

إنه السبب الأكثر مصادفة لتناذر البطن الحاد المترافق بحمي. وهو يصيب في أغلب الحالات الأطفال المراهقين أو البالغين الشباب. التشخيص سريري (آلام في الحفرة الحرقفية اليمنى، توقف التغوط أو الغازات، دفاع عضلي، فرط عدد الكريات البيض). في حالة الشك بالتشخيص يمكن تحقيق إيكو عند الطفل أو تصوير طبقي محوري عند البالغ، هذان الفحصان يظهران الالتهاب الزائدي.

المعالجة الجراحية ضرورية أمام وجود الصورة السريرية المعتادة، ولكن وجود ألم منتشر أو غير متوضع في الحفرة الحرقفية اليمنى (تحت الكبد أو في الحوض)، أو غياب للدفاع البطني لا تسمح بنفي تشخيص التهاب الزائدة الدودية وهو يفرض اللجوء إلى الاستشارة الجراحية.

2. التهاب البريتوان الحاد:

يكون نال لانتقاب زائدة دودية ملتهبة، لقرحة هضمية إثني عشرية، أو لآفة قولنجية. التشخيص يستند إلى شدة الأعراض وحدوثها المفاجئ، إلى توقف التغوط والغازات وإلى التقلص البطني المؤلم. صورة البطن البسيطة المركزة على قوسي الحجاب الحاجز يمكن أن تظهر هلالاً أو عدة أهلة غازية تحت الحجاب الحاجز، سويات سائلة، توسع في الأمعاء الدقيقة أو الغليظة، هذه الصورة السريرية تتطلب استشارة جراحية إسعافية. والصورة السريرية المتضمنة صدمة إنتانية أو التهاب البريتوان تتطلب إزالة العائق الصفراوي جراحياً أو بواسطة التنظير وذلك بشكل إسعافي في بعض الأحيان وذلك تحت غطاء معالجة بالصادات الحيوية.

3. التهاب الرتوج السينية:

يشك بها غالباً عند مريض مسن يشكو من ترفع حروري مترافق مع آلام في الحفرة الحرقفية اليسرى. الجس البطني يظهر بصورة عامة دفاع موضعي ويمكن أن يكشف عن وجود كتلة مثيرة للشبهة بوجود خراج؛ المس الشرجي يكون مؤلماً. يوضع التشخيص بواسطة التصوير الطبقي المحوري الذي هو أكثر حساسية من الحقنة البارييتية لإظهار الرتوج. إنه يظهر صورة خاصة بالالتهاب ومتوضعة في الحفرة المجاورة للكلون، كما يظهر الخراجات في حالة وجودها. المعالجة تستند على إعطاء الصادات الحيوية بصورة احتمالية، وهذه الصادات تختار بشكل تكون فيه فعالة على الجراثيم المعوية، المكورات المعوية واللاهوائيات، لأنه من النادر معرفة سبب الالتهاب بواسطة زرع الدم. في حال وجود خراج فإنه يجب تفجيره إما عبر الجلد أو جراحياً.

3. إنتان سائل الحين

إنتان سائل الحين اختلاط شائع الحدوث عند المرضى المصابين بتشمع الكبد (8 - 25% من المرضى الذين دخلوا المشفى والذين عندهم حبن). الوفيات الناتجة عنه تبقى مرتفعة من 20 - 30% بالرغم من المعالجة بالصادات الحيوية. التشخيص يعتمد على بزل سائل الحين الذي يجب القيام به عند وجود اضطرابات في الحرارة، إسهال، آلام بطنية، يرقان أو علامات اعتلال دماغي. ولتأكيد الإنتان فإنه يجب أن يوجد أكثر من 250 كرية بيضاء متعددة النوى/مم³. نسبة الزرع الإيجابي تكون أكثر ارتفاعاً في حال حقن سائل الحين مباشرة في زجاجات زرع الدم قرب سرير المريض. الجراثيم المسؤولة هي غالباً الجراثيم المعوية (70%) والتي غالباً ما تكون إيشيريشيا كولي أو مكورات غرام إيجابية (25%) بصورة خاصة المكورات العقدية الرئوية والمكورات المعوية سيبسيا وبشكل أكثر ندرة اللاهوائيات (>5%).

المعالجة بالصادات الحيوية الأولى (جدول 1) والتي أثبتت صحتها بالدراسات السريرية تستند إلى إعطاء السيفالوسبورين جيل 3 عن طريق الوريد أو كبديل عنها إعطاء الفلوروكينولون عن طريق الوريد أيضاً. المعالجة يمكن أن توقف بعد 48 ساعة وذلك إذا عاد السائل الحبيبي إلى الطبيعي.

النكس شائع (70% في السنة الأولى) وهذا النكس يمكن أن يبرر معالجة وقائية بواسطة النورفلوكساسين أو الكوتريموكسازول خلال 3 - 6 أشهر، بالرغم من وجود خطورة انتقاء جراثيم مقاومة. المعالجة الوقائية يمكن أن تناقش عند المرضى ذوي الخطورة المرتفعة (محتوى سائل الحبن من البروتيد >10 غ/ل، نزف هضمي).

11. الإلتانات التناسلية والأمراض المنقولة عن طريق الجنس

إن وجود إلتان انتقل عن طريق الجنس يفرض معالجة الشريك أو الشريكة الجنسية أو الشركاء الجنسيين. إن ترافق العوامل الإمراضية (ذات المظاهر السريرية الموضعية أو العامة) يجب أن يبحث عنها دائماً آخذين بعين الاعتبار مدد الحضانة (3 أسابيع بالنسبة لـ VIH، التهاب الكبد الإلتاني < شهر واحد). هذا ويجب منع الممارسات الجنسية حتى حصول الشفاء.

1. الإلتانات التناسلية المنخفضة

1. القرحات:

1. القرحة الزهرية (التريبونيميا الشاحبة):

إيكستيسيلين داخل العضل، حقنة واحدة 2.4 مليون وحدة.
في حالة التحسس على البنيسيلين: دوكسيسيكليين (200 مغ/يوم) خلال 15 يوماً.

في حالة معاودة السيفيليس الثانوي: إيكستيسيلين 2.4 مليون وحدة
1 - 3 حقن مع فاصل 7 أيام ما بين الحقنة والأخرى.
السيفيليس المتأخر: 3 حقن إيكستيسيلين 2.4 مليون وحدة مع فاصل 7 أيام ما بين الحقنة والأخرى. في حالة التحسس على البنيسيلين: دوكسيسيكليين (200 مغ/يوم) خلال 28 يوماً.

2. القرحة الرخوة (هيموفيلوس دورسي):

سيفترياكسون داخل العضل: 500 مغ 1 - 3 حقن.
سبيروفلوكساسين عن طريق الفم: 500 مغ \times 2/يوم خلال 3 أيام.
إيريتروميسين: 500 مغ \times 4/يوم، في حال وجود تحسس يعطى أزيثروميسين 1 مغ جرعة واحدة.

هذا ولم يعد يستعمل الكوتريموكسازول (40% من الزمر مقاومة له).

2. التهاب الإحليل والتهاب العنق:

التشخيص يستند على أخذ العينات العنقية والإحليلية (مكورات بنية)، أو فحوص التكبير المولدة بالـ PCR أو قذف بولي (كلاميديا).

1. المكورات البنية (نيسيريا غونوريا) مشمول معها التوضع الشرجي:

ينصح باستعمال المعالجات التالية: سيفترياكسون (250 مغ داخل العضل ولمرة واحدة)، سيفيكسيم (مرة واحدة حبتين كل واحدة 200 مغ)، بيفلوكساسين (800 مغ) أو فلوكساسين (400 مغ) أو سيبروفلوكساسين (500 مغ) عن طريق الفم ولمرة واحدة، كبديل يعطى السبيكتينومييسين (2 غ داخل العضل لمرة واحدة).

في حال الشك بوجود إصابة مرافقة بالكلاميديا فإنه يوصى بإعطاء (أزيتروميسين أو دوكسيسيكلين). توضع بلعومي: سيفترياكسون (500 مغ) أو سيبروفلوكساسين (500 مغ) لمرة واحدة.

الأشكال المنتشرة: يفضل إعطاء سيفترياكسون خلال 7 أيام على الأقل، المدة تتعلق بمكان الإصابة.

2. كلاميديا تراكوماتيس، يوريابلازما يوراليتيكوم، ميكوبلازما جينيتالوم:

دوكسيسيكلين أو مينوسيكلين (200 مغ مرة واحدة/يوم)، أو أي سيكلين آخر بجرعة مناسبة لمدة 7 أيام.

أزيتروميسين 1 غ عن طريق الفم مرة واحدة.

المعالجة البديلة: إيريتروميسين (2 غ/يوم)، روكسيتروميسين (300 مغ/يوم) أو أوفلوكساسين (400 مغ/يوم) لمدة 7 أيام. عند المرأة الحامل البديل هو الإريثروميسين.

3. الداء اللمفاوي الحبيبي الزهري (داء نيكولا فافر):

تسببه الكلاميديا تراكوماتيس ذات الزمر L_1 إلى L_2 ، المعالجة تكون بالدوكسيسيكلين (200 مغ) أو إيريتروميسين (500 مغ \times 4) خلال 21 يوماً + بزل الغدة أو الغدد.

4. التهاب فطري عائد للمبيضات البيض (التهاب الإحليل، التهاب القلفة والحشفة، التهاب الفرج والمهبل):

المعالجة بشكل خاص موضعية، المعالجة العامة ضرورية في حالة النكس أو وجود توضعات هضمية، العوامل المؤهبة الموضعية للعامة يجب أن تؤخذ بالحسبان.

المعالجة الموضعية:

- التهاب القلفة والتهاب الفرج: يجب تطبيق أحد مشتقات الآزول مرتين في اليوم وذلك لمدة سبعة أيام (إيكونازول سائل حليبي جلدي مثلاً).
 - التهاب الفرج: يعطى بيضة إيكونازول نسائية واحدة ولمرة واحدة (ذات مفعول طويل) مساءً مثلاً ويعطى مرة ثانية بعد 3 أيام.
- المعالجة البديلة:

- معالجات أخرى ذات جرعة واحدة طويلة المفعول.
 - ميكونازول: بيضة واحدة مساءً لمدة 6 أيام (يجب عدم إيقاف المعالجة في حالة حصول الدورة الطمثية).
- المعالجة العامة عن طريق الفم:
- في حال نكس التهاب الفرج والمهبل: ميكونازول، نيساتين، أمفوتيريسين بجرعات مناسبة (بؤرة هضمية).
 - في حال وجود التهاب فرج ومهبل متكرر: كيتونيدازول 200 مغ/يوم خلال 10 أيام أو فلوكونازول 100 مغ/يوم خلال 3 أيام (مضاد استطباب في حالة الحمل).

5. التهاب الفرج والمهبل العائد إلى التريكوموناس الفرجية

Trichomonas vaginalis:

- عند المرأة: معالجة "دقيقة" بالإيميدازول عن طريق الفم. وتجدد في وقت الدورات الطمثية التالية بالإضافة إلى المعالجة الموضعية:
- نيمورازول، تينيدازول، ميترونيدازول: 2 غ.

- بويضات نسائية (ميترونيدازول): 1/يوم لمدة 6 أيام.
المرأة الحامل لا تعطى إلا معالجة موضعية لمدة 15 يوماً.
عند الرجل: معالجة "دقيقة" بالميترونيدازول عن طريق الفم، تجدد مرة واحدة.

6. التهاب الفرج العائد إلى الجاردينيللا الفرجية (التهاب الفرج الغير نوعي):
يتميز هذا الالتهاب بوجود ضائعات بيضاء، رغوية ذات رائحة سيئة مع وجود خلايا متموتة واختبار بوتاس إيجابي.
المعالجة التي يجب أن تجدد عند حدوث الدورة الطمثية التالية، تتضمن الميترونيدازول (1غ/يوم) لمدة 7 أيام، أو تينيدازول (2غ لمرة واحدة). الشريك الجنسي لا يعالج إلا في حالة عودة الالتهاب.
7. الحلاّ التناسلي:

معاودة الالتهاب يمكن أن تعالج كما يلي:
- فلامسيكوفير (زيتيتريكس): (حبتين كل واحدة 500 مغ/يوم، جرعة أو جرعتين وذلك لمدة 5 أيام).
- أو آسيكلوفير (زوفيراكس): (5 حبات كل واحدة 200 مغ/يوم موزعة خلال اليوم ولمدة 5 أيام).
عند المرضى الذين يعانون من عودة الإصابة على الأقل 6 مرات بالسنة، الوقاية ممكنة: إما بإعطاء حبة واحدة 200 مغ من الفلامسيكوفير، أو 4 حبات 200 مغ من الآسيكلوفير باليوم.
هذا ويجب إعادة تقويم المعالجة بعد 6 - 12 شهراً.
عند المريض بالحلاّ وبـالـ VIH: آسيكلوفير 200 - 400 مغ × 5/يوم أو فالآسيكلوفير 1غ × 2/يوم خلال 7 أيام.

8. الإلتانات العائدة للبابيوما فيروس 11.6:

تدعى أيضاً بالتبرعمات الزهرية أو الأورام اللحمية المقرنة.

الخطط العلاجية التالية تستعمل الواحدة بعد الأخرى، وذلك في حال فشل المعالجة السابقة:

- محلول بودوفيلوتوكسين يطبق على الورم اللقمي المتقرن الخارجي ذو سطح > 4 سم²، يطبق مرتين في اليوم لمدة 3 أيام متتالية/أسبوع وذلك لمدة أقصاها 5 أسابيع، متحاشين أي تماس مع السطوح الجلدية أو المخاطية المجاورة السليمة (مضاد استطباب أثناء الحمل والإرضاع بسبب احتمال فعالية مضادة للتكاثر).
- إيميكنود (ألدارا Aldara): تطبيق موضعي قبل النوم 3 مرات/أسبوع حتى الشفاء (أقل من 16 أسبوع).
- تخثير كهربائي أو بواسطة لزر CO₂ تحت تخدير عام.
- إذا أدت الأورام اللقمية لعنق الرحم إلى ظهور عسر تصنع هام يجب اقتراح تقريغ مخروطي (وقاية من سرطان عنق الرحم).
- معالجة قريّة Cryotherapy (أزوت سائل).

2. الإلتانات التناسلية العليا

1. التهاب الموهة (أنظر فصل 12 "الإلتانات البولية")

2. التهاب البربخ أو التهاب الخصية والبربخ الحاد (فصل 12)

3. التهاب الخصية الحاد:

التهاب الخصية مع بقاء البربخ سليم، يدعو للشك بالكفاف. المعالجة تكون بالراحة، عدم تحريك الخصيتين وأحياناً إعطاء مضادات الالتهاب الغير ستيروئيدية.

4. التهاب الملحقات:

السبب الأكثر شيوعاً لها هو الممارسة الجنسية حيث أن التهاب الملحقات يعد من الأمراض المنقولة عن طريق الجنس. من الأسباب المؤهبة نذكر وضع

أدوات داخل الرحم (اللولب مثلاً إلخ..) أو استقصاءات جراحية أو تنظيرية داخل الرحم (التي تضم الـ IVG - الإجهاض الإرادي) وأخيراً هناك السل. الجراثيم المسببة غالباً ما تكون الكلاميديا تراكوماتيس والمكورات البنية. أما الجراثيم المعوية (كالإيشيريشيا كولي)، المكورات العقدية (مكورات عقدية B) واللاهوائيات فمن الممكن أن تسبب التهاب الملحقات أيضاً. هذا ولم تثبت إمراضية الأوريبالازما أوريباليتيكوم وبالنسبة للميكوبلازما هومينيس فهي غالباً ما تكون مسؤولة عن التهاب المهبل المنعزل. التهاب الملحقات العائدة للكلاميديا تراكوماتيس تتطور غالباً بصورة خفية وهي السبب الأساسي للعقم البدئي.

الفحوص المكملة:

ليس من السهل وضع التشخيص الجرثومي، هذا ويجب الحذر من النتائج المعطاة من العينات المهبليّة. يترافق التهاب الملحقات غالباً مع ضائعات بيضاء غزيرة، هذا والفحص الأكثر فائدة هو تحليل هذه الضائعات بعد أخذها على مستوى بطانة العنق موجهين بواسطة المنظار. تشخيص الكلاميديا تراكوماتيس على مستوى الخلايا البطانية لعنق الرحم ("حف" المخاطية) يتم بواسطة الكشف المباشر عن مولد الضد (Ag) بواسطة تقنية مناعية - أنزيمية أو مناعية شعاعية مباشرة. الـ PCR ذات قيمة تشخيصية كبيرة هنا. الفحص المصلي المتعلق بالكلاميديا تراكوماتيس غالباً ما يكون ذو نتائج مؤسفة، فقط وجود تحول في الفحص المصلي يسمح بالتشخيص. البحث عن الـ IgM غير مفيد بالنسبة لتشخيص الإنتانات المزمنة أو الكامنة.

- تشخيص التهاب الملحقات أو التهاب حوضي يتطلب غالباً - وذلك حسب التوجيه السريري - فحص إيكو وذلك بحثاً عن تجمع سائلي (تقيح ملحقات، خراج بوقي مبيضي، تجمع سائلي في رتج دوغلاس)، أو وذمة مبيض، أو تسمك في بطانة الرحم. هذا الفحص ضروري للتشخيص التفريقي للأمراض التالية، حمل خارج الرحم، كيسة مبيضية. هذا ولا يمكن نفي التشخيص إذا كان طبيعياً.

عدة مخططات علاجية كانت قد اقترحت للمعالجة الأولية لهذه الإنتانات المسببة من عدة جراثيم بأن واحد غالباً (جدول 1). هذا ويجب تكثيف المعالجة بالصادات الحيوية حسب النتائج الجرثومية. مدة المعالجة على الأقل 3 أسابيع.

هذا ومن الممكن أن تُرافق هذه المعالجة مع معالجة هرمونية بالإستروجين والبروجسترون. المعالجة الجراحية تكون ضرورية في حالة وجود تجمع قيحي للملحقات، خراج في رتج دوغلاس أو التهاب بريتوان. نزع اللولب ضروري في هذه الحالة.

5. التهاب بطانة الرحم:

تتبع هنا نفس المعالجة التي اتبعت لمعالجة التهاب الملحقات. ويجب أحياناً مرافقتها بمعالجة موضعية: استئصال الرحم، نزع اللولب، جراحة لورم... في حالة وجود تجرثم دم عائد إلى الكلوستريديام بيرفرينجس وضع المريض في العناية المشددة ضروري.

6. الإصابة السلية التناسلية (التهاب البروستات، التهاب البربخ، التهاب الرحم والملحقات):

أنظر الفصل 24 (السل).

جدول 1 - المعالجة بالصادات الحيوية

لانتهاج الملحقات

ملاحظات	مدة المعالجة	الجرعات وطرق الإعطاء	الصادات الحيوية
- المعالجة التي يجب البدء بها	4 - 6 أيام	3 - 6 غ/يوم داخل الوريد	أموكسيسيللين - حمض كلافلينيك
- طريق فموي في الحالات المعالجة في المنزل	5 - 10 أيام	ومن ثم فموياً 2 - 3 غ/يوم 200 مغ/يوم فموياً	سيكلين (دوكسيسيللين، مينو سيكلين)
- عن طريق الوريد في الحالات الحادة التي تتطلب الدخول إلى المشفى	3 أسابيع		
معالجة فعالة ولكن مرتفعة الكلفة	4 - 6 أيام	3 - 6 غ/يوم داخل الوريد	أموكسيسيللين - كلافلينيك
مستطبة فقط في حالة مضاد استطباب للسكيلين	5 - 10 أيام	2 - 3 غ/يوم فموياً 400 مغ/يوم فموياً	+ أوفلاكسوسين
الميترونيدازول غير مفيد في حال ترافقه مع السيفوكسيتين أو السيفوتيتان	4 - 6 أيام	داخل الوريد	(سيفالوسبورين جيل 2 أو سيفالو جيل 3)*
	4 - 6 أيام	1.5 غ/يوم داخل الوريد ومن ثم 1 - 2 غ/يوم فموياً	
	10 أيام		
			+ ميترونيدازول
(سيفاميسين فعال على اللاهوائيات)	3 أسابيع	200 مغ/يوم فموياً	+ سيكلين (دوكسيسيللين، مينو سيكلين)
منسوحة من قبل منظمة الصحة العالمية	4 أيام	900 مغ داخل الوريد/ 8 ساعة	إكلينداميسين +
		1.5 مغ/كغ/ 8 ساعة	جنتاميسين]
	10 - 14 يوماً	200 مغ/يوم فموياً	ومن ثم سيكلين (دوكسيسيللين، أمينوسيكلين)

* الجرعة: سيفوكسين: 3 - 6 غ/يوم، سيفاماندول: 3 غ/يوم، سيفوتاكسيم: 3 - 6 غ/يوم، سيفترياكسون 1 - 2 غ/يوم، سيفوتيتان: 2 - 6 غ/يوم.

12. الإختانات البولية

1. من الناحية الوبائية Epidemiologie

جدول 1 - العناصر المجهرية المسؤولة عن الإختانات البولية (%)

شائعة	مصاب بها في المشفى (نوزوكوميالية)
إيشيريشيا كولاي	80
مقاومة للأموكسيسيللين	50
بروتيتوس سيبسيا	40
مكورات عقدية سيبسيا	25
مكورات عقدية سيبسيا	10
مكورات عقدية سيبسيا	3 - 2
مكورات عقدية سيبسيا	4
مكورات عقدية سيبسيا	7
بسودوموناس إيروجينوزا	1
مبيضات سيبسيا	-
	20 - 10
	2

2. الإختبارات

يستند على الفحص الخلوي الجرثومي للبول: هذا الفحص لا بد منه أمام كل شك سريري بإنتان بولي مع ترفع حروري، أمام كل تجرثم دم مجهول المنشأ، وأمام كل إنتان بولي نوزوكوميالي. هذا وإن وجود حرارة مرتفعة ($<38^{\circ}$) يفرض أيضاً تحقيق زرع دم مرة واحدة على الأقل.

هذا وإن إجراء الفحص الخلوي الجرثومي للبول غير ضروري في حالة الإنتان البولي المنخفض الشائع والغير مختلط عند مريض ليس عنده قثطرة بولية. الشريط البولي (Bandelette urinaire) في حال كونه سلبي له قيمة تشخيصية كبيرة.

الفحص الخلوي الجرثومي للبول يجب أن يحقق ضمن شروط تعقيم وتخزين صارمة، جدول 2 (من المفضل أخذ دفعة البول الأولى الصباحية) ومن المفضل أيضاً تحقيق الفحص قبل البدء بأية معالجة بالصادات الحيوية وذلك لكي يكون هذا الفحص قابلاً للتحليل (جدول 3). هذا وإن وجود خلايا

بشرية (إيبيتالية) متعددة بالفحص الخلوي (عند المرأة) أو وجود عدة جراثيم يؤدي للشك بثلوث، مما يتطلب إعادة الفحص.
الفحص المباشر يمكن أن يساعد على اختيار المعالجة الأولية بالصادات الحيوية.

3. خطة المعالجة

- من الناحية السريرية يجب تمييز:
- الإنسان الشائع: هل هو إثنان مثناة (إثنان بولي منخفض غير مختلط)؛ وإثنان نسجي (إثنان الحويضة والكلية، التهاب البروستات) مختلط أو لا بتجرثم دم؟
 - الإنسان المتوضع على قنطرة بولية: هل هو إثنان نوزوكوميالي أو توضع جرثومي "استعماري".
- أعراض التهاب المثانة = وجود واحد أو أكثر من العلامات التالية: تعدد البول، حرقة أثناء التبول، عسرة تبول، بول عكر أو نزفي.
- أعراض الإصابة النسيجية = حمى، آلام بطنية أو قطنية في حال التهاب الحويضة والكلية، آلام ختلية. مس شرقي بالنسبة لالتهاب البروستات ± علامات التهاب المثانة.

جدول 2 - الفحص الخلوي الجرثومي للبول:

تقنية أخذ العينات

تعليم مسبق موضعي	رجل: أخذ بداية البول (تحت المراقبة)، أو بزل فوق العانة
مريض باستطاعته حبس البول	مريض عنده قنطرة بولية: بزل للقنطرة بعد قفلها.
- أخذ للبول عند منتصف (التهاب المثانة أو التهاب الحويضة والكلية)	الامتناع المطلق عن البزل في الكيس المستقبل للبول أو عند فوهة القنطرة
- أخذ بداية البول (تأخر إحصلي)	فيما يتعلق بالعينة
مريض لا يستطيع حبس البول	- يجب إرسالها إلى المخبر خلال فترة > ساعة
- رضيع: استعمال مجمع معقم	- من الممكن الاحتفاظ بها تحت حرارة 4° بضع ساعات
- امرأة: قنطرة المثانة	- وضعها في زجاجة مع مثبت النمو

جدول 3 - تحليل نتائج الفحص الخلوي الجرثومي للبول

الكريات البيض في البول/مل	الجرثائم التفسير/والمسبب المحتمل	بول طبيعي
$10 \geq$		$10 >$
$10 <$	التهاب بولي أكيد، اختبار التحسس الجرثومي للصادات ضروري	$10 \leq$
$10 <$	التهاب بولي ممكن، التهاب بروتينات، التهاب حويضة وكلية، التهاب	ما بين
	الإحليل (أخذ عينة إقليمية، كلاميديا، ميكوبلازما)	$10 - 10^5$
$10 <$	التهاب بولي مخفي، التهاب بروتينات، التهاب إحليل (أخذ عينة	$10 \leq$
	إقليمية: كلاميديا، ميكوبلازما) أو سل (طلب زرع في وسط خاص)	
	التهاب كلية خلوي	
$10 \leq$	تلوث	$10 \geq$

إنتان بولي ممكن: لأخذ الأعراض السريرية بعين الاعتبار (تكرار الفحص)

1. الإنتان البولي الشائع عند الأنثى:

1. التهاب المثانة الحاد:

هل هو متكرر؟ هل يوجد مرض أو حالة فيزيولوجية مؤهبان (الداء السكري، نقص المناعة، الحمل)، شذوذات تشريحية أو وظيفية للمجاري البولية (تشوه ولادي، ورم، حصاة، جراحة بولية تناسلية - حديثة).

١ - التهاب المثانة الحاد المتكرر:

إيجابية الشريط البولي (كريات بيض، نيتريت) كافية لوضع التشخيص هذا وفي حال كون الشريط البولي سلبي فإنه ينفي التشخيص (سلبية خاطئة > 5%). الفحص الخلوي الجرثومي للبول غير مفيد. وذلك أمام صورة سريرية واضحة. خاصة إذا كان الأمر يتعلق بحادثة وحيدة أو حتى متعددة ولكن بشرط أن تكون أقل من 4 التهابات/سنة. هذا ولا يوجد استطباب لأي فحص مكمل آخر. ويجب الانتباه إلى وجود حمل في بدايته، المعالجة القصيرة (جرعة واحدة أو 3 أيام) يجب أن تفضل وذلك في حال عدم وجود مضاد استطباب لها (جدول 4). المعالجة بالصادات الحيوية تكون احتمالية (جدول 5). الفحص الخلوي الجرثومي للبول يجب أن يجرى في حال فشل المعالجة (استمرارية الأعراض أكثر من 7 أيام)، أو انتكاس باكر، تكرار الالتهاب.

**جدول 4 - مضادات استطباب المعالجة القصيرة
(جرعة وحيدة أو 3 أيام) في حال التهاب المثانة**

• طفل ذكر أو أنثى	• إنتان متكرر
• للذكر	• امرأة حامل، سكري، نقص مناعة، مثانة
• أنثى < 65 سنة	• عصبية
• ترفع حروري	• آفات بولية، تدخل جراحي أو تنظير بولي
• آلام قطنية	• حديثين

2 - في التهاب المثانة الحاد المصاحب بمرض مزمن مثانة معينة:

في حالة الحمل: أنظر فيما بعد.

في حالة التهاب المثانة عند أشخاص مصابين بأمراض معينة (السكري...) أو في حالة وجود ظروف خاصة (تشوهات بولية...)، مدة المعالجة بالصادات الحيوية، عن طريق الفم، يجب أن تكون من 7 - 10 أيام. الأخذ بعين الاعتبار للحالة المعنية ضروري (استقصاءات خاصة، طلب استشارة بولية).

3 - في التهاب الإحليل الحاد عند المرأة في فترة الحمل (انظر الفصل 12):

التظاهر السريري هو تظاهر التهاب المثانة. وهو يتميز بوجود كريات بيض + نيتريت على الشريط البولي، الفحص الخلوي الجرثومي للبول وأخذ العينات الإحليلية (كلاميديا تراكوماتيس، ميكوبلازما) يجب أن يحققا. إذا ظهر في الفحص الخلوي الجرثومي للبول وجود جراثيم بولية ≤ 310 مل (في أغلب الحالات الإيشيريشيا كولاي) فالمعالجة تكون مماثلة للمعالجة في حالة التهاب المثانة الحاد المنعزل. إذا كان البول عقيماً: يجب إعطاء دوكسيسيكليين أو ماكروليد على الأقل 10 أيام.

2. التهاب الحويضة والكلية الحاد:

الأعراض السريرية هي أعراض إنتان بولي مع حمى وآلام قطنية عفوية أو محرضة. يوصف التهاب الحويضة والكلية الحاد بأنه غير مختلط إذا حدث عند الأنثى ما بين 15 - 56 سنة، وفي حال غياب علامات إنتان شديد، وغياب تشوهات عضوية أو وظيفية للشجرة البولية أو حالات خاصة: سكري، نقص المناعة، القصور الكلوي.

جدول 5 - المعالجة بالصادات الحيوية للإلتهاب المثانة

جرعة وحيدة	معالجة لمدة 3 أيام	معالجة من 7 - 10 أيام
بيفلوكساسين: 800 مغ	لوميفلوكساسين 400 مغ	نيتروفورانتوين (فوراينتئين)
(بيفلالسين جرعة وحيدة)	حبة واحدة/يوم (لوجيفلوكس)	حمض نابيديكسك (نيرغرام فور)
سيبروفلوكساسين: 500 مغ	نورفلوكساسين 400 مغ	حمض بيبيميديك (بيبرام فور)
(لو نيفلوكس)	حبة واحدة صباحاً وحبة مساءً	فلوميكين (أبورون)
أوفلوكساسين: 400 مغ	(نوروكسين 400 مغ)	نورفلوكساسين (نوروكسين)
(مونوفلوسيت)		
فوسفوسين - تروميتامول: 3 غ		إينوكساسين (إينوكسور)
(مونوريل، أوريدوز)		بيتميسيلينام (سيليكسيد)
كوتريموكسازول: 3 حبات		سيفالوسبورين جيل 1 عن طريق الفم
(باكتريم فور)		
غياب وجود مضادات	بدل للمعالجة ذات الجرعة	
الاستطباب (جدول 4)	الوحيدة يجب أخذ رأي المريض	
	بعين الاعتبار	

* سعر معتدل.

2. الإلتهابات الحويضية والكظرية الحوية

الفحوص المكملّة الضرورية هي الفحص الخلوي الجرثومي للبول، صورة بسيطة للبطن، إيكو للكليتين، هذه الفحوص الشعاعية تجرى للبحث عن (حصاة +++) ويجب أن تجرى خلال الـ 24 ساعة الأولى. هذا ويجب التأكيد من عدم وجود الحمل قبل البدء بالمعالجة، هذه الأخيرة يمكن أن تتم في المنزل وذلك في حال غياب الأعراض الهضمية. الحالات المؤلمة جداً، أو عند المريض ذو الوضع الاقتصادي الاجتماعي السيئ. المعالجة بصاد وحيد احتمالي في البدء تكون عن طريق الفم (سيبروفلوكساسين 1 غ/يوم، أوفلوكساسين 400 مغ/يوم)، أو عن طريق الوريد أو العضل (سيفترياكسون 1 غ/يوم داخل العضل، أو سيفوتاكسيم 3 غ/يوم داخل الوريد).

هذا وتكيف المعالجة بعد ذلك حسب فحص التحسس الجرثومي للصاد الحيوي، حيث يجب اختيار الصاد الحيوي الممكن إعطاؤه عن طريق الفم، والغير مكلف (أموكسيسيللين، أموكسيسيللين - حمض الكلافولينيك، سيفياسيم، فلووروكينولون).

مدة المعالجة بالصادات الحيوية تتراوح بين 10 - 14 يوماً.
المراقبة تستند إلى تطور الصورة السريرية وفحص البول والراسب بعد 4 أسابيع من إيقاف المعالجة.
يجب إدخال المريض إلى المشفى في حالة الفشل بعد 72 ساعة من المعالجة، في حالة وجود جراثيم متعدد المقاومة أو اكتشاف شواذات (توسع) بفحص الإيكو الكلوي.

٢٢ - ٢٣. التهابات الحويضة والكلى و التهابات المثانة والمرارة:

التهاب الحويضة والكلى أثناء الحمل: أنظر لاحقاً.
يشمل تحت هذا العنوان التهابات الحويضة والكلى مع علامات إنتانية خطيرة (تجرثم شديد، صدمة إنتانية)، عند ناقص المناعة، فقد معاوضة لمرض مزمن، عائق في المجاري البولية، خراج حول الكلى، وأخيراً التهابات الحويضة والكلى المتكررة أو المسببة من جراثيم متعددة المقاومة. الفحوص المكملّة الضرورية هي الفحص الخلوي الجرثومي للبول، زرع الدم، تعداد وصيغة، كرياتينين الدم، وإيكو للكليتين. هذا الأخير يجب أن يحقق بشكل إسعافي، التصوير الطبقي المحوري البولي (للكلى مع صور ظليلة أثناء التبول) يجب أن تناقش لمعرفة ضرورة القيام بها أو لا. هذا الفحص يجب أن يجرى أيضاً في حالة فشل المعالجة أو تكرار الالتهاب.

الإنسان البولي الحادث نتيجة وجود عائق بولي يعتبر حالة إسعاف جراحية. لذلك بالإضافة إلى المعالجة العامة (للتجرثم والمرض المزمن...)، فإن المعالجة بالصادات الحيوية القاتلة للجرثوم يجب أن تشمل ترافق دوائين من عائلتين مختلفتين دامجة ما بين أمينوزيد بواسطة الحقن، سيفالوسبورين جيل 3 حقن أيضاً أو فلوروكينولون بواسطة الحقن أو عن طريق الفم (سيبروفلوكساسين أو أوفلوكساسين) حسب الحالة.

يجب أن تستمر المعالجة بالصادات الحيوية لمدة 3 أسابيع على الأقل (حتى 6 أسابيع)، وذلك حسب الصورة السريرية للجهاز البولي (وجود عائق).

3. الإلتان البولي عند المرأة الحامل:

- البحث عن وجود جرثوم في البول يجب أن يتم بشكل روتيني:
- بواسطة الشريط البولي عند كل استشارة أثناء الحمل، مع تحقيق فحص خلوي جرثومي للبول في حالة وجود إيجابية الكريات البيض أو النيتريت.
- بواسطة فحص خلوي جرثومي للبول، في حالة وجود الداء السكري، سوابق إلتان بولي أو مرض في الجهاز البولي.
- التهاب المثانة أو وجود جرثوم في البول غير ممرضة تعالج خلال 7 - 10 أيام، اختيار الصاد الحيوي يكون وفقاً لفحص التحسس الجرثومي للصاد الحيوي.

التهاب الحويضة والكلية تتطلب وضع المريض في المشفى وذلك للبدء بالمعالجة بالصادات الحيوية عن طريق الوريد (سيفالوسبورين جيل 3) مع تكيف الصادات الحيوية وفقاً لفحص التحسس الجرثومي للصاد الحيوي (بينالكتامين عن طريق الفم أو الحقن)، لفترة قدرها 3 أسابيع. هذا ويجب القيام بفحص البول والراسب كل شهر حتى الولادة وذلك لكشف تكرار الالتهاب الذي يجب معالجته كالتهاب الحويضة والكلية البدئي.

4. التهاب المثانة المتكرر:

- يعرف بحصول التهابات بولية منخفضة متكررة (<4/سنة). هذا ويجب أن يؤكد وجود الالتهاب البولي بواسطة فحص البول والراسب. كما يجب نفي وجود سبب نسائي (استشارة أخصائية)، مرض بولي (حصاة، ورم، نشوه ولادي) بواسطة الاستجواب، التصوير الطبقي المحوري البولي، استشارة بولية من أجل تحقيق تنظير المثانة، تصوير المثانة الظليل + تصوير الحالبين بالطريق الراجع. بالإضافة إلى الإجراءات الصحية العامة (الإكثار من شرب السوائل، نظافة جيدة فرجية مهبلية خاصة بعد الممارسة الجنسية، التخلص من الراسب البولي، معالجة الإمساك المرافق) فإن المعالجة تتعلق بعدد مرات تكرار الالتهاب:
- إذا كان التكرار قليلاً (4 - 6/سنة) فإنه يجب معالجة كل حادثة التهاب على حدة، ومن المفضل أن تكون المدة من 7 - 10 أيام (جدول 5).

- إذا كان التكرار أكثر ارتفاعاً، فإن إعطاء صادات حيوية بصورة وقائية ولفترة طويلة (6 أشهر أو أكثر) يمكن مناقشته، هذه المعالجة أهميتها تكمن في إنقاص عدد معاودة الالتهاب، لكنها يمكن أن تؤدي إلى اصطفاء جراثيم مقاومة وتكرر متعدد للالتهاب عند إيقاف المعالجة: إعطاء يومي أو مرتين أو ثلاثة في الأسبوع، مساءً قبل النوم: للصاد الحيوي المختار بجرعة تتراوح من $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{4}$ الجرعة الشافية اليومية (جدول 6).
- إذا كانت التهابات المثانة محرصة نتيجة الممارسة الجنسية: فإنه يجب أخذ - بعد الممارسة الجنسية - جرعة واحدة من الصاد الحيوي مع كأس ماء كبير وتبول بعد الممارسة.

جدول 6 - المعالجة الوقائية بالصادات الحيوية للإلتهابات البولية المتكررة (45/سنة)

نيتروفرانتوين	50 - 100 مغ	حمض ناليديكسك 500 مغ
كوتريموكسازول	80 - 400 مغ	حمض بيبيميديك 200 مغ
تريميثوبريم	100 - 200 مغ	نورفلوكساسين 400 مغ
سيفاليكسين	250 مغ	سيبروفلوكساسين 250 مغ

2. الإلتهاب البولي الشائع عند الرجل:

1. التهاب المثانة:

يعتبر التهاب المثانة نادر عند الرجل. بعد عمر الخمسين وجود أعراض إنسان بولي منخفض يجب أن تقود للتفكير بالتهاب البروستات، والالتهاب البولي المتكرر من دون وجود تشوهات في الطرق البولية العليا يجب أن يقود للتفكير بوجود التهاب البروستات المزمن.

2. التهاب الحويضة والكلية:

المعالجة هي نفسها الخاصة بمعالجة التهاب الحويضة والكلية المختلط عند الأنثى (أنظر سابقاً).

3. التهاب البروستات الحاد:

التناذر الإلتهابي شديد وذو بداية مفاجئة، مع اضطرابات في التبول، وآلام حوضية مبهمة. المس الشرجي يعد أهم خاصة تشخيصية ولكن تدليك

البروستات غير منصوح به لأنه مؤلم ويمكن أن يؤدي إلى حدوث تجرثم دم. الفحص الخلوي الجرثومي للبول، المأخوذ في نهاية التبول، يمكن أن يكون سلبياً أو لا يظهر إلا وجود بيلة جرثومية غير شديدة. زراعة الدم يجب أن تجرى بشكل روتيني. هذا ويستطب الإيكو عبر الإحليل في حالة عدم التأكد من صحة التشخيص أو للبحث عن وجود خراج. احتباس البول الحاد مع وجود ترفع حروري يعتبر مكافئاً لالتهاب البروستات الحاد ويتطلب اللجوء إلى طبيب البولية لوضع تفجير للمثانة فوق العانة، بهدف علاجي وتشخيصي (الجرثوم المسبب) كما أنه يجب إجراء فحص الإيكو. المعالجة بالصادات الحيوية تكون بالسيفالوسبورين عن طريق الحقن أو الفلوروكينولون عن طريق الفم (أو فلوكساسين 200 مغ \times 2/يوم، سيبروفلوكساسين 500 مغ \times 2 /يوم، ليفوفلوكساسين 500 مغ/يوم جرعة واحدة)، هذا وفي الحالات الشديدة يجب إضافة أمينوزيد عن طريق الحقن، حتى زوال الترفع الحروري. ومن ثم يتابع العلاج بالصادات الحيوية الفموية ذات الانتشار البروستاتي الجيد، فلوروكينولون أو كوتريموكسازول وذلك حسب نتائج فحص التحسس الجرثومي للصاد الحيوي.

مدة المعالجة بالصادات الحيوية هي من 4 - 6 أسابيع. الآلام تعالج بواسطة المسكنات، حيث أن الأدوية الكورتيزونية مضادة استتباب هنا. في حال وجود خراج يجب تحقيق إما بزل بواسطة الإبرة - موجه بالإيكو - أو تفجير جراحي.

4. التهاب البروستات المزمن:

التشخيص صعب غالباً: آلام حوضية مزمنة مع "انزعاج عند التبول" صورة سريرية "التهاب مثانة" متكرر. المس الشرجي لا يعطي دائماً علامات مشخصة. حساسية الفحص الخلوي الجرثومي للبول يمكن تحسينها إذا أخذنا العينة في نهاية الدفع بعد تحقيق تدليك البروستات. زرع اللطاف يمكن أن يعطي نتائج إيجابية في بعض الأحيان. الإيكو عبر الشرج يري الأنبيات النسجية التي من الممكن أن تكون منبعاً للتكرار الإنتاني.

- آخذين بعين الاعتبار التليف والتكلس النسيجي للبروستات الحاصلين كرد فعل على الالتهاب المعتدل فإنه يجب:
- استعمال صاد حيوي ذو انتشار بروتاتتي جيد، بصورة خاصة الكوتريموكسازول، أو الفلووروكينولون، مكيفان حسب طيف الجرثوم المعزول، السيكلين يمكن أن يسمح بمعالجة إنتان مرافق بالكلاميديا.
 - مدة المعالجة من 4 - 12 أسبوع حسب تطور المرض.
 - مناقشة استئصال البروستات الكامل أو الجزئي في حالة الإنتان المعند على العلاج.

5. التهاب البربخ والتهاب البربخ والخصية:

قبل عمر الـ 35 تعود هذه الالتهابات إلى الجراثيم المنقولة عن طريق الجنس، الكلاميديا والمكورات البنية. عند المريض الشاب يجب نفي وجود انفثال الخصية (القيام بفحص إيكو - دوبلر في حال الشك)، كما يجب نفي النكاف (التهاب الغدة النكفية، الأميلاز). عند المريض الكهل، الجراثيم المعدية (إيشيريشيا كولاي، بروتايوس) هي المسبب غالباً، بصورة أقل البسودوموناس أيروجينوزا، مكورات عنقودية مذهبية، والمكورات المعوية. هذا ويجب البحث عن وجود التهاب بروتات مرافق لأنه يتحكم بمدة المعالجة بالصادات الحيوية. تكيف المعالجة بالصادات الحيوية حسب الجرثوم المسبب، ويمكن أن تكون هذه المعالجة احتمالية (حسب العمر، أو القصة البائية). وهي تكون - في حالة التهاب البربخ والخصية المنعزل - بالفلووروكينولون لمدة 10 أيام، مرافقة في البداية مع مضادات التهاب كورتيكوستيرويدية أو غير كورتيكوستيرويدية.

3. التهاب البول عند الطفل:

حدوث التهاب البول عند الرضيع أو الطفل الذكر يشير في 50% من الحالات إلى وجود تشوه ولادي (قلس مثاني - حالب) والذي يبحث عنه بصورة روتينية.

عند الفتيات ما بين 5 - 12 عاماً، التهاب المثانة البسيط لا يتطلب البحث عن السبب، وذلك إذا كان هذا الالتهاب غير متكرر. ولكن في حال

تكرره فإنه يجب البحث عن سبب له.

المعالجة تخضع لنفس مبادئ المعالجة عند البالغ، وبصورة خاصة البييتالاكتامين. الفلوروروكينولون والمعالجة القصيرة مضادة استطباب عند الطفل.

4. التهاب البول الحاصل على الفتطرة البولية:

الأمر يتعلق في أغلب الأحيان بإنتان حاصل في المشفى (نوزوكوميالي).
العلامات السريرية للإنتان البولي تكون نادرة. آلام بطنية - حوضية +
ترفع حروري يجب أن تقود إلى القيام بفحص البول والراسب وزرع الدم. إن
وجود زرع كمي $\leq 10^5$ /مل ضروري لوضع التشخيص. هذا وإن تفسير
الفحص البولي صعب أحياناً وذلك لوجود (عدة جراثيم) مما يتطلب إعادة
فحص البول والراسب عدة مرات. في حال وجود أعراض أو حمى: إيكو
للكليتين (أو للبروستات) أو الاثنين معاً وأحياناً تصوير طبقي محوري بولي.
هذا ويجب نزع أو تغيير الفتطرة البولية بشكل روتيني.

المعالجة بالصادات الحيوية تعطى فقط في حالة الإنتان العرضي (أنظر
فصل 29 "الإنتانات المصاب بها في المشفى - النوزوكوميالية -).

عند المريض الذي عنده فتطرة بولية، الإنتان الغير عرضي (بيلة
جرثومية) يجب ألا يبحث عنه وألا يعالج. بعد نزع الفتطرة البولية، فإنه يجب
القيام بالفحص الخلوي الجرثومي للبول بعد 48 - 72 ساعة، وإعطاء معالجة
بالصادات الحيوية إذا كانت زراعة البول إيجابية.

المعالجة الوقائية بالصادات الحيوية عند تغيير الفتطرة غير منصوح بها.

5. تجرثم البول الغير عرضي:

هذا العنوان يعني وجود إيجابية على الشريط البولي أو الزرع البولي من
دون وجود أعراض سريرية.

عند المرأة الحامل والمريض المجري له زرع كلية فإن كون أحد هذين
الفحصين إيجابياً يتطلب معالجة دوائية حتى في حال غياب الأعراض.

13. الإنتانات الجلدية

تحدث الإنتانات الجلدية نتيجة وجود تشقق في الجلد، ومن الممكن أن تتطور إما بامتدادها موضعياً (خراج، التهاب الجلد واللحمة، نتخر)، أو في المنطقة المصابة (التهاب الغدد اللعابية، التهاب الوريد الخثري، التهاب العظم)، أو بشكل عام (تجرثم الدم). تظاهرها السريري يتعلق بطريق دخولها (جرح علاجي المنشأ، أو لا، عضه...) أو حالة المريض العامة (سكري، نقص مناعة...).

1. الجراثيم المسببة

أغلب الإنتانات الجلدية تعود إلى المكورات العنقودية الذهبية أو المكورات العقدية المقيحة، الجراثيم الأخرى تكون مسؤولة عن إنتانات خاصة وتعطي أيضاً صورة سريرية خاصة (احمرار، نتخر...) حسب الجرثوم أو طريقة حدوثها. الدراسة الجرثومية ضرورية من أجل وضع التشخيص والمعالجة (جدول 1).

جدول 1 - أخذ العينات المجهرية العضوية حسب طبيعة الآفة

من أجل فحص مباشر أو زرع (في كل الحالات يجب إعلام طبيب المخبر عن هدفنا وعن ماذا نريد أن نبحث):

- على وسط لاهوائي أو هوائي.

- على أوساط خاصة: ميكوبكتيريا، باستوريللا، أكتينوميسيت...

آفة جافة: حف بواسطة أجهزة معقمة، زرع للتوسفات.

آفة مبرعمة: خزعة أو زرع سحجة.

آفة نازة: مسح.

حويصلة أو فقاعة: مسح أو شطف آفة غير متفجرة.

تجمع أو خراج: شطف مع تفجير قبل تكون ناسور.

2. الطرق العلاجية

معقمات موضعية (أنظر الفصل 45).

معالجة بالصادات الحيوية عن الطريق العام. غالباً معالجة بصاد حيوي

وحيد عن طريق الفم، استعمال أكثر من صاد حيوي واحد يدخر لمعالجة الإنتانات الخطيرة أو العائدة لعدة جراثيم أو لجراثيم معدنة (جدول 2).
العناية الصحية العامة (جدول 3).
الوقاية من الكزاز والكلب (أنظر فصل 16).

3. معالجة الإنتانات التي تصيب الموارز الجلدية Phanères

1. التهاب الجراب الشعري (مكورات عنقودية مذهبية، نادراً جراثيم غرام سلبي):
تصيب غالباً المناطق المشعرة من الوجه (الذقن)، الرموش، جلد شعر الرأس، الجزء العلوي من الجزع، المؤخرتين، الفخذين والساقين.
التهاب الجراب السطحي:
خراج صغير حول الجرابي في مركزه يوجد شعرة. المعالجة عناية موضعية متضمنة نظافة عامة. وتطبيق يومي لمعقم (هيكزوميدين، بيتادين، هيبيتان)، كما يجب حذف العوامل المهيجة.

جدول 2 - الصادات الحيوية الأساسية للإنتانات الجلدية

الصاد الحيوي	انتشاره الجلدي	استطاباته حسب الجرثوم المسبب
بنيسيللين G أو V	±	مكورات عنقودية، كلوستريديا، اللتينوميسين، حمرة الخنزير
بنيسيللين A	±	مكورات عنقودية
بنيسيللين M	±	مكورات عنقودية
سيفالوسبورين جيل 1 و 3	++	مكورات عنقودية
سيفتازيدين	++	بسودوموناس أيروجينوزا
بيبيراسيللين - تازوبلاكتام	++	عصيات غرام سلبي، بسودوموناس أيروجينوزا، مكورات معوية، لاهوائيات
أو إيميبينيم	++	مكورات عنقودية، عصيات غرام سلبي، بسودوموناس أيروجينوزا
أمينوزيد (مرافق مع صاد حيوي آخر)	++	مكورات عنقودية، باستوريللا، لاهوائيات، أكتينوميسين، ميكوبكتيريا غير نموذجية
ماكروليد	+++	مكورات عنقودية، باستوريللا، سترپتو غرامين

لاهورائيات، كورينباكتيريا		
لينكوساميد	+++	مكورات عقدية، مكورات عنقودية، لاهورائيات
تيتراسيكلين	+++	باستوريلا، بارتونيلا
أوفلوكساسين،	+++	مكورات عنقودية، جراثيم معوية، بسونوموناس
سيبروفلوكساسين		أبروجينوزا، باستوريلا، ميكوباكتيريا غير نمونجية
صادات حيوية أخرى		
ريفاميسين، ريفابوتين	++	ميكوباكتيريا
حمض الفوسيديك	+++	مكورات عنقودية
إيميدازول	++	لاهورائيات
كوتريموكسازول	++	نوكارديا

جدول 3 - إجراءات صحية عامة

- استحمام يومي.
- غسل أيدي متعدد أو متكرر.
- فرك للأظافر بالفرشاة وقص جيد لها.
- مناشف خاصة مفسولة على حدة.
- الأكياس الداخلية اللطيفة (يجب أن تكون مغلقة).

التهاب الجراب العميق:

يصيب الجراب الشعري بأكمله، ويجعله مركزاً لتفاعل التهابي شديد ومؤلم. ومن خطورته أنه يمكن أن يتطور إلى خراج أو نحو الإزمان. حالة خاصة: تينة اللحية.

المعالجة موضعية ولمدة عدة أشهر (أنظر التهاب الجراب السطحي)
+ بريسيتيناميسين 50 مغ/كغ/يوم أو بنيسيلين 30 M - 50 مغ/كغ/يوم
لمدة 5 - 10 أيام.

تينة اللحية: يستعمل معجون حلاقة مضاد للالتهاب (نوباكتير، موسديرم)، شفرة الحلاقة تستعمل لمرة واحدة، تطهير مراكز التنقيح: مرهم صاد حيوي.

الدمل البسيط:

التهاب جريبي عميق ناخر عائد إلى المكورات العنقودية. مما يؤدي إلى تشكل بقايا تطرح تاركة مكانها ندبة منخفضة نهائية. اختلاطات محتملة:

الجمرة الخبيثة (مجمع مامل) مع علامات عامة، مكورات عنقودية وجهية خبيثة، تجرثم الدم.

المعالجة الموضوعية: عدم رض الآفة على الإطلاق، غسل بواسطة الكاربانيليد (سولباكثير)، ضمادات كحولية 70% أو (أنتيفلوجيستين، أوزموجيل)، خلع البقايا بواسطة الملقط. المعالجة بالصادات الحيوية المضادة للمكورات العنقودية في بعض الاستطابات: نمل الوجه، حالة مريض عامة مؤهبة (سكري، نقص مناعة، سوء تغذية، طعم)، مدة المعالجة 5 - 10 أيام وذلك حسب التطور.

الدمامل:

دمامل متكررة الحدوث وذات تطور مزمن.

- بالإضافة إلى الإجراءات السابقة المطبقة على كل هجمة، يجب المعالجة بالصادات الحيوية عن الطريق العام لمدة 2 - 3 أسابيع: بنيسيلين 30 M - 50 مغ/كغ/يوم أو بريستيناميسين 5 مغ/كغ/يوم.
- تطهير مراكز التقيح بالمكورات العنقودية.

- فوق السدبات الدملية: غسل يومي بواسطة مطهر، وضع مرهم صا حيوي أو هيكرزوميدين عبر الجلد 10 - 20 يوم بالشهر لمدة 3 أشهر.
- تطهير المراكز الأساسية (الإبطيين، العانة، الشرج، المنخرين) بواسطة الهيكرزوميدين، أو مرهم صا حيوي إفوسيديين مرهم أو حتى موبيروسين (باكتروبان، موبيديرم).

- البحث عن وجود حالة عامة مؤهبة عند المريض.
- البحث عن حامل للمكورات العنقودية في محيط المريض (وذلك لمعالجته بنفس الوقت).

المكورات العنقودية الخبيثة الوجهية:

تحدث نتيجة أذية لدمل وسط الوجه، وهي عبارة عن إنتان شديد مختلط بتجرثم الدم وبخثرة الأوردة الوجهية مع خطورة حدوث التهاب وريد خثري للجيب الكهفي. يجب وضع المريض في المشفى بشكل إسعافي، وإعطاء صادات حيوية عن طريق الوريد (أنظر فصل 2).

2. التهاب الغدد العرقية:

تفتح بالمكورات العنقودية للغدد العرقية وللجيوب الشعرية للحفرة الإبطية وللمناطق العانية التناسلية.

المعالجة: مطهرات موضعية، صادات حيوية عن الطريق العام عند حدوث الهجمات، تفجير جراحي للخراجات. في أقصى الحالات استئصال عميق كامل للغدد العرقية المصابة بالإنتان.

4. معالجة التهابات الإبتاتات

1. القوباء: مكورات غرام + (مكورات عقدية مقبحة، مكورات عنقودية مذهبية):

تفتح جلدي سطحي، كثير العدوى، حويصلي فقاعي، تتشكل على سطحه قشور. وهو يتوضع على الوجه والنهايات؛ ومن الممكن أن يختلط باختلاطات موضعية أو عامة. أشكال خاصة: قوباء منخرة (Ecthyma): حصول القوباء على مرض جلدي سابق (جرب، أكزيميا)، القوباء الفقاعية بالمكورات العنقودية عند الرضع (دور سم الإيكسفوإليانت (exfoliante).

المعالجة:

● معالجة معقمة:

- شاشات مضمخة بمعقمات ممددة أو مراهم (كوتيزان، داليبور) وذلك لترخية القشور.
- غسل المناطق المصابة بالمعقمات (KMnO_4 مدد 1/10000، كاربانيليد).
- دهن بالهيكزوميدين سائل، مرتين باليوم.
- صادات حيوية عن الطريق العام لمدة 10 أيام.
- القوباء بالمكورات العقدية: بنيسيلين A أو ماكروليد.
- في حال الفشل أو القوباء بالمكورات العنقودية أو بالمكورات العنقودية والعقدية: من المفضل إعطاء البنيسيلين M، حمض الفوسيديك أو البريستينايسين.

- إجراءات صحية عامة، عزل الأطفال المصابين.
- عدم وصف الكورتيزونات سواء موضعية أو عامة.

2. المَزَح Intertrigo:

مكورات غرام ⊕، جراثيم معوية، بسودوموناس أيروجينوزا وأيضاً مبيضات سببياً، فطور جلدية (أخذ عينات إجباري).
المعالجة: غسل بمعقم مرتين باليوم، وضع هيكلوميدين سائل أوبيتادين، عدم وضع مراهم جيلاتين وذلك بسبب خطر حدوث تموت.

5. معالجة الإنتانات الجلدية الالتهابية Dermo-hypodermique

1. الحمرة Erysipèle (مكورات عقدية زمرة A):

التهاب جلدي - لحمي جرثومي حاد منتشر، يحدث كاختلاط لإنتان موضعي على المكورات العقدية، يتميز بتوضع خاص (الطرف السفلي، الوجه)، وبخطورة تكرره.

المعالجة: بالبنيسيللين 10 - 20 مليون وحدة/يوم موزعة على 4 - 6 حقن. ومن ثم يتم متابعة المعالجة عن طريق الفم حال اختفاء الترفع الحاروري: أموكسيسيللين 3 - 4.5 غ/يوم موزعة على 3 جرعات، في حال وجود مضاد استطباب على البنيسيللين: مكاروليد أو بيسيتيناميسين أو كلينداميسين: مدة المعالجة: 10 - 20 يوم. كما يجب معالجة فوهة دخول الجرثوم معالجة مناسبة. يجب عدم إعطاء مضادات التهاب إطلاقاً.
إعطاء معالجة وقائية مضادة للتخثر فقط في حالة وجود عوامل مؤهبة لحدوث مرض خثري - صمامي.

الحمرة المتكررة: معالجة بالصادات الحيوية في حال التكرار. معالجة فوهة الدخول، الونمة، أو الونمة اللفافية. معالجة وقائية بالصادات الحيوية: بنيسيللين (إيكستسيللين) أو مكاروليد خلال 3 أشهر على الأقل.

2. إنتان الجلد واللحمة الجرثومي النخري وإنتان الوجه النخري:

أنظر الفصل 14.

3. الإنتان اللمفاوي (المكورات العقدية المقيحة، المكورات العنقودية المذهبة):

التهاب وعاء لمفاوي تال لإنتان مجاور (جرح، بزل وريدي، مَزَح، حمرة).

المعالجة: ضماد كحولي، بريسيتيناميسين.

4. الظفر الناشب:

إنتان خطير لنسج الإصبع، بعد إلحاق جرثومي.

خطورة وظيفية.

المعالجة: غسل بمطهر، معالجة بالصادات الحيوية: بريسيتيناميسين أو

بنيسيللين، تفجير جراحي.

5. الجروح الملتهبة (مكورات عنقودية مذهبة، مكورات عقدية مقيحة،

عصيات غرام سلبية، لاهوائيات):

سبب الجرح: أرضي (خطر حدوث الكزاز) أو تال للمعالجة

(نوزوكوميالي).

المعالجة: غسل غزير بمعقم، ومن ثم غسل بسيروم معقم أو بالماء

الأوكسجين وذلك لطرح الأجسام الأجنبية، وضع مضادات التهاب، صادات

حيوية عن الطريق العام (مثل: أموكسيسيللين - حمض الكلافولينيك، أو

بريسيتيناميسين)، في حال وجود جرح عميق، متشمق قريب من مفصل أو وتر،

أو جرح ناتج عن عضه، أو في حال وجود قشط للحم متأخر حسب طبيعة

وشدة الآفات.

وقاية من الكزاز (أنظر الفصل 16).

6. الخراجات:

مكورات عنقودية مذهبة، مكورات عقدية مقيحة، عصيات غرام سلبية (حقن منتن، خراج بعد عمل جراحي).
ضماد كحولي، تفجير جراحي.
معالجة بالصادات الحيوية: بنيسيلين M أو بريستيناميسين في حالة حقن منتن، سيفالوسبورين جيل 2 أو جيل 3 + أمينوزيد + ميترونيدازول في حالة خراج بعد عمل جراحي.
وقاية ضد الكزاز (أنظر فصل 16).

7. ورم دموي نتيجة الإصابة بعصيات Angiomatose bacillaire (بارتونيللا كينتانا، بارتونيللا هينسيلا):

يحدث عند مرضى: السيدا أو المرضى الذين زرع لهم عضو ما.
المعالجة: إيرتروميسين 5 مغ/كغ/يوم لمدة 3 - 4 أسابيع.

8. خشكريشة Escare (القرح الجلدي):

القرح هو عبارة عن قرحة جلدية غالباً عميقة، في مناطق الاستناد عند العجز. ضغط الأوعية يؤدي إلى تتخر، هذا التخر يلتهب فيما بعد وبصورة خاصة بواسطة عصيات غرام (+) أو المكورات العنقودية المذهبة. المعالجة الموضعية تكون بتطهير يومي ومعقمات. الاستئصال الجراحي يمكن أن يكون مستطباً، كذلك المعالجة بالصادات الحيوية عن الطريق العام وذلك في حالة الإنتان المترافق بترفع حروري.
المعالجة الفيزيائية، والتدليك هي طرق الوقاية الأساسية.

9. القرحة الجلدية:

معالجة السبب (رباط ضاغط لقرحة دوالي، معالجة دوائية لالتهاب الشرايين).
عناية موضعية ومراقبة صحية موضعية.

6. إصابات جلدية عائدة لسم المكورات العنقودية

تتأثر تسممي مرتبط بتوليد الإيكزوتوكسين (السم الخارجي) الحال للبشرة (إيكزوفولييتين) أو المولد للاحمرار أو الشال للأوعية (تتاثر الصدمة السمية سم (1) أو TSST₁) بواسطة بعض زمر المكورات العنقودية المذهبة.

جدول 4 - "تتاثر الأطفال المغليين ébouillantés"
وتتاثر الصدمة السمية

التتاثر	السموم	العمر	المعالجة
التهاب البشرة exfoliatrice de Ritter	إكسفولييتين	حديث الولادة	غسل بالماء المعقم، محاليل مطهرة بنيسيللين M
لقوباء الفقاعية	إكسفولييتين	رضع	انظر سابقا
الحمى القرمزية	إكسفولييتين	كل الأعمار	بنيسيللين M
مكورات عنقودية	أو TSST ₍₁₎		أو بريسيتناميسين
تتاثر لآلئ العائد للمكورات العنقودية	إكسفولييتين	الرضع ونقصي المناعة	غسل بالماء المعقم، محاليل، بنيسيللين M
صدمة سمية عائدة للمكورات العنقودية	TSST ₍₁₎	كل الأعمار	بنيسيللين A + أميلوزيد عالية مشددة

14. إنتانات الأجزاء الرخوة

كل تشقق جلدي أو مخاطي يعرض لحدوث إنتان للأجزاء الرخوة والذي يمكن أن يتطور إلى نخر (التهاب الجلد واللحمة الجراثومي النخري)، إذا أصاب السفاق فهو يعطي التهاب اللفافة Fasciite وفي حالة إصابة العضلات يعطي التهاب العضلات. هذه الالتهابات تعرض لخطر الوفاة. من العوامل المؤهبة نذكر السكري، التهاب عائد للـ VIH، مرض دموي، سرطان، آفة قلبية (ركودة وريدية) أو رئوية، معالجة متأخرة بالصادات الحيوية.

1. الإنتانات الشعاعية

1. التشخيص سريري (جدول 1): الفحوص الشعاعية يجب أن تحقق بشكل إسعافي وذلك لتقويم الانعكاسات العامة للالتهاب، وللتحضير للتدخل الجراحي. إن وجود هواء على الصورة الشعاعية للمنطقة المصابة يشير إلى وجود جراثيم لاهوائية. التصوير الطبقي المحوري أو المرنان المغناطيسي - وذلك برؤيتهما لامتداد الآفة - يسمحان بتوجيه الجراح، ولكن يجب ألا يؤخرا بدء المعالجة.

2. التشخيص الجراثومي يستند على:

- زراعات الدم، تكون إيجابية في 20% من الحالات.
- أخذ العينات الموضعية من الجروح المجاورة، ومن الآفات النخرية المتوضعة ضمن التهاب الجلد واللحمة الجراثومي النخري (بواسطة المسح للآفات المفتوحة أو بواسطة البزل بالإبرة للفقاعات وذلك بحثاً عن اللاهوائيات).

كما أنه يجب أخذ خزعة أو عينات خلال العمل الجراحي أو بعده.

2. المعالجة

المعالجة الإسعافية تفرض نقل المريض إلى المشفى وذلك من أجل تقويم انعكاسات الإنتان وتحضير المريض من أجل المداخلة الجراحية الضرورية.

1. المعالجة الجراحية:

يجب أن تكون باكراً قدر الإمكان حال تصحيح النقص في السوائل: استئصال الزوائد الآفية، نزع دقيق لكل النسيج ذات المظهر النخري، مما يؤدي أحياناً إلى فقدان كمي كبير عضلي عصبي وجدي، قطع طرف يكون أحياناً ضرورياً أمام وجود نخر شامل لكل الحزم العضلية.

2. المعالجة بالصادات الحيوية:

يجب إعطاؤها في البداية عن طريق الحقن، من دون انتظار نتائج الفحوص الجرثومية الخلوية. هدف هذه المعالجة هو الحد من انتشار الإنتان. ويجب ألا يؤخر في أي حال من الأحوال التداخل الجراحي.

في حال التهاب الحزم للنخري، المكورات العقدية هي الجرثوم المسيطر، لذلك المعالجة المختارة في البدء هي مرافقة بنيسيلين G (20 - 30 مليون وحدة عالمية/يوم عند البالغ) + كلينداميسين أو ريفامبيسين. في حالة التحسس غليكوبيبتيد (فانكوميسين 30 مغ/كغ/يوم. أو تيكوبلانتين 6 مغ/كغ/12 ساعة من أجل الحقن الثلاثة الأولى ومن ثم مرة واحدة/يوم)، أو لينوزوليد في حالة استحالة استعمال الغليكوبيبتيد، مرفقاً بالميترونيدازول 1.5 غ/يوم.

في حالة التهاب الجلد واللحمة الجرثومي النخري للبطن والعجان والعانة، فإن المعالجة بالصادات الحيوية تشمل الأوريدونيسيلين + أمينوزيد + ميترونيدازول أو معالجة وحيدة بالبيرياسيلين - تازوباكتام (12 غ/يوم)، أو إيميبينيم (2 غ/يوم) أو مرافقة الكلينداميسين مع الأمينوزيد.

في حالة التهاب العضلات أو بالأحرى (التهاب العضلات القححي)، فإنه ينصح بإعطاء بنيسيلين M + أمينوزيد أو فلوروكينولون وذلك بانتظار عزل الجرثوم.

في حالة الغانغرينا الغازية الآتية من إنتان في العجان أو إنتان هضمي، يعطى الإيمبينيم أو البيبيراسيلين - تازوباكتام. في الحالات الأخرى يعطى البنيسيللين G بجرعات عالية (20 - 30 مليون وحدة/يوم) مرافقاً بالميترونيدازول، أو الأموكسيسيللين - حمض الكلافولينيك، أو الكلينداميسين.

جدول 1 - الخصائص المختلفة

للتهاب الجلد والحممة الجرثومي النخري

وللتهاب اللقافة النخري وللتهاب العضلي

الخصائص	التهاب الجلد والحممة الجرثومي النخري العائد للمكورات العقدية أو التهاب اللقافة النخري	الموتات الغازي أو النخر العضلي العائد للكلوستريديام
الحضانة • الألم	1 - 4 أيام • +++	بضع ساعات • +++
مظهر الجلد	ونمة، احمرار، نخر، فقاعات	ونمة، جلد ذو لون أسود، بارد فقاعات، نخر
رائحة • وجود غاز	0 • 0	مثيرة للغثيان • +
الرشح	مضلي مدمى	مضلي مدمى
الحالة العامة	إصابة +++	إصابة +++
النسج المصابة	اللقافة، الجلد	عضلات، جلد، لقافة
الجراثيم	مكورات عقدية مقيحة 75%، مكورات عنقودية لاهوائيات	كلوستريديام بيرفرينجيس سيبتيكوم، أديماتيس
صادات حيوية 4	[إنيسيللين G + كلينداميسين] G 1 + ريفامبيسين]	[إنيسيللين G + ميترونيدازول] أو [أموكسيسيللين - أسيد كلافولينيك أو كلينداميسين]
طبيعة المداخلة الجراحية	خلع الزوائد، استئصال النسج المنموتة، تفجير	استئصال النسيج المنموت، معالجة بالـ O ₂ ↑ الضغط
الوفيات	30% 15 - 30%	30 - 15%
	التهاب الجلد والحممة الجرثومي للبطن والعجان	التهاب العضل
الحضانة • الألم	3 - 14 يوما • +++	1 - 3 أسابيع • تدريجي +++
مظهر الجلد	ونمة، احمرار، تقرحات ومن ثم صفائح نخرية	ونمة، احمرار، تقرحات ومن ثم صفائح نخرية
رائحة • وجود غاز	مثيرة للغثيان • 25% من الحالات	مثيرة للغثيان • 0 • 0
الرشح	قيحي	قيحي
الحالة العامة	إصابة +++	إصابة ++ متأخرة
النسج المصابة	الجلد، اللقافة، العضلات	العضلات

الجرائم	مختلطة لاهوائية وهوائية:	مكورات عقدية مذهبة، إيشيريشياكولي، مكورات عقدية
صادرات حيوية 4	مكورات عقدية، بيبتر، باكتيروبيد، عصيات غرام +، مكورات عقدية	بنيسيلين M + [أمينوزيد أو فلووروكينولون]
طبيعة العمل الجراحي	[أوريدوبيني + ميترونيدازول، أمينوزيد] تكيف بعد ذلك، أو بيبيراسيلين - تازوباكتام أو إيميبينيم	استئصال النسيج المتخرق، تفجير
الوفيات	خلع الزوائد التخريعية بصورة واسعة. نزع النسيج المنتنة، حتى أنه من الممكن اللجوء إلى البتر 50% <	ضعيفة

3. المعالجة بالأوكسجين ذو الضغط المرتفع:

تنفع لمعالجة التمثوت الغازي (الغانغرينا الغازية). ويجب ألا تؤخر
الجراحة في أي حال من الأحوال.

4. المعالجة المضادة للتخثر:

منصوح بها عادة.

5. المعالجة العرضية:

من المهم إعطاء السوائل والوقاية من التجفاف. تأمين حريرات كافية.
هذا وإن إعادة التأهيل العضلي والمفصلي مهم جداً لاستعادة وظيفة العضو
المصاب فيما بعد.

6. الوقاية الروتينية المضادة للكرزاز:

أنظر فصل 16.

15. أمراض الغدد اللمفاوية الإنتانية

تتظاهر سريرياً بشكلين:

- التهاب الغدد الموضع، سواء كان وحيد الغدة أو متعدد الغدد، وهو يتلو غالباً بؤرة انتانية في نفس المنطقة.
- التهاب الغدد اللمفاوية المنتشر، التالي لانتشار عام للعامل الممرض، الذي هو عبارة عن فيروس أو طفيلي في أغلب الحالات، والذي خصائصه المحبة للغدد اللمفاوية (فعل مباشر) أو الخصائص المحرّضة للمناعة (فعل غير مباشر) تؤدي إلى تضخم غددي معمّم.

1. التهاب الغدد اللمفاوية الموضعي (وحيد الغدة أو متعدد)

1. معرفة الخصائص الإنتانية للمرض الغدي اللمفاوي:

مرض الغدة اللمفاوي يكون إما انتاني أو ورمي. الحرارة، العلامات الالتهابية، التهاب ما حول الغدة، الألم وغالباً التقيح، كلها تفرق التهاب الغدة الإنتاني عن مرض الغدة اللمفاوية الورمي حيث تكون الغدة اللمفاوية هنا باردة وخالية من الأعراض. في بعض الأحيان البزل أو أخذ الخزعة يكونان الطريقة الوحيدة للتفريق بين الاثنين.

2. معرفة العامل المسبب لإنتان الغدة اللمفاوية الموضع (جدول 1):

كيفية حدوث الالتهاب (ظروفه): باب الدخول (جرح، عقصة، عضه، خمش، ممارسة جنسية، تماس مع حيوان، لقاح الـ B.C.G) ومنطقة الإصابة تشكلان عنصراً التشخيص الأكثر أهمية. الفحوص البيولوجية الدموية أهميتها متوسطة، التفاعلات السلينية (Tuberculinique) تفسيرها يمكن أن يكون صعباً. على العكس من ذلك فإن بعض الفحوص المصلية (سيفيليس، VIH، توكسوبلاسما، كلاميديا، بارتونيللا) يمكن أن تكون مفيدة. عزل العامل الممرض

بواسطة زرع الدم، أو أخذ العينات من منطقة باب الدخول يكون غالباً مخيباً للآمال. في حال غياب التشخيص السريري أو المخبري، فإن الخزعة واستئصال الغدة الجراحي ضروريان (تحاليل خلوية نسيجية أو جرثومية). الجدول 1 يظهر الخصائص الأساسية للمسببات الأكثر مصادفة حسب التوضع.

3. معالجة انتان الغدة اللمفاوية الموضع (جدول 2):

عزل الجرثوم المسبب ومعرفة حساسيته يوجهان المعالجة بالصادات الحيوية. هذه الأخيرة في حال كونها احتمالية فإنه بالإمكان توجيهها حسب معطيات معينة.

الصاد الحيوي المختار يجب أن يمتلك قدرة جيدة على الانتشار النسيجي والخلوي (كثرة وجود الجراثيم داخل الخلوية). تدوم المعالجة 15 يوماً على الأقل. فشل هذه المعالجة والتي البزل يكون مفيداً عندها. يمكن أن يتطلب استئصلاً جراحياً للغدة المصابة (السل، مرض خمشة القطعة، انتان الغدة اللمفاوية العائد لجراثيم عادية). هذا وأنه لا يوجد أي استطباب لوصف مصادات التهاب غير كورتيكوستيرويدية.

جدول 1 - الأسباب الأساسية لانتان الغدد اللمفاوية الموضع (حسب مكان توضع)

مكان التوضع	الحصى	التشخيص	العامل المسبب	باب الدخول
كل الأماكن	+	التهاب غدة لمفاوية مقبّح	مكورات عقدية	للوزتان، الأسنان
	+		مكورات عنقودية	الجلد
			كورين باككتيريا	
رقبية	±	التهاب غدة سلي	عصية السل	غير مرئي أو انتان أولي رئوي
	-	ميكو باككتيريا غير نموذجية	ميكو. كانساسسي	تشقق جلدي
			ميكو. سكروفلوسيوم	
	-	اكتينوميكوز	اكتينو إسرائيليلي	الأسنان
	++	انتان أولي حُلّاي	HSV1	الفم
	-	سيفيليس أولي	تريبونما بالليدوم	للوزتان

مرض القمل المصيب للرأس	قمل كابيتيس	جلد شعر الرأس	-
التهاب عائد للـ BCG	BCG	طعم في العضلة الدالية	-
مرض خمشة القطة	B. هينسيلا	الطرف العلوي	±
	A. فيليس	الوجه، الملتحمة	
مرض تولاريميا	F. تولاريميس	اليدين	±
مرض الباستوريلا	باستوريللا مولتوسيدا	اليدين ++	+
مرض حمرة الخنزير	E. روزوباتيا	اليدين ++	+
مرض سودوكو	سودوكو. مينوس	اليدين	±
هافيريلليوز	هافيري متعدد الأشكال	الطرف العلوي	±
انتان أولي حلاي	HSV ₂	تناسلي	+
مرض خمشة القطة	B. هينسيلا	الطرف السفلي	±
	A. فيليس		
سيفيليس أولي	تريونما الشاحبة	تناسلي	-
ورم حبيبي لمفاوي زهري	كلوستريديام	الشرج	-
	تراكوماتيس		
قرحة رخوة Chancre mou	هيموفيلوس دورسي	تناسلي	-

جدول 2 - تشخيص ومعالجة التهابات الغدد اللمفاوية الموضوعة

فيجي	جرثومي	بنيسيلين M أو سيفالوسبورين جيل I
السل	جرثومي	إيزونيازيد + ريفاميسين + بيرازيناميد ± إيثامبوتول
BCG	جرثومي	إيزونيازيد
مرض خمشة القطة	جرثومي، PCR	خيار ما بين مأكروليد، أو سيكلين أو فلوروكوينولون أو ريفاميسين
سيفيليس أولي	جرثومي مصلي	بنيسيلين G (إيكستنسيلين)، سيكلين أو مأكروليد، إذا كان هناك مضاد استطباب للبنيسيلين
ورم حبيبي لمفاوي زهري		سيكلين أو مأكروليد أو فلوروكوينولون
الفرح للرخو	جرثومي PCR	كوتريموكسازول (أو سيكلين)
تولاريميا	مصلي	سيكلين (أو أمينوزيد)، فلوروكوينولون
باستوريللا	جرثومي	أموكسيسيلين أو سيكلين أو فلوروكوينولون
حمرة الخنزير	جرثومي	بنيسيلين G أو أموكسيسيلين أو سيكلين أو مأكروليد
أكتينوميكوز	جرثومي، نسجي	بنيسيلين G أو أموكسيسيلين أو سيكلين طويل الأمد
سودوكو	جرثومي	بنيسيلين G أو أموكسيسيلين

2. التهاب الغدد اللمفاوية المتعددة

إنها الأكثر مصادفة، وتتضمن بدرجات مختلفة، التهاب كل الغدد السطحية؛ التهاب الغدد العميقة يكون أكثر ندرة. هناك ثلاثة أسباب لالتهاب الغدد المتعددة: انتاني، ورمي، أو مناعي التهابي.

1. التشخيص:

- القصة السريرية، العمر، احتمال عدوى، تماس مع حيوان، أخذ أدوية سابق للإصابة، إقامة في الخارج.
- إصابة مرافقة للجلد أو المخاطية، وجود ضخامة طحال، عقد لمفاوية مصابة عميقة، تدهور في الحالة العامة، تناذر انتاني (حمى)، علامات أخرى مرافقة.
- فحوص مخبرية: سرعة التثقل، تعداد وصيغة، فحوص مصلية.
- صورة صدر شعاعية، إيكو للبطن، تصوير طبقي محوري للبطن أو للصدر أو للالتنين معاً.
- بزل وخزعة أو استئصال غدي بهدف عزل الجراثيم وتحقيق فحوص جلدية نسيجية.

2. يجب نفي:

- الأسباب الورمية (أمراض الدم، لمفوما...) حجم الغدد اللمفاوية يكون أكبر في هذه الحالة، وهو لا يتراجع مع الزمن بل قد يزداد كبيراً بشكل تدريجي. تترافق في بعض الأحيان مع توضعات عميقة، فحوص الدم وارتفاع الـ LDH قد توجه نحو التشخيص.
- الأمراض الالتهابية والحالات المناعية - التحسسية (ساركويد، المرض الذئبي، مرض ستيل، مرض كاوازاكي، تحسس دوائي وأمراض جهازية، مرض ويل (Wipple...)). القصة السريرية العلامات المرافقة (مفصلية، جلدية، هضمية، كلوية...) تشكل عناصر هامة جداً لتوجيه التشخيص.

3. تشخيص التهاب الغدد اللمفاوية المتعددة الإنتاني:

التفاعلات المصلية هامة جداً من أجل وضع التشخيص (جدول 3))
 VIH - توكسوبلاسموز، الوردية الوافدة، فيروس إيبشتاين بار، سفيليس،
 بارونثيروس (B₁₉).

جدول 3 - الأسباب الرئيسية والخطوات التشخيصية
 لالتهاب الغدد اللمفاوية المتعددة الإنتاني

السبب	حمى	طحال	طفح	مخاطية	فحص الدم	التشخيص
الجرثومي						
الوردية الوافدة أدينوفيروس بارونثيروس B ₁₉ وفيروسات أخرى مسببة للطفح	+	±	+	±	نقص الكريات البيض ± زيادة الخلايا البلاسمية	فحوص مصلية
حمى وحيدات النوى الإنتاني	+	+	±	++	فرط الكريات البيض ولا سيما وحيدة النوى	اختبارات VCA، MNI، IgM
حمى الانتحال الخلوي العرطل	+	±	±	±	نقص الكريات البيض لا سيما الوحيدة النواة	IgM فيروس حمى مضخمة الخلايا
الإنتان بواسطة فيروس VIH، تتأخر اعتلال الخلايا اللمفاوية	-	-	-	-	طبيعي أو نقص الخلايا اللمفاوية	فحوص مصلية
السفيليس الثانوي	±	±	+	±	نقص الكريات البيض ولا سيما وحيدة النواة	فحوص مصلية
البروسيلا	+	+	-	-	نقص الكريات البيض	زرع الدم، فحوص مصلية
توكسوبلاسموز	±	±	±	-	نقص الكريات البيض لا سيما وحيدة النوى	فحوص مصلية
الليشماتيا الحشوية	++	++	-	-	نقص الكريات العام	فحص النقي، فحوص مصلية

لطاخة دموية، فحص النقي، فحوص مصلية	فقر الدم، تعدد اللمفاويات والخلايا البلازمية	-	±	+	+	الثرينوما الأفريقية
فحص جرثومي، تشريحي مرضي	طبيعي	-	-	+	+	ميكروباكتيريا

4. المعالجة:

الإنتانات الفيروسية، باستثناء الإنتان العائد إلى الـ VIH، لا تتطلب أية معالجة خاصة. السيفيليس الثانوي يعالج بالبنيسيلين (إيكستسيلين أو بنيسيلين نصف متأخر)، أو في حالة التحسس على البنيتالاكتامين، بواسطة السيكلين أو الإيريتروميسين أو (ماكروليد آخر) (أنظر الفصل 11 - الأمراض المنقولة عن طريق الجنس).

النوكسوبولاسموز المكتسب لا يعالج إلا في حالة وجود علامات خطيرة أو عند المرأة الحامل. الليشمانيا الحشوية، التريبانوزوما الأفريقية تتطلب كل واحدة معالجة خاصة (أنظر فصل "43" مضادات الطفيليات).

16. الإنتانات المنتقلة بواسطة التلقيح الجرثومي

تعود عادة إما إلى جروح مسببة بواسطة أدوات أو نباتات، أو إلى عضات أو خمشات حيوانات، أو إلى عضات أو عقصات مفصليات الأرجل. من الناحية العملية هذه الإنتانات تتلو دائماً جروحاً جلية ويجب دائماً التفكير بالوقاية من الكزاز في حالة الإصابة بها، والوقاية من الكلب في حالة اعتداء من قبل حيوان.

1. الجروح الناجمة عن آلة، عضة أو خمشة حيوان، الفمعة العلاجية

1. العناية الموضعية والعينات التي يجب أخذها:

- في كل الحالات يجب الغسل، والتنظيف بالمصل الملحي، ومن ثم التعقيم بواسطة مطهر: أمونيوم رباعي (ستيرلان)، أو مشتقات يودية (بيتادين) أو كلورهيكزيدين (سيبتيل، هيبيديل).
- استئصال إلزامي لكل جسم أجنبي.
- إذا كان الجرح عميقاً ومتعرجاً وكثير الحفر: يجب القيام باستقصاء جراحي للبحث عن أقات عضلية - وترية، عصبية وعائية أو مفصلية.
- في حالة نخر نسيجي: استئصال النسيج المتخررة، غسل بواسطة مصل ملحي، يجب عدم إجراء خياطة فورية (لأنها تؤهب للإصابة بالجراثيم الغير هوائية).
- في حال حصول الإنتان: يجب أخذ عينات قبل إجراء أي تطهير أو تنظيف.
- في حال وجود علامات انتشار الإنتان موضعياً (إصابة العقد اللمفاوية) أو في كل الجسم: يجب إجراء زرع الدم.

2. المعالجة بالصادات الحيوية:

المعالجة بالصادات الحيوية عن الطريق العام منذ البداية غير متفق عليها في حالة الجروح السطحية القليلة الالتهاب والغير مترافقة مع تخريب نسيجي هام. هذه المعالجة يجب أن تكون باكراً (خلال الـ 24 ساعة الأولى). في

الحالات الأخرى أو في حالة وجود انتان، فإن هذه المعالجة مستطبة وتكون موجهة حسب السبب (جدول 1).

جدول 1 - احتمال الإصابة الإنتانية حسب الجروح المسببة

بواسطة أدوات، عضات أو خمشات حيوانية

وخطّة معالجة الإنتان في حال حصوله

جرح أو عضه	الجرثوم المسبب، المرض	خطّة العلاج
آلة	مكورات عنقودية	سيفالوسبورون جيل I أو بنيسيللين M
(معدنية، خشبية، إلخ)	مكورات عقدية مقبحة	أو أمينوبنيسيللين + مثبطات
في حالة تلوث	لاهوائيات (كلوستريديام سيبيا)	البيتالالاكتامين أو بريستيناميسين
تللوري	موات غازي	أمينوبنيسيللين + مثبطات بيتالالاكتامين أو كلينداميسين
وخز نباتي	داء الباستوبلا	أموكسيسيللين أو دوكسيسيللين أو فلوروكينولون
	اعتلال لمفاوي شبكي تلقحي	دوكسيسيللين أو ماكروليد أو فلوروكينولون مضاد فطري
حروق*	(باستوبلا هينسيلا) فطور	بنيسيللين G أو أموكسيسيللين أو بريستيناميسين
(قليلة الامتداد)	(سبوروتريكوز ميسيتوم)	أمينوبنيسيللين + مثبطات البيتالالاكتامين
عضة بشرية	مكورات عقدية مقبحة (حمرة)	أو بريستيناميسين
	لاهوائيات	مكورات عقدية، مكورات عنقودية
	فيروس التهاب الكبد VII, C, B	أموكسيسيللين أو دوكسيسيللين أو فلوروكينولون
كلب أو قطة*	داء الباستوبلا (مدة >24 ساعة)	أمينوبنيسيللين + مثبطات بيتالالاكتامين أو كلينداميسين
	مكورات غرام + لاهوائيات	دوكسيسيللين أو ماكروليد أو ريفاميسين أو فلوروكينولون
	(مدة >24 ساعة)	دواء الكلب (أنظر جدول 3)
	اعتلال لمفاوي شبكي سليم تلقحي	بنيسيللين G أو أموكسيسيللين
	(مدة 7 - 60 يوما)	أو ماكروليد
	داء الكلب (أنظر جدول 3)	فلوروكينولون (تيامفينيكول إذا كانت الإصابة >8 أعوام) أو أمينوزيد
جرد*	هافريلوز، سودوكو Sodoku (آسيا)	
	داء الليبتوسبير	
عظم خنزير أو	حمرة الخنزير	بنيسيللين G أو أموكسيسيللين أو سيكلين
حسكة سمكة		أو ماكروليد
أرنب	داء التولاريميات	فلوروكينولون (تيامفينيكول إذا كانت الإصابة >8 أعوام) أو أمينوزيد

* وقاية من الكزاز (كلوستريديام تيتاني)

الفصل 16: الإنتانات المنقولة بواسطة التلقيح الجرثومي 123

جدول 2 - الدليل للوقاية من الكزاز

بعد الإصابة بجرح

شكل الجرح	مريض غير ممنوع أو لقاح غير كامل	مريض ممنوع بشكل كامل، المدة منذ آخر تذكر لللقاح 5 - 10 سنوات	10 سنوات
صغير، نظيف	البدء أو إتمام اللقاح اللقاح: أناتوكسين	عدم إعطاء حقنة	Anatoxine tétanique: 0.5 (لقاح الكزاز)
كبير، نظيف أو ممكن أن يسبب الكزاز	في الذراع الأول غلوبولين مناعي كزازي إنساني: 250 وحدة عالمية في الذراع الآخر: لقاح الكزاز 0.5 مل*	طعم الكزاز: 0.5 مل	في الذراع الأول: غلوبولين مناعي كزازي إنساني: 250 وحدة عالمية في الذراع الآخر: لقاح الكزاز 0.5 مل*
مولد للكزاز، تنظيف ونزع للأنسجة الممتلئة متأخر أو غير كامل	في الذراع الأول: غلوبولين مناعي كزازي إنساني: 500 وحدة عالمية في الذراع الآخر: لقاح الكزاز 0.5 مل*	لقاح الكزاز: 0.5 مل صادات حيوية	في الذراع الأول: غلوبولين مناعي كزازي إنساني: 500 وحدة عالمية في الذراع الآخر: لقاح الكزاز 0.5 مل* صادات حيوية

جدول 3 - الوقاية من الكلب

هذه الوقاية تتعلق بأصل الحيوان (بري أو منزلي)، أكثر منها بمكان العضة. للمركز المضاد للكلب هو الوحيد الذي يمكنه وصف المعالجة باللقاح أو بالمصل اللقاحي (في حالة عضه كثيرة الخطورة).
ظروف الحادث

للحيوان	للمصاب
اختفاء الحيوان	مصل مضاد للكلب: معالجة مضادة للكلب. من الواجب إكمالها حتى النهاية
حيوان موجود	مصل ضد الكلب: معالجة مضادة للكلب يجب إيقافها في حالة سلبية التحاليل
● ميت	نقطة بواسطة الجهات المسؤولة البيطرية المختصة، الدماغ يجب تحليله بواسطة مخبر مختارة

• حي ولكن غير مشكوك بإصابته	يوضع تحت مراقبة بيطرية	مصل مضاد للكلب: الانتظار، قرار
• حي مشكوك به	فحص يوم 0، 7، 14	المعالجة يؤخذ حسب النتائج
• حي مشكوك به	يوضع تحت مراقبة بيطرية	مصل مضاد للكلب: معالجة مضادة
	فحص يوم 0، 7، 14	للكلب فوراً (توقف إذا كانت المراقبة الأولية تنقل من الشكوك الأولية)

من هو الحيوان الذي يجب الشك به: حيوان مقيم في منطقة موبوءة بالأنزويوت الكلبية، حيوان بري، غير مطعم، هجوم عفوي أو تصرفات غير طبيعية وعلامات واضحة أو لا لمرض عند الحيوان.

* المعالجة المضادة للكلب = طريقتين:

منظمة الصحة العالمية والطريقة تسمى ESSEN: حقنة يوم 0، 3، 7، 14، 30، 90،
أو طريقة تسمى زغرب Zagreb قصيرة 2 - 1 - 1: حقنتين يوم 0، حقنة يوم 7 و 21
في حالة كون العضة شديدة الخطورة يجب مراقبة المعالجة السابقة بالمصل المضاد للكلب باكراً (إيموغام للكلب Imogam Rage، 20 وحدة عالمية/كغ)

3. الإنتانات المنتقلة إلى الحيوانات من مصليات الإنسان

من بين هذه الأمراض ذات التوزيع الجغرافي، نصادف في فرنسا الحمى المحببة المتوسطية *La fièvre boutonneuse méditerranéenne*، مرض لايم *Lyme*، وبشكل أكثر ندرة التهاب السحايا والدماع العائد إلى القراد الأوروبي، والبابيزيوز *Babésiose*، هذه الإنتانات تصادف غالباً في الربيع والصيف.

المعالجة الوقائية بعد عضه القراد غير مستطبة.

1. الحمى المحببة المتوسطية:

تسببها الريكتسيا كونوري، والمناطق الموبوءة بها هي المناطق الواقعة على حافة البحر الأبيض المتوسط وتمتد حتى الأوفيرن *Auvergne*. تتظاهر بحمى، صداع، وهن، طفح يبدأ بالجذع. هذا ومن الشائع وجود ندبة العقصة، ارتفاع في الترانس أميناز. التشخيص يعتمد على الفحوص المصلية (تفاعل مناعي ومضائي غير مباشر). المعالجة تكون بواسطة الدوكسيسيكليين (200 مغ/يوم × 5 أيام)، سيبروفلوكساسين (5 أيام) أو جوزاسين (أطفال، حوامل: 7 أيام) جدول 4.

2. مرض لايم Lyme:

مسببه سبيروشيت، بوريلىا بورغدوفيري، يمكن أن يصاب بها في كل نواحي فرنسا ما عدا - ربما - منطقة البحر المتوسط. يتطور هذا المرض في 3 مراحل. المرحلة الأولى تتميز بالاحمرار المزمن المتنقل والذي يبدأ بعد دخول المسبب بـ 3 - 30 يوماً: الآفة التي يكون مركزها نقطة العضة المسببة من القراد، تمتد تدريجياً مبتعدة عن المركز خلال عدة أسابيع ويمكن أن يصل قطرها إلى 20 - 60 سم. الاحمرار المتنقل يختفي في النهاية حتى مع غياب المعالجة. وفي هذه المرحلة يمكن الإصابة بالتظاهرات السريرية للمرحلة الثانية (عصبية، مفصلية، قلبية) أو الثالثة (جلدية، مفصلية، عصبية) هذه التظاهرات تشكل خطورة المرض. هذا وإن مدة المعالجة بالصادات الحيوية للاحمرار المتنقل (أموكسيسيلين 3 - 4 غ/يوم أو دوكسيسيلين 200 مغ/يوم) هي 14 يوماً (جدول 1) وفترة المعالجة للمرحلة الثانية أو الثالثة هي 21 يوماً (أموكسيسيلين 6 - 8 غ/يوم أو سيفترياكسون 2 غ/يوم).

جدول 4 - الإصابات الإنتانية المحتمل انتقالها بعد عضه القراد

الانتان	المسبب	خطة المعالجة
مرض لايم	بوريلىا	الاحمرار المتنقل أموكسيسيلين المرحلة 2 - 3 أموكسيسيلين أو سيفترياكسون
الحمة المحببة المتوسطة	ريكتسياكونوري	دوكسيسيلين أو سيبروفلوكساسين أو ماكروليد
حمى Q	كوكسيللا بونيتي	دوكسيسيلين
التهاب السحايا والدماغ	قراد Borne Virus	وقائية طعم تيكوفاك (Ticovac)
العائد للقراد		
داء التولاريميا	فرانسيسيللا تولارينسين	فلوروكيولون، دوكسيسيلين
بابيزوز	بابيزيا	كانديدميسين داخل الوريد + كينين داخل الوريد

* تيكوفاك: طعم مكون من فيروس مُعْدم للفعالية. الاستطباب: تمنع إيجابي ضد التهاب الدماغ والسحايا العائد للقراد عند الأشخاص المعرضين للإصابة (الأشخاص المقيمين في معسكرات، أو الذين يقومون بنزهات طويلة في الأماكن الموبوءة، أو العاملين في هذه المناطق)، المناطق السكندنافية، ألمانيا، النمسا، سويسرا، شرق فرنسا، أوروبا الوسطى والشرقية، آسيا). الطعم يعطى للبالغ أو الطفل < 1 سنة: 3 حقن 0.5 مل داخل العضل، يوم 0، الشهر الأول، الثالث، التاسع، الاثني عشر ومن ثم كل 3 سنوات.

3. داء التولاريميا:

فرانسييسيللا تورلارينسيس يمكن أن تنتقل بواسطة عضه القراد. يجب التفكير بهذا التشخيص في حالة إصابة للعقد اللمفاوية وحيدة أو متعددة (خاصة مغبنية) وحيدة الجانب مترافقة بحرارة وتالية لعضه قراد. المعالجة تم بحثها سابقاً.

4. داء البابيزيوز:

البابيزيوز البشرية المصادفة في فرنسا تعود إلى البابيزيا ديفيرجنس، التي هي عبارة عن بروتوزوا ذات تكاثر داخل الخلايا الحمر، وهي تصيب الحيوانات المنزلية. هذا المرض يصيب فقط الأشخاص المستأصلي الطحال، ويتظاهر عندهم بانتان خطير (حرارة شديدة الارتفاع، فقر دم انحلاي، قصور كلوي). البابيزيوز المصادفة في أميركا الشمالية مسببها هي البابيزيا ميكروتي، وهي أقل شدة وتصيب كل الأشخاص سواء كانوا مثبطي المناعة أو لا.

17. الإنتانات العظمية المفصلية

الإنتانات العظمية المفصلية تشمل عدة حالات حادة (> شهر) أو مزمنة (< شهر): انتان العظم الرضي (بعد كسر مفتوح) أو بعد عمل جراحي، التهاب العظم والنقي ذو المنشأ الدموي، التهاب المفصل ذو المنشأ الدموي أو الرضي، التهاب الفقرات، انتان طعم عظمي مفصلي، انتان قدم المريض السكري، انتانات على وتد مثبت خارجياً.

1. الإنتانات العظمية المفصلية

الفحوص التصويرية يمكن أن تساعد على التشخيص (جدول 1)، ولكن التشخيص الأكيد لا يتم إلا بواسطة عزل الجرثوم المسبب (جدول 2). الجراثيم المسببة تختلف حسب العمر (جدول 3) وحسب طبيعة الإنتان (جدول 4).

جدول 1 - وسائل التشخيص الغير مباشرة

الصورة الشعاعية: انتان حاد أو مزمن
انتان حاد: غالباً صورة طبيعية، أو وذمة الأجزاء الرخوة.
انتان مزمن: فراغات عظمية، بقايا ترسبات (انتان عظم مزمن)، انحلال حول الطعم، نكسات مترصة، للتصاقات سمحاقية (التهاب مزمن لطعم أو استجدال (Ostéosynthèse)، انحلال عظم حول وتد مثبت
التصوير الومضاني بواسطة التكنيتيوم: انتان حاد أو مزمن، انتان طعم (يمكن القيام به اعتباراً من فترة < 6 - 12 شهراً بعد العمل الجراحي): فرط تثبيت مبكر (3 دقائق)، حساسية < 90% ولكن خصوصية قليلة.
تصوير ومضاني بمتعدلات لنوى المشعة (99m Tc-HMPAO أو تديوم - 111): يجب تحقيقها مرافقة للتصوير الومضاني بواسطة التكنيتيوم، أهمية تشخيصية لفرط التثبيت المتأخر (4 و 24 ساعة).
التصوير الطبقي المحوري: انتان حاد أو مزمن، مفيد للتوجيه عند القيام بعمل الخزعة أو الجراحة.
● إصابة نقوية أو إصابة الأجزاء الرخوة.
● بقايا.
● تشوشات متعددة في حالة الطعوم.
المرئان المقطبيسي: (لا يمكن القيام به في حال وجود أجسام أجنبية)، تشخيص مبكر (منذ الأسبوعين الأولين)
● انحلال العظم الحاد، انحلال في حالة التهاب الفقرات (للبحث عن التهاب الأم الجافية المرافق)، انتان قدم مريض السكري.
● نقص العلامات العائدة للتكنيتيوم 1، فرط العلامات العائدة للتكنيتيوم 2، بعد الغادولينيوم (تثبيت غير وصفي للغادولينيوم).

جدول 2 - وسائل التشخيص الجرثومية

زراع الدم: إلتان حاد مع تجرثم الدم	
بزل المفصل:	
● التهاب مفصل حاد على مفصل طبيعي: كريات بيض < 5 × 310/3م، خلايا معتدلة < 58 %، عزل الجرثوم < 90%.	
● التهاب مفصل حاد على طعم مفصلي: في حالة إيجابيتها تؤكد التشخيص في 60 - 100%، وفي حال كونها سلبية فإنها تنفي التشخيص في < 90% من الحالات.	
أخذ عينات من الناسور: بواسطة قنطرة داخل الناسور بعد تنظيف حواف فوهته: إذا عزلنا	
مكورات عنقودية مذهبية فإنه من الممكن أن تكون مسؤولة عن الإلتان إذا عزلت عدة مرات على	
عينات متتالية، وفي حال عزل عصية السل فإن مسؤوليتها عن الإلتان تكون أكيدة.	
البزل مع أخذ الخزعة (موجه بواسطة الأشعة السينية أو التصوير الطبقي المحوري) من أجل فحص	
تشريحي مرضي أو جرثومي: التهاب الفقرات، وفي بعض الحالات التهاب العظم لقدم مريض السكري.	
مداخلة جراحية من أجل أخذ عينات قبل العمل الجراحي: إلتان مزمن، بشكل خاص إلتان للعظم	
المزمن، إلتان على طعم عظمي - مفصلي، لتهاب عظم لرجل مريض السكري. من المهم أخذ عينات	
متعددة ومن أماكن مختلفة، مستعملين أدوات معقمة مختلفة. إذا كان الجرثوم منتم إلى الجراثيم الشائعة	
الجلدية فإن إيجابية 3 عينات ضرورية لاعتبار الجرثوم المعزول مسؤول عن الإلتان.	

جدول 3 - الجراثيم الأساسية المسؤولة عن التهاب العظم والمفصل وذلك حسب العمر، حالة المريض (وضعه الصحي) وفوهة الدخول

حديث الولادة	مكورات عنقودية مذهبية، مكورات عنقودية أجالكتيا، جراثيم محبة
طفل	مكورات عنقودية مذهبية، مكورات عنقودية مقبحة
مريض سكري، مريض مصاب بالتهاب الشرايين	مكورات عنقودية مذهبية، عصيات غرام سلبية، بسودوموناس
المدمن عن طريق الوريد	إيروجنوزا، لاهوائيات
	مكورات عنقودية مذهبية، بسودوموناس إيروجنوزا، عصيات غرام سلبية
دريبنوسيتوز	سالمونيللا سيبسيا، هيروفيلوس أنفلونزا
تماس مع حيوان، منتجات حلبية غير مغلية	بروسيللا سيبسيا، باستوريللا مولتوسيدا (عضة)
بعد العمل الجراحي بصورة مبكرة	مكورات عنقودية مذهبية، مكورات عنقودية، عصيات غرام سلبية، بسودوموناس إيروجنوزا
بعد العمل الجراحي بصورة متأخرة	مكورات عنقودية ذات تخثر سلبية، مكورات عنقودية، مكورات عنقودية، عصيات غرام θ، بسودوموناس إيروجنوزا
فوهة دخول تناسلية أو بولية	عصيات غرام سلبية، بسودوموناس إيروجنوزا
ارتشاح مفصلي	مكورات عنقودية مذهبية، مكورات عنقودية، عصيات غرام سلبية
قنطرة وريدية، كلية اصطناعية	مكورات عنقودية مذهبية، مكورات عنقودية ذات تخثر سلبية، عصيات غرام سلبية

جدول 4 - الجراثيم الممرضة الأساسية المسؤولة عن الإنتانات العظمية المفصلية

وذلك حسب مكان توضع الإنتان

التهاب المفصل الحاد	مكورات عقدية مذهبية، مكورات بنية (بالع >30 سنة)، مكورات عقدية سيبسيا، جراثيم معوية (<60 سنة)، باستريلا مولنوسيدا، كابنوسيتوفاجا كاتيمورسوس (بعد عضه)، بوريلى (مرض لايم)
التهاب العظم والنقي الحاد	مكورات عقدية ذهبية، مكورات عقدية مقيحة، هيوفيلوس انفلونزا (طفل <5 سنوات).
التهاب الفقرات الحاد	مكورات عقدية مذهبية، جراثيم معوية تضم معها الإشيريياكولي (مريض مسن ++ مكورات عقدية، مكورات معوية (التهاب شغاف القلب يرافقها غالباً)، سل، بروسيللا.
انتان فوق طعم	مكورات عقدية مذهبية، مكورات عقدية ذات تخثر سلبي، جراثيم غير هوائية، (بروبيونيكتيريوم سيبسيا)، بسودومonas أيروجينوزا، عصيات غرام سلبي أخرى
التهاب عظم والتهاب عظم ومفصل تال لرض	مكورات عقدية مقاومة للميثيسيلين، جراثيم معوية، بسودومonas
قدم مريض السكري	مكورات عقدية مذهبية، مكورات عقدية مقيحة، بسودومonas أيروجينوزا، جراثيم سيبسيا (ولاهوائيات)، مكورات عقدية ذات تخثر سلبي، مكورات معوية.
انتان الفقرات المزمن	دائماً يجب التفكير بالسل.
• إنتانات غالباً ناتجة عن عدة جراثيم.	

2. المصاعب بالأمراض الحيوية (جدول 5 حتى جدول 9)

الالتهابات الحادة غالباً ما تكون جرثومية وهي تتطلب معالجة إسعافية بالصادات الحيوية، وأحياناً تتطلب تثبيت العضو المصاب. معالجة الالتهابات المزمنة تكون دوائية وجراحية في الوقت ذاته. للمعالجة بالصادات الحيوية يجب أن تكون لفترة طويلة وتتطلب استعمال صادات ذات انتشار عظمي جيد (جدول 5 - 9).

عناصر الاختيار: اختبار التحسس الجرثومي للصاد الحيوي، الانتشار العظمي للصاد الحيوي، وجود أدوات (طعم، أدوات الاستجدال). للمعالجة بالصادات الحيوية لإنسان على وتد المثبت الخارجي غير ضرورية إلا إذا كان هناك التهاب عظم مرافق أو إذا كان الوند قريباً من مكان الكسر أو قريباً من مفصل.

معالجة احتمالية بالصادات الحيوية: ضرورية في الحالات التي يوجد فيها جراثيم دم (التهاب عظم ونقي، التهاب مفصل حاد، التهاب فقرات)، أو أمام خطورة الآفات الموضعية (الالتهاب الخلوي لقدم مريض السكري). هذه المعالجة يعاد تقويمها وذلك حسب نتائج الفحوص الجرثومية (زرع الدم، بزل، عينات مأخوذة خلال العمل الجراحي):

- التهاب العظم والنقي، التهاب المفصل، التهاب الفقرات: بنيسيلين مضاد للمكورات العنقودية + جنتاميسين.
- الالتهاب الخلوي لقدم مريض السكري: سيبروفلوكساسين + كلينداميسين، إيميبينيم، أو بيبيراسيللين - تازوبكتام + جنتاميسين.

طريق الإعطاء: داخل الوريد بشكل إجباري خلال الـ 2 - 4 أسابيع الأولى للمعالجة، متبوعة بمعالجة عن طريق الفم. في حال استعمال الفلوروكينولون، الريفاميسين، الكوتراييموكسازول أو حمض الفوسيديك يمكن أن نبدأ المعالجة مباشرة عن طريق الفم.

المدة:

- التهاب المفصل الحاد: 4 - 6 أسابيع.
- التهاب العظم والتهاب العظم والنقي الحاد: من 6 أسابيع إلى 3 أشهر.
- التهاب الفقرات: من 6 أسابيع إلى 3 أشهر (جراثيم مقيحة) أو من 9 - 12 شهراً (عصيات السل).
- طعم عظمي - مفصلي (لا يوجد قاعدة لإعطاء الصاد الحيوي هنا، ومدة المعالجة هنا تكون تابعة للاستراتيجية الجراحية المرافقة):
 - تنظير المفصل مع غسل (الطعم بقي في موضعه): 6 أسابيع إلى 3 أشهر.
 - تغيير الطعم خلال زمن واحد أو زمنين: من 6 أسابيع إلى 3 أشهر.
 - قطع الرأس والعنق 6 أسابيع.
 - طعم ترك في موضعه لأنه من غير الإمكان التداخل الجراحي عليه: عدة أشهر حتى لمدة غير محدودة في بعض الأحيان.
- قدم مريض السكري: أسبوعان (إصابة الأجزاء الرخوة) ≤ 6 أسابيع (إصابة عظمية).

يجب احترام بعض مضادات الاستطباب:

- الفلوروكوينولون مضاد استطباب له عند الأطفال، إلا في حالة ضرورة قصوى.
- من أجل تجنب توليد جراثيم مقاومة فإنه يجب عدم استعمال الريفامبيسين، الفوسفوسين، الكينولون وحمض الفوسيديك بشكل منفرد في حال الإنتان العائد للمكورات العنقودية.

جدول 5 - الاختراقية العظمية للصادات الحيوية

اختراقية عظمية ممتازة: فلوروكوينولون عن الطريق العام، لينكوساميد، ريفامبيسين، حمض الفوسيديك، فوسفوميسين، سيكلين، بريسيتناميسين
اختراقية عظمية متوسطة: بيتا لكتامين، غليكوبيبتيد، كوتريموكسازول، فينيكول
اختراقية عظمية ضعيفة: أمينوزيد، منبطات البيتا لكتاماز

جدول 6 - اختيار الصاد الحيوي: الإنتان عند حديث الولادة

المسبب	الخيار الأول (داخل الوريد)	الخيار الثاني (داخل الوريد)
مكورات عنقودية	بنيسيلين M + جنتاميسين	سيفوتاكسيم + فوسفوميسين
مذهبة		فانكوميسين + جنتاميسين
مكورات عقدية B	أموكسيسيللين + أمينوزيد	سيفوتاكسيم + أمينوزيد
جراثيم معوية	(سيفوتاكسيم أو سيفترياكسون) + أمينوزيد	إيميبينيم + أمينوزيد
بسودوموناس سيبيسا	سيفتازيديم + توبراميسين	إيميبينيم + توبراميسين

أ: خبرة قليلة الإثبات.

جدول 7 - اختيار الصاد الحيوي: الإنتان عند الرضيع والطفل

المسبب	الخيار الأول (داخل الوريد)	الخيار الثاني (داخل الوريد)	المتابعة عن طريق الفم
مكورات عنقودية	بنيسيللين M +	غليكوبيبتيد أو [سيفوتاكسيم	بنيسيللين M أو
مذهبة	أمينوزيد	+ فوسفوميسين]	بريسيتناميسين
مكورات عقدية A	أموكسيسيللين		أموكسيسيللين أو
			بريسيتناميسين
سالمونيلا سيبيسا	سيفترياكسون	حسب اختيار التحسس الجرثومي للصاد الحيوي	فلوروكوينولون
هيموفيلوس	سيفوتاكسيم أو		سيفالوسبورين جيل 2
أنفلونزا	سيفترياكسون		أو جيل 3

أ: خبرة قليلة الإثبات، لا يوجد سماح قانوني لاستعمال هذا الدواء من أجل هذا الاستطباب، استعمالها مقترح بسبب خطورة المرض في هذه الحالات.

جدول 8 - المعالجة بالصادات الحيوية
للإبتانات العظمية المفصلية عند البالغ
وذلك حسب الجرثوم المسبب

المسبب	المعالجة ذات الخيار الأول	معالجات بديلة
مكورات عقدية حساسة على الميتيسيلين	فلووروكينولون + ريفاميسين	● فلووروكينولون + حمض الفوسيديك ● حمض فوسيديك + ريفاميسين ● كلينداميسين + ريفاميسين ● [إنيسيلين M أو سيفازولين] + جنتاميسين*
مكورات عقدية مقاومة للميتيسيلين	● غليكوبيتيد + ريفاميسين أو حمض فوسيديك أو فوسفوميسين) ● ريفاميسين + حمض فوسيديك	● بريستيناميسين + ريفاميسين ● فوسفوميسين + (سيفوتاكسيم أو ريفاميسين أو حمض فوسيديك) ● بريستاميسين** + (ريفاميسين أو حمض الفوسيديك) ● غليكوبيتيد + أمينوزيد
مكورات معوية مكورات غرام ⊖ مكورات عقدية	● أموكسيسيلين + أمينوزيد ● أموكسيسيلين	● سيفالوسبورين جيل 3 ● بريستاميسين
عصيات غرام ⊖ ما عدا (بسودومonas أبروجينوزا)	فلووروكينولون ± سيفالوسبورين جيل 3	فلووروكينولون ± (فوسفوميسين أو إيميبينيم)
● بسودومonas أبروجينوزا	● سبيروفلوكساسين + سيفازيديم ● سيفازيديم + أميكاسين*	● سيفازيديم + فوسفوميسين ● إيميبينيم + فوسفوميسين ● سبيروفلوكساسين***
لاهوائيات	كلينداميسين	● إيميدازول ما عدا (بروبيونيبيكتيريوم) ● بريستاميسين
عصيات كوخ بروسيللا	أنظر فصل 24 (السل) ● سيكلين + ريفاميسين	● سيكلين + سترينوميسين

- * في المرحلة الأولى حيث يكون هناك انتان دم، أو لمدة أطول في حال وجود التهاب شغاف قلب مرافق.
** إذا كانت هناك استجابة جرثومية على الإبريتروميسين.
*** كمتابعة لمعالجة بديلة بصادين حبريين، وذلك لتجنب المقاومة الجرثومية.

جدول 9 - جرعة الصادات الحيوية لمعالجة الإبتاتات العظمية المفصلية

عدد مرات الإعطاء	الجرعة (خلال 24 ساعة)	الصاد الحيوي (طريق الإعطاء)
		بيتا لاكتامين (وريد)
6 - 4 جرعات	200 - 150 مغ/كغ	أموكسيسيللين، أو كلوكساسيللين، سيفالوسبورين جيل 1
3 جرعات	100 مغ/كغ	سيفوتاكسيم
1 جرعة	50 مغ/كغ	سيفترياكسون
3 - 2 جرعات	6 - 3 غ	سيفتازديم
4 - 2 جرعات	3 - 2 غ	ايمينيبيم
		غليكوبنتيد
حقن مستمر	30 مغ/كغ	فانكوميسين (وريد)
جرعة واحدة	12 مغ/كغ	تيكوبلانين (وريد أو عضل)
3 جرعات كل واحدة لمدة 4 ساعات	200 - 150 مغ/كغ	فوسفوميسين (وريد)
		فلووروكينولون
3 - 2 جرعات	600 مغ	أو فلوكساسين (فم أو وريد)
جرعتين	1500 مغ	سيبروفلوكساسين (فم)
3 جرعات	1200 مغ	سيبروفلوكساسين (وريد)
4 - 3 جرعات	2.4 غ	كلينداميسين (فم أو وريد)
جرعتين صباحاً قبل الأكل	20 مغ/كغ	ريفاميسين (فم أو وريد)
3 جرعات	1500 مغ	حمض الفوسيديك (فم أو وريد)
3 جرعات	3 غ	بريستيداميسين (فم)

1. تكيف الجرعة حتى الحصول على تركيز ما بين 30 - 40 مغ/ل
2. تكيف الجرعة في حالة الضرورة للحصول على عيار باق ما بين 20 - 30 مغ/ل

في حالة الإصابة الجرعية في التوتات

التهاب المفصل الحاد: بزل مفصلي متكرر خلال الأيام الأولى؛ غسل مفصلي منذ البداية في حالة الانصباب الغزير أو في حالة التهابات المفاصل المكتشفة بصورة متأخرة، أو غسل ثانوي بعد فشل البزل المتكرر؛ عدم تحريك المفصل خلال الأيام الأولى ومن ثم تحريكه بشكل سلبي وبعد ذلك الاستناد عليه بعد 3 أسابيع؛ استئصال الغشاء الزلالي (Synovectomy) أو

إيثاق المفصل في حال فشل المعالجة السابقة.

التهاب العظم المزمن: نزع الزوائد، نزع الأدوات الغريبة، تفريغ خراج، جراحة تغطية (قصاصات عظمية أو جلدية).

استئان على طعم أو على أدوات غريبة: تنظيف مفصلي وحول مفصلي، الطعم أو الأداة يمكن أن تترك في مكانها إذا كان الأمر يتعلق بانتان حديث، نزع أو عدم نزع الطعم أو الأداة إذا كان الأمر يتعلق بانتان مزمن.

التهاب العظم والنقي الحاد: تفريغ تجمع تحت سحائي في حالة وجوده.

التهاب الفقرات: عدم تحريك بواسطة مشد مع الوضع في حالة قائمة بصورة تدريجية اعتباراً من الأسبوع الثالث.

قدم مريض السكري: يجب طلب اختصاصي بجراحة الأوعية، طبيب عظمية وتجميل.

4. عناصر المراقبة

التحسن يلاحظ بمراقبة عناصر مختلفة، تقارن فيما بينها وتجمع فيما بينها أيضاً وذلك قبل الاستئان النهائي.

سريرياً: اختفاء الآلام، تطور العلامات الموضعية (ونمة، احمرار، ناسور)، اختفاء النز.

الفحوص البيولوجية: تطور المشعرات الالتهابية (سرعة التثقل، CRP).

شعاعياً: ظهور علامات عودة بناء العظم.

التصوير الومضائي: امتداد بؤرة فرط التثبيث، وذلك بعد مدة من إيقاف المعالجة (6 أشهر).

التصوير الطبقي المحوري والمرنان المغناطيسي المتكرر.

إذا كانت هذه العناصر ضرورية لإيقاف المعالجة، فإن غياب النكس وحده يسمح بتأكيد الشفاء.

18. انتانات الأذن والأنف والحنجرة

1. المضاعفات الثانوية الحادة

الأشكال التي تكون فيها اللوزتين محمرتين أو فيهما بقع احمرارية، هي الأكثر مصادفة، أغلبها يعود إلى انتان فيروسي (بما فيها الإنتان العائد إلى فيروس إيبشتاين - بار أحياناً). فقط الالتهابات العائدة إلى المكورات العقدية الحالة للدم من زمرة A يجب أن تعالج بالصادات الحيوية. هذه الجرثومة تكون مسؤولة عن الالتهاب في 10 - 25% من الحالات فقط عند البالغ و 30 - 40% من الحالات عند الطفل. الأسباب هي نفسها سواء كان الالتهاب أولي أو متكرر مما يتطلب المعالجة نفسها للثنتين. التشخيص يوجه بصورة جيدة بواسطة تحقيق اختبار تشخيصي سريع للمكورات العقدية الحالة للدم B من زمرة A.

1. المعالجة العرضية:

الحرارة وألم الحنجرة: باراسيتامول.

مضادات الالتهاب الغير ستيروئيدية والكورتيزونات: فائدتها لم تثبت.

2. المعالجة المضادة للإنتان:

1. الالتهابات أو الخناقات الاحمرارية:

أخذين بعين الاعتبار الحساسية الممتازة للاختبار التشخيصي السريع وندرة الحمة الرئوية الحادة في فرنسا، فإنه لا يوجد استطباب للمعالجة بالصادات الحيوية في حال كون هذا الاختبار سلبياً. ولكن عند وجود عوامل خطر لحدوث الحمى الرئوية الحادة (عمر ما بين 4 - 25 عاماً، سوابق شخصية للإصابة بالحمى الرئوية الحادة، عوامل بيئية، تكرار الإصابات بالخناقات العائدة للمكورات العقدية أو الإقامة في بلاد يوجد فيها إصابات شائعة بالحمى الرئوية الحادة)، فإنه في حال وجود اختبار سلبي يمكن اللجوء عندها إلى الزرع.

في حال كون الاختبار التشخيصي السريع إيجابياً، فإن المعالجة الفعالة بالصادات الحيوية الموجهة ضد المكورات العقدية A موصى بها (جدول 1)، مفضلين البييتالاكتامين.

جدول 1 - المعالجة بالصادات الحيوية ذات الخيار الأول للخناقات الحادة العائدة للمكورات العقدية: الجرعة وعدد مرات الإعطاء اليومية، مدة المعالجة بالأيام

الدواء	البالغ	الطفل	عدد مرات الإعطاء	المدة
بنيسيلين V (معالجة تاريخية مرجعية)	2 - 4 مليون وحدة عالمية	500000 - 1000000 وحدة عالمية/كغ	3 - 4	10 أيام
أموكسيسيلين	2 غ	50 مغ/كغ	2	6 أيام
سيفوروكسيم أكسيتيل	500 مغ	20 مغ/كغ	2	4 أيام
سيفوروكسيم بروكسيتيل	200 مغ	10 مغ/كغ	2	5 أيام
سيفوتيام هيكسيتيل	400 مغ	-	2	5 أيام

نظراً لوجود خطر توليد زمر جرثومية مقاومة (6 - 9%)، فإنه يجب الاحتفاظ بالماكروليد للاستعمال كخيار بالدرجة الثانية بعد البييتالاكتامين وذلك عند المرضى الذين يبدون تحسناً على البييتالاكتامين. هذه التوصيات أيضاً تكون نحو تفضيل الأدوية التي أثبتت فعاليتها لمعالجة قصيرة المدة (جدول 2).

جدول 2 - المعالجة البديلة (في حال تحسس المريض على البييتالاكتامين) للخناقات الحادة العائدة للمكورات العقدية: الجرعة، عدد مرات الإعطاء اليومية، مدة المعالجة بالأيام

الدواء	البالغ	الطفل	عدد مرات الإعطاء	المدة
أزيتروميسين	0.5 غ	20 مغ/كغ	1	3 أيام
كلاريثروميسين	0.5 غ	15 مغ/كغ	2	5 أيام
جوزاميسين	1 - 2 غ	50 مغ/كغ	2	5 أيام

* اعتباراً من عمر الـ 3 سنوات وحتى عمر الـ 25 عاماً.

إن مرافقة الأموكسيسيلين - حمض الكلافولينيك مع السيفيكسيم لم يعد مسموح بإعطائها لهذا الاستطباب. معالجة الحمى القرمزية هي نفسها تلك المطبقة على الخناق العائد للمكورات العقدية؛ وعودة قبول الطفل المصاب في المدرسة ممكن في حال حصوله على شهادة طبية تؤكد حصوله على معالجة مناسبة. معالجة وقائية بالبنيسيلين V أو بالماكروليد يجب أن

تقترح على الأشخاص الذين هم بتماس مع المريض وذلك لمدة 7 أيام.
استئصال اللوزات يقرّر حسب عدد مرات تكرار الالتهاب والاختلاطات؛
إعاقة للحياة المدرسية أو المهنية، إعاقة التنفس وذلك نتيجة سد عال للحنجرة
عند الطفل، تكرار الالتهاب بكثرة بالرغم من معالجة طبية جيدة.

2. الخناق الحويصلية:

فيروسية حصرأ (وهي تتضمن الخناق الحلاقي العائد لفيروس كوكساكي)
وهي لا تتطلب إلا معالجة عرضية. التهاب اللثة الحلاقي للإنثان الأولي في
أشكاله الأكثر حدة بشكل استطباً للمعالجة بمضادات الفيروس: أسيكوفير عن
طريق الفم (5 حبات عيار 200 مغ/يوم عند البالغ والطفل الذي عمره <
سنتين)، أو عن طريق الوريد (يجب وضع المريض في المشفى) لمدة 5 أيام
وذلك حسب شدة الأعراض.

3. الخناق ذو الغشاء الكاذب:

- داء وحيدات النوى الإنتاني هو السبب الوحيد في فرنسا. في حالة حصول
عسرة تنفس هامة أو اختلاطات دموية، فإن المعالجة الكورتيكوستيرويدية تكون
مستطبّة. فقط حالات الإنتان الإضافي (زمر مختلطة هوائية ولاهوائية)
تتطلب المعالجة المناسبة بالصادات الحيوية. يجب تجنب استعمال
الأمينوسيللين إذا كان ذلك ممكناً، وذلك لأنها تكون مسؤولة عن حصول
طفح سمّي جلدي في 70 - 95% من الحالات.
- الدفتيريا حصولها استثنائي في فرنسا. الشك بها (عند الإقامة في
بلاد منتشرة فيها هذا المرض) (أفريقيا، أوروبا الشرقية) يتطلب وضع
المريض في المشفى للتأكد من التشخيص، وإعطاء المعالجة المصلية (20000 - 40000 وحدة)
والمعالجة بالصادات الحيوية (بنيسيللين أو ماكروليد). الإعلان عن الإصابة هنا إجباري.

4. الخناق القرحية النخرية:

إنها تتطلب تحقيق فحوص مكملة: عينات من البلعوم، تعداد وصيغة، خناق
فانسان (وحيد الجانب مع رائحة ننتة) يعالج بالبنيسيللين V أو G (3 - 5 مليون

وحدة/يوم) أو ميترونيدازول (1.5 - 2 غ/يوم) لمدة 10 أيام. القرحة الزهرية المتوضعة على اللوزة تعالج بالبليزاثين بنيسيلين (2.4 مليون وحدة حقنة واحدة داخل العضل)، أو في حالة التحسس، يعطى الدوكسيسيكليين (100 مغ مرتين باليوم لمدة 15 يوماً). الحناقات المرافقة لأمراض الدم (والعائذة إلى جراثيم مختلطة) تتطلب معالجة مرافقة للأموكسيسيلين مع مثبطات البيتاالاكتاماز داخل الوريد.

2. التهاب الأنف والحنجرة

إنها الحقل الخاص للطفل الصغير، وهي دائماً فيروسية، على الأقل في مرحلتها الأولى. التهاب أذن احتقاني بسيط متميز باحتقان أحمر لغشاء الطبل يرافق غالباً التهاب الأنف والحنجرة. حالة سيلان الأنف المنعزلة لا تعود إطلاقاً إلى انتان جرثومي. التطور الطبيعي هو غالباً نحو الشفاء العفوي خلال 7 - 10 أيام. المعالجة عرضية. الحمى يجب أن تعالج بالطرق الفيزيائية (حمامات فاترة، تناول سوائل بكثرة...) ومضادات الحرارة (حمض الأسيتيل ساليسيليك: 15 مغ/كغ - 4 - 5 مرات باليوم، أو الباراسيتامول: 15 مغ/كغ 3 مرات/يوم). معالجة انسداد الأنف وسيلانه أساسية، ومن هنا تكمن أهمية غسل الفوهات بواسطة السيروم الفيزيولوجي وأهمية تعليم التمشيط أبكر ما يمكن. المعالجة بالصادات الحيوية غير مبررة إلا لمعالجة الاختلاطات المفترضة أنها جرثومية: التهاب الأذن الوسطى القيحي، التهاب الجيوب. هذه المعالجة غير ضرورية لتجنب الاختلاطات.

أهل الطفل الذي عنده عوامل خطر (التهاب أذن وسطى متكرر، وجود التهاب أذن مصلي، نقص مناعة) يجب أن يُنبهوا إلى ضرورة الاستشارة الطبية في حال وجود علامات تشير الشك بوجود اختلاطات جرثومية (حمى أكثر من 3 أيام، استمرار وجود الأعراض لمدة أكثر من 10 أيام، ضيق نفس، التهاب ملتحمة قيحي، وذمة الأجفان، اضطرابات هضمية، طفح جلدي). الوقاية تكون بواسطة تغيير بعض الشروط الحياتية للطفل، بتشجيع الإرضاع من الأم، عدم التدخين في العائلة، تغيير طرق الحضانة يجب التفكير به في حال فشل الطرق الوقائية الأخرى.

3. التهاب الأذن الوسطى الحاد

- غشاء طبل غير مرئي أو مرئي بشكل سيئ: في حالة وجود صعوبة في تنظيف الطرق السمعية فإن اللجوء إلى الأخصائي ضروري:
- بعد عمر السنتين، في حال غياب الأكم الأذني، فإن وضع تشخيص التهاب الأذن الوسطى الحاد قليل الاحتمال جداً.
- قبل عمر السنتين، رؤية غشاء الطبل من قبل الأخصائي ضروري في حال الأشكال العرضية.
- في 70 - 80% من الحالات الالتهاب يعود إلى وجود الهيموفيلوس أنفلونزا والمكورات العقدية الرئوية وحيدة أو مترافقة مع جراثيم أخرى. الميكوبلاكتيريا كاتارالس تكون السبب في أقل من 10% من الحالات عند الطفل هذا وإن شيوع المقاومة يفسر التوصيات للصادات الحيوية:
- الهيموفيلوس أنفلونزا تولد بيتالاكتاماز في 30 - 45% من الحالات.
- أكثر من 50 - 80% من المكورات الرئوية، وذلك حسب المنطقة الجغرافية هي ذات حساسية ناقصة للبنيسيلين. هذا النوع من المقاومة غير مرتبط بإفراز البيتالاكتامين، لذلك فإن استعمال صاد حيوي مثبط للبيتالاكتاماز غير مفيد.
- من أجل هذين الجرثومين، المقاومة تكون ضد الماكروليدات والكوتريموكسازول أيضاً.

1. المعالجة لالتهاب الأذن الوسطى الحاد:

الباراسيتامول عن الطريق العام هو مضاد الألم ومضاد الحرارة المرجعي. مضادات الالتهاب الغير ستيروئيدية والكورتيزونات لم تثبت فائدتها. الصادات الحيوية الأذنية الموضعية غير مفيدة ومضادة استطباب في حالة كون غشاء الطبل مفتوحاً. التهاب الأنف والحنجرة المرافق عادة لالتهاب الأذن الوسطى الحاد عند الطفل، يتطلب غسل أنفي بواسطة السيروم الفيزيولوجي. خزع غشاء الطبل مستطب في الحالات التالية:

- التهاب الأذن عند الرضيع ذو العمر >3 أشهر، وفي حالة التهاب الأذن المتكرر وذلك لأخذ عينة ومعرفة الجرثوم المسبب.
 - التهاب الأذن المؤلم جداً.
 - التهاب الأذن القيحي والغير متحسن بعد 4 أيام من المعالجة الاحتمالية.
2. المعالجة بالصادات الحيوية لالتهاب الأذن الوسطى الحاد:

1. الاستطابات

- معالجة بالصادات الحيوية موصى بها منذ البدء:
 - طفل عمره أقل من سنتين.
 - طفل عمره أكثر من سنتين مع أعراض قوية، حرارة مرتفعة، ألم أذني شديد.
- عدم البدء الفوري بالمعالجة بالصادات الحيوية:
 - طفل عمره أقل من سنتين، قليل الأعراض، بشرط إعادة تقويم الحالة بعد 48 - 72 ساعة من معالجة عرضية.
 - غشاء طبل محتقن ولكن مع احترام التعرجات الطبيعية، ومن دون أن يكون منتفخاً، وذلك في اليوم الأول من التهاب الأنف والحنجرة: الطفل يجب أن يعاد فحصه في حال استمرار الأعراض بعد 3 أيام.

2. المعالجة بالصادات الحيوية (الخيار الأول):

المعالجات الموصى بها في حالة التهاب الأذن الوسطى القيحي هي (جدول 3):

- أموكسيسيللين - حمض كلافلونيك.
 - سيپودوكسيم بروكسيتيل.
 - سيفوروكسيم أكسيتيل.
- هذا ولا يقترح إعطاء السيفيكسيم إلا في حال شك كبير بانتان عائد للهيموفيلوس أنفلونزا (التهاب أذن وسطى قيحي مترافق مع التهاب ملتحمة قيحي).
- مرافقة الإيريثروميسين مع السولفافورازول يكون بديلاً في حالة التحسس على البيتا لاكتامين. المعالجة بالصادات الحيوية يجب أن توصف لمدة قدرها من 8 - 10 أيام عند الطفل ذو العمر أقل من سنتين. في حالة العمر أكثر من سنتين،

يجب تفضيل المعالجة القصيرة المدة. اللجوء إلى السيفترياكسون حقناً داخل العضل يجب أن يبقى استثنائياً: عند الرضع الذين عمرهم أقل من 30 شهراً كبديل للمعالجة عن طريق الفم أو في حال عدم إمكانية إعطاء المعالجة عن طريق الفم بشكل خاص في حالة التهاب الأذن الوسطى الحاد المشكوك أنه مسبب من قبل المكورات الرئوية المقاومة للبنيسيلين (50 مغ/كغ جرعة وحيدة).

3. التطور:

في أغلب الحالات منذ اليوم الثاني يبدأ الشفاء، واعتباراً من اليوم الثامن يصبح غشاء الطبل طبيعياً. في حال غياب التحسن بعد 48 ساعة من بدء المعالجة فإنه يجب إعادة فحص الطفل وغالباً يجب طلب استشارة أخصائية الاختلاطات الممكن حصولها: التهاب سحايا، التهاب عظمي خشائي، التهاب الوريد الخثري الدماغي. التهابات الأذن المتكررة، والتي يجب أن تعالج من قبل أخصائي، تتظاهر بعدة أشكال:

- تكرر التهاب الأذن الوسطى الحاد مع عودة غشاء الطبل إلى مظهره الطبيعي خلال الفترة الفاصلة ما بين الالتهابات.
- التهاب أذن مصلي مخاطي مع حدوث هجمات حادة.
- انتقاب غشاء الطبل مع حدوث سيلان أذن مزمن وتفاعل خشائي مزمن.

جدول 3 - المعالجة بالصادات الحيوية لالتهاب الأذن الوسطى الحاد -

الجرعة وعدد مرات أخذ الدواء باليوم

الدواء*	البالغ	الطفل	عدد مرات أخذ الدواء
أموكسيسيلين + حمض الكلافولينيك	3 غ	80 - 100 مغ/كغ	3
سيفوروكسيم أكسيتيل	0.5 غ	3 مغ/كغ	2
سيفيكسيم	0.4 غ	8 مغ/كغ	2
سيفيدوكسيم بروكسيتيل	0.4 غ	8 مغ/كغ	2
سيفوبتام هيكرزيتيل	0.4 غ	8 مغ/كغ	2
سيفترياكسون	1 غ	50 مغ/كغ	1 - 3 حقن داخل العضل
إريثروميسين + سولفاورازول	-	مضاد استطباب > 2 شهر	3**

* بحسب توجيه القحوص الجرثومية.

** حقنة وحيدة كبديل للمعالجة عن طريق الفم؛ حقنة وحيدة 3 أيام متتالية في حال فشل المعالجة المثبتة.

4. معالجة الحالات التي فشلت فيها المعالجة الدوائية:

فشل المعالجة يعرف بتدهور أو استمرار أو عودة ظهور العلامات الوظيفية أو العامة 48 ساعة بعد بدء المعالجة بالصادات الحيوية، أو خلال الأيام التالية لانتفاء المعالجة مترافقة مع علامات على تنظير الأذن لالتهاب أذن وسطي حاد قحبي.

هذه الحالة تتطلب عزل الجرثوم المسبب، إما بواسطة خزع غشاء الطبل أو أخذ عينة للسيلان الأذني، خاصة عند الأطفال > 2 سنة.

إذا كان الزرع إيجابياً والجرثوم حساس للمعالجة البدئية، فإنه يجب التحقق من كيفية أخذ المعالجة.

الخيارات التالية ممكنة:

- إذا كان الأمر يتعلق بالمكورات الرئوية التي التركيز المثبط الأصغر للبنيسيلين هو $0.12 \leq \text{مغ/ل}$ و $1 \geq \text{مغ/ل}$: أموكسيسيلين بجرعة قوية: 15 مغ/كغ/يوم، 3 جرعات لمدة 10 أيام.
- إذا كان الأمر يتعلق بالمكورات الرئوية التي التركيز المثبط الأصغر للبنيسيلين هو $1 < \text{مغ/ل}$: سيفترياكسون (50 مغ/كغ/يوم لمدة 3 أيام).
- إذا كان الأمر يتعلق بالهيموفيلوس أنفلونزا المولدة للبيتا لاكتاماز: فإنه يجب إعطاء الأموكسيسيلين - حمض الكلافولينيك، سيفيكسيم، سيفيدوكسيم بروكسيتيل، سيفوروكسيم أكسيتيل، سيفوتيام هيكسيتيل، كوتريموكسازول.

5. التهاب الأذن الخطر:

في حال وجود اختلاطات موضعية، أو انتشار الالتهاب، فإن إعطاء السيفترياكسون منصوح به.

4. التهاب الجيوب

من المفضل معرفة الجرثوم المسبب وذلك في حالة التهاب الجيوب الحاصل في المشفى (نوزوكوميالي)، التهاب الجيب الوندي، التهاب الجيوب الشامل، وعند ناقص المناعة بسبب عدم إمكانية التكهن بالجرثوم المسبب.

• عند البالغ:

- المعالجة بالصادات الحيوية غير مستطبة عند وجود أعراض رشح منتشرة، ثنائية الجانب، ذات شدة معتدلة وفي حالة وجود قصة وباء.
- يوصى بالمعالجة بالصادات الحيوية في حال الشك القوي بانتان جرثومي. هذا يعني في حال وجود 2 - 3 على الأقل من الخصائص التالية:
- * استمرار أو ازدياد الآلام تحت الحجاجية وذلك بعد 48 ساعة من المعالجة العرضية.
- * ألم وحيد الجانب يزداد عند حني الرأس إلى الأمام، نابض، ويزداد مساءً أو ليلاً.
- * ازدياد سيلان الأنف، سيلان قيحي، لا سيما عندما يكون وحيد الجانب.

• عند الطفل (بعد 3 سنوات):

- يوصى بالمعالجة بالصادات الحيوية مباشرة:
- * في الحالات الحادة الشديدة (حرارة $>39^{\circ}$ ، صداع، سيلان أنفي قيحي \pm وزمة حول الحجاج).
- * في الحالات تحت الحادة، وفي حالة وجود عوامل خطر (ربو، اعتلال قلبي، وجود الخلايا المنجلية).
- هذا ولا يوصى باستعمال الصادات الحيوية مباشرة في الحالات تحت الحادة (ترفع حروري بسيط، سعال، سيلان أنفي قيحي مع انسداد أنف مستمر منذ أكثر من 10 أيام).

1. المعالجة العرضية:

- الكورتيزونات مستطبة في الحالات الشديدة الإيلام (التهاب الجيب الساد) وذلك لمدة 4 - 6 أيام. فائدة مضادات الالتهاب الغير ستيروئيدية لم تثبت.
- بزل الجيب من أجل تفجير وغسله مستطب بعد اليوم الخامس من المعالجة وذلك في حال فشل هذه الأخيرة أو في الحالات الشديدة الإيلام.

2. المعالجة بالصادات الحيوية لالتهابات الجيوب الحادة (جدول 4):

عند البالغ المعالجة بالصادات الحيوية ذات الخيار الأول لإنتان جرثومي للجيوب الفكية الحاد يركز على استعمال الأموكسيسيلين - حمض الكلافولينيك، السيفوروكسيم - أكسيتيل، السيفيدوكسيم بروكسيتيل أو السيفوتيام هيكتيتيل، البريستيناميسين والتيليتروميسين يستعملان كبديل خصوصاً في حالة التحسس على البيتا لاكتامين. استعمال الفلوروكينولون المضاد للمكورات الرئوية يجب أن يحتفظ به لكي يستعمل في حالة التهاب الجيوب الجبهية أو الوتدية (وذلك كبديل للمعالجة المذكورة سابقاً) أو بعد فشل المعالجة الأولية لالتهاب الجيوب الفكية الحادة وذلك بعد التأكد من المعطيات الجرثومية والشعاعية.

عند الطفل، الصادات الحيوية الموصى بها كخيار أول هي الأموكسيسيلين - حمض الكلافولينيك، والسيفيدوكسيم بروكسيتيل. المدة المتوسطة للمعالجة هي من 7 - 10 أيام (إلا في حالة استعمال التيليتروميسين حيث تكون المدة 5 أيام).

جدول 4 - المعالجة بالصادات الحيوية لالتهابات الجيوب الحادة - العيار وعدد الجرعات اليومية

الدواء	البالغ	الطفل	عدد الجرعات اليومية
أموكسيسيلين حمض الكلافولينيك	2 - 3 غ	8 مغ/كغ	2 - 3
سيفوروكسيم أكسيتيل	0.5 غ	-	2
سيفوتيام هيكتيتيل	0.4 غ	-	2
سيفيدوكسيم بروكسيتيل	0.4 غ	8 مغ/كغ	2
بريستيناميسين	2 - 3 غ	50 مغ/كغ/يوم	2 - 3
ليفوفلوكساسين	0.5 غ	-	1
مولسيفلوكساسين	0.4 غ	-	1
تيليتروميسين	0.8 غ	-	1

5. التهاب الجيب الغربالي

قبل سن الـ 5 سنوات، التهاب الجيب الوحيد الممكن هو التهاب الجيب الغربالي. وهو يصادف أيضاً عند البالغ. هذا الالتهاب نادر

الحدوث وهو خطير جداً بسبب اختلاطاته: التهاب الخلايا خلف الحجاج، التهاب الوريد الخثري الدماغي، خراج الدماغ، التهاب السحايا القيحي.

يشك بحصول هذا الالتهاب أمام صورة سريرية لإنتان حاد مترافق مع وذمة التهابية متوضعة على الزاوية الأنسية للحجاجين والأجفان، وقد يحصل في بعض الأحيان خروج للكرة العينية من الحجاج، التشخيص يؤكد بالتصوير الطبقي المحوري.

المعالجة عن طريق الوريد أو العضل تكون موجهة ضد المكورات العنقودية المذهبة والهيوفيلوس أنفلونزا سببياً. هذا وإن مرافقة السيفالوسبورين جيل 3 مع الفوسفوميسين له أفضلية بحيث أنه يمكن أن يكون فعالاً أيضاً على توضع جرثومي دماغي سحائي محتمل.

6. التهاب العظم الخشائي

الوبائية الجرثومية لالتهاب العظم الخشائي هي نفسها تلك الخاصة بالتهابات الأذن الوسطى، هذه الأخيرة تشكل اختلاطاً يحدث بعد عدة هجمات من التهاب العظم الخشائي: وهكذا فالجراثيم الأكثر مصادفة هي: المكورات الرئوية، الهيوفيلوس أنفلونزا سببياً، عصيات غرام سلبية (بسودوموناس أيروجينوزا)، اللاهوائيات. التشخيص سريري (حرارة مع ألم) ويؤكد بواسطة التصوير الطبقي المحوري.

المعالجة بالصادات الحيوية الأولية يجب مناقشتها مع احتمال تدخل

جراحي:

أموكسيسيللين - حمض الكلافولينيك حقناً (75 - 100 مغ/كغ/يوم من الأموكسيسيللين) أو سيفالوسبورين جيل 3 (سيفترياكسون أو سيفوتاكسيم) ± تيميدازول، اختبار التحسس الجرثومي للصاد الحيوي يمكن أن يقود إلى تعديل هذه المعالجة وذلك في حالة عزل مكورات عنقودية أو بسودوموناس سببياً بشكل خاص.

7. التهاب الأذن الخارجية

تحدث غالباً فوق أكزيما متوضعة على مجرى السمع الخارجي، وتظاهر بألم أذني حاد؛ في حال وجود سيلان قيحي يجب وضع التشخيص التفريقي مع التهاب الأذن الوسطى الحاد المتقوب. هذا وإن معالجة موضعية بالصادات الحيوية مترافقة مع كورتيزون تعتبر كافية؛ الألم يتطلب غالباً معالجة مسكنة.

التهاب الأذن الخارجية الخبيث يحدث عند المريض السكري. هذا الالتهاب تسببه البسودوموناس أيروجينوزا، وهو يتطلب معالجة بالصادات الحيوية بواسطة الحقن، ومكيفة حسب اختبار التحسس الجرثومي للصاد الحيوي.

8. التهاب الحنجرة

فيروس سي في أغلب الحالات، والمعالجة هدفها الحفاظ على المجاري الهوائية مفتوحة دون اللجوء إلى المعالجة بالصادات الحيوية. التهاب الحنجرة التشنجي (زلة تنفسية وصرير مفاجئ ليلي) يتراجع بسرعة بالمعالجة بالكورتيزونات (ديكساميثازون داخل العضل 3 - 6 مغ) ووضع شاشات ساخنة حول العنق. استمرار الزلة أكثر من عدة ساعات يجب أن يدفعنا للشك بوجود التهاب حنجرة تحت المزماري والذي يكون أكثر شدة. إنه يعود عادة لإنتان جرثومي بالمكورات العنقودية أو الهيموفيلوس أنفلونزا، وهو يتطلب مراقبة في المشفى، معالجة بالصادات الحيوية وأحياناً التنفّس الاصطناعي.

9. التهاب لسان المزمار الحاد

يحدث ما بين 2 - 7 سنوات. الهيموفيلوس أنفلونزا هي الجرثوم المسبب له (زرع الدم)، الصورة السريرية ترافق تناذر اختناق عند طفل نجده في

وضعية الجلوس، لا يستطيع بلع لعابه، في حالة إنتانية مع ترفع حروري شديد. اللقاح ضد هذا الجرثوم يحقق وقاية ممتازة. يجب عدم تحريك الطفل (خطر الموت المفاجئ). هذا ويجب ألا نتمسك برؤية لسان المزمار - في حالة صعوبة الفحص - . يجب نقل المريض إلى العناية المشددة إسعافياً (في وضعية الجلوس) وبواسطة سيارة الإسعاف. وضع أنبوب للتهوية عن طريق الفم أو الأنف صعب جداً وخزع الحنجرة الإسعافي يمكن أن يكون ضرورياً. الشفاء يحدث خلال 3 - 5 أيام، مع معالجة بالصادات الحيوية داخل الوريد (أموكسيسيلين - حمض الكلافولينيك، أو سيفالوسبورين جيل 3).

19. الإنتانات الفموية السنية

1. الإنتانات السنية

1. الأسباب والتصنيف:

- النبيت الجرثومي الفموي يتضمن عدة جراثيم متحملة للهواء (مكورات عقدية فموية) ولاهوائية حصراً (جدول 1).
- هذه الإنتانات تنتقل غالباً بالنخر السني والتهاب اللثة، اللذان يمثلان مسببات الخراج السني أو اللثوي. هذا الالتهاب يمكن أن يمتد موضعياً (التهاب الفم الاحمراري - القرصي، حبيبات، كيسة سنية فمية، ناسور لثي) أو في المنطقة المجاورة للالتهاب (التهاب خلوي، التهاب غدد لمفاوية، خراج غدد لمفاوية، التهاب أذن، التهاب الجيب الفكي، التهاب وريد خثري جمجمي وجهي). وأخيراً إلى المناطق البعيدة (تجرثم الدم، التهاب شغاف القلب الإنتاني، خراج رئوي، خراج دماغي، حرارة مستمرة مجهولة السبب).

جدول 1 - الجراثيم الأكثر وجوداً في الفم

عصيات		مكورات		هوائيات أو محبة للهواء
غرام -	غرام +	غرام -	غرام +	
اكتينوباسيلوس	لاكتوباسيلوس	نيسيريا	مكورات عقدية	محبة للهواء
كابتوسيتوفاجا	كورين باكتيريام		مكورات	
هيموفيلوس			عقدية	
ايكينيلا				
باكتيروبيد	اكتينوميسين	فيلونيل	مكورات عقدية	لاهوائية حصرية
فوزوباكتيريام	بروبيوني باكتيريام		بيتو	
بريفوتيللا				
بروفيروموناس				

* مكورات عقدية سببها: لا تشكل عنصراً من النبيت الجرثومي الفموي الطبيعي. ولكن المكورات العقدية المذهبة تعزل غالباً من الخراج السني.

2. التشخيص:

الجرثومي:

عينات موضعية تحقق في شروط لاهوائية صارمة (أخذ العينة ونقلها) مع تشخيص الجرثوم المسبب وتحقيق فحص التحسس الجرثومي للصاد الحيوي للجراثيم المسيطرة. في الحالات الخطيرة أو المنتشرة وحسب الحالة السريرية فإنه يجب تحقيق زرع الدم أو الخزعة.

الفحوص الشعاعية

صورة شعاعية للأسنان، صورة خلف الأسناخ، أورتوبانتوغرام، وحسب امتداد الالتهاب يحقق صور شعاعية عظمية، إيكو، تصوير طبقي محوري، مرنان مغناطيسي.

3. مبادئ المعالجة:

المعالجة الشافية:

ليس كل الإنتانات السنية تتطلب معالجة بالصادات الحيوية. العناية الموضعية أساسية جداً: عناية بالأسنان، جراحة وتفجير في حالة الإنتانات الخطيرة أو الشديدة، التهاب خلوي، مضادات الالتهاب الغير ستيروئيدية بما فيها الأسبيرين يجب ألا توصف كخيار أول خلال الإنتان الفموي - السني (خطر زيادة التهاب الخلايا).

وصف الصادات الحيوية في حالات الأمراض السنية والفكية كانت قد حددت بتوصيات حديثة من قبل الـ ASSAPS في تموز 2001. هذه التوصيات تستند إلى حالة المريض العامة (شخص ذو صحة جيدة مؤهل للإصابة بالإنتان من فئة A أو فئة B، جدول 2) وطبيعة المداخلة العلاجية (جدول 3).

الصادات الحيوية الموصى بها موضحة في الجدول 4، أما مدة المعالجة فهي غير محددة بشكل جيد (5 أيام على الأقل و 3 أيام بالنسبة للآزيتروميسين).

جدول 2 - الأشخاص المؤهين للإصابة بالإنتان

أشخاص طبيعويون لا يحملون خطراً خاصاً للإصابة بالإنتان	لا يوجد عوامل خطر تؤهب للإصابة بالإنتان، ولا يوجد آفة صحية خاصة. بعض الأمراض القلبية حدد أنها لا تحمل خطر الإصابة بالتهاب شغاف القلب الإنتاني (أنظر فصل التهاب شغاف القلب الإنتاني).
أشخاص معرضون للإصابة بالإنتان	خطر الإصابة بإنتان موضعي أو إنتان عام (تجرثم دم). الأشخاص الذين أجري لهم نقل أعضاء أو طعم (باستثناء الأشخاص المعالجين بالسيكولوسبورين فقط)، ناقصي المناعة، أشخاص مصابين بمرض مزمن غير مسيطر عليه، أشخاص ناقصي التغذية.
فئة A	أشخاص عندهم خطر الإصابة بتوضع ثانوي للإنتان الأولي (السنّي - القموي) هذا التوضع للثانوي يكون بعيداً عن التوضع الأولي (التهاب شغاف القلب الإنتاني، إنتان فوق طعم مفصلي). أشخاص مصابين بمرض قلب معروف بأنه يحمل خطر الإصابة بالتهاب شغاف القلب الإنتاني (أنظر فصل التهاب شغاف القلب الإنتاني) وبعض الأشخاص الحاملين للطعوم.
فئة B	

جدول 3 - استطبائات المعالجة بالصادات الحيوية في الإنتانات القموية - السنية

المرض	المعالجة بالصادات الحيوية	عند الشخص المؤهب للإصابة بإنتان	المعالجة بالصادات الحيوية
	السليم (الصحيح)	موضعي/عام	بعيد عن التوضع الأولي فئة B
النخر السنّي	غير مبررة	غير مبررة	غير مبررة
أمراض اللب السنّي والاختلاطات حول الجذر السنّي			
- أمراض لب السن	غير مبررة	غير مبررة	غير مبررة
- التهاب لب السن العابر والقابل للتراجع	غير مبررة	غير مبررة	غير مبررة
- التهاب لب السن الحاد والمزمن الغير قابل للتراجع	غير مبررة	غير محددة	غير محددة
- اختلاطات أمراض لب السن:			
- مع آفات حول جذر السن	غير محددة	غير محددة	منصوح بها
- حادة (خراج حول الرأس)	منصوح بها	منصوح بها	منصوح بها
- مزمنة (ورم جيبي، كيسة جذرية - سنّية)	غير مبررة	غير محددة	غير محددة
- نخر لبّي	غير مبررة	منصوح بها	منصوح بها

الرضوض السنخية السننية

- بسيطة	غير مبررة	غير مبررة	غير مبررة
- مختلطة مع تمزق في المخاطية أو العظم	غير مبررة	غير مبررة	منصوح بها
أمراض لثوية سننية			
- التهاب اللثة المزمن	غير مبررة	غير محددة	غير محددة
- التهاب اللثة المرافق لأمراض جهازية	بدون هدف	غير محددة	غير محددة
- التهاب اللثة المرافق لأخذ أدوية	بدون هدف	غير محددة	غير محددة
- التهاب اللثة القرصي النخري	منصوح بها	منصوح بها	منصوح بها
- التهاب لثي - سني شديد:			
- قبل البلوغ	منصوح بها	منصوح بها	منصوح بها
- شبابي	منصوح بها	منصوح بها	منصوح بها
- ورم لثي ذي تطور سريع	منصوح بها	منصوح بها	منصوح بها
- ورم لثي مزمن	غير محددة	منصوح بها	منصوح بها
- ورم لثي معند	منصوح بها	منصوح بها	منصوح بها
- خراج فكي سني	غير مبررة	منصوح بها	منصوح بها
حوادث طفح سني			
- أسنان لبنية	غير مبررة	غير محددة	منصوح بها
- أسنان دائمة (التهاب حول تاج السن)	منصوح بها	منصوح بها	منصوح بها
التهاب خلوي			
- حاد متوضع	منصوح بها	منصوح بها	منصوح بها
- حاد منتشر	منصوح بها	منصوح بها	منصوح بها
- مزمنة (مثبتة جرثوميا)	غير مبررة	منصوح بها	منصوح بها
- منتشرة (مع نسج متوترة) ومثبتة جرثوميا	منصوح بها	منصوح بها	منصوح بها
- فطور رقيقة ووجهية (مثبتة جرثوميا وتشريحيا مرضيا)	منصوح بها	منصوح بها	منصوح بها
التهاب العظم			
- التهاب السنخ الجاف	غير مبررة	غير مبررة	منصوح بها
- التهاب السنخ القيحي	منصوح بها	منصوح بها	منصوح بها
- التهاب العظم (الفكي السفلي)	منصوح بها	منصوح بها	منصوح بها
- ساقو (فكي سفلي)	غير مبررة	غير مبررة	غير مبررة
- التهابات قموية	منصوح بها	منصوح بها	منصوح بها
إلتانات جرثومية للفقد اللعابية			
- تحت الفك السفلية	منصوح بها	منصوح بها	منصوح بها

منصوح بها	منصوح بها	منصوح بها	- التهاب الغدة التوكفية
منصوح بها	منصوح بها	منصوح بها	إمراضية مرتبطة لزراع الأسنان
منصوح بها	منصوح بها	منصوح بها	أفات إنتانية حول الزرع السني
بدون هدف	منصوح بها	غير مبررة	- مبكرة قبل وضع الزرع السني (4 - 6 أشهر بعد العملية)
بدون هدف	منصوح بها	غير مبررة	- متأخرة بعد وضع الزرع السني في مكانه (< 4 - 6 أشهر)
بدون هدف	منصوح بها	غير مبررة	إعادة تشكيل النسيج العظمي - السني
بدون هدف	منصوح بها	غير مبررة	- غشاء
بدون هدف	منصوح بها	غير مبررة	- طعم عظمي
بدون هدف	منصوح بها	غير مبررة	- مواد مرممة
بدون هدف = مضاد استطباب عند هؤلاء الأشخاص			

المعالجة الوقائية بالصادات الحيوية:

- استطبابات المعالجة الوقائية بالصادات الحيوية وذلك حسب الأمراض الفموية - السنية:

- في حالة التداخلات الاختراقية: المعالجة الوقائية بالصادات الحيوية منصوح بها في حالة القيام بتدخل مؤهب للإصابة بالإنتان (مع احتمال نزف هام) وذلك عند شخص من فئة A أو B أو عند شخص سليم وذلك في حال تدخلات جراحية خاصة (أنظر فصل التهاب شغاف القلب الإنتاني). حسب التوصيات الصادرة عام 2002 والمتعلقة بالوقاية من التهاب شغاف القلب الإنتاني، فإن أمراض القلب المؤهبة للإصابة بالتهاب شغاف القلب الإنتاني والمصنفة تحت عنوان أمراض القلب ذات الخطورة العالية (فئة A: يوصى بالصادات الحيوية حسب الحالة) (أنظر فصل التهاب شغاف القلب الإنتاني).
- التدخلات الغير اختراقية والتي لا تحمل خطر نزف هام، بشكل خاص عند الأشخاص السليمين أو عند الأشخاص من فئة A أو B، فإن المعالجة الوقائية بالصادات الحيوية غير مبررة.

- أشكال المعالجة الوقائية بالصادات الحيوية للإنتانات الحاصلة كاختلاط للمعالجة:
- الوقاية من التهاب شغاف القلب الإنتاني (أنظر فصل التهاب شغاف القلب الإنتاني).

- الوقاية من الإنتانات الحاصلة فوق طعوم مفصلية: لا يوجد إثبات لفائدتها، وهي قابلة للمناقشة.
- معالجة وقائية من الإنتانات الموضعية، بعد استئصال سن مع نزع السنخ مثلاً: مرافقة 4.5 مليون وحدة سبيراميسين + 750 مغ ميترونيدازول باليوم أو أموكسيسيللين 1 - 2 غ/يوم.
- معالجة وقائية من الإنتانات العامة: أنظر سابقاً، نفس الاستطببات.

جدول 4 - اختيار الصادات الحيوية للمعالجة الشافية

إنتانات شديدة	إنتانات ذات شدة متوسطة	الخيار الأول
- من المفضل إعطاؤها عن طريق الوريد بالجرعة المنصوح بها للصادات الحيوية المستعملة ووصف أموكسيسيللين + حمض الكلافولينيك.	- الأمبيسليلينات (أموكسيسيللين): 1 - 2 غ/يوم) 5 نيترو إيميدازول ± ماركوليد سبيراميسين - ميترونيدازول (رونوجيل): 4.5 مليون وحدة/750 مغ/يوم) - ماركوليد - سترينوغرافين: بريستيناميسين (بيوستاسين): 2 - 3 غ/يوم) - إينكوساميد: كلينداميسين (دالاسين)، 0.6 - 1.2 غ/يوم)	
- غليكوبيبتيد في حالة التحسس أو المقاومة للبنيتاكتامين. - سيفالوسبورين بعد العزل الجرثومي وفحص التحسس الجرثومي للصاد الحيوي (أو لصادات حيوية أخرى)	- أموكسيسيللين + حمض الكلافولينيك (Ciblor، Augmentin 1.5 غ/يوم) - نيتراسيكلين (فقط من أجل الالتهاب النكفي السني الشبابي)	الخيار الثاني
- سيفالوسبورين - أمينوزيد - فلوروكينولون	غير منصوح باستعمالها	

2. الإنتانات الخفية

1. التهابات الفموية:

الأمر يتعلق بأفات التهابية للمخاطية الفموية، سواء كانت منتشرة أو متوضعة: التهاب اللثة، التهاب اللسان، التهاب الشفة، تقيج زاوية الشفة.

الأسباب والتصنيف:

أغلب التهابات الفم تعود لأسباب دوائية مع توضع إنتان جرثومي أو فطري. الأوبئة المسببة لهذه الالتهابات يمكن أن تكون ذات آثار جانبية معروفة على هذا المستوى (كورتيكوزونات، صادرات حيوية، مضادات كوليرجية، إلخ)، أو أدوية آثارها الجانبية غير متوقعة هنا (طفح جلدي مخاطي). التهابات الفم يمكن أن تصنف حسب مظهرها، احمرار، حويصلات، فقاعات أو قرحات (جدول 5).

هذه الالتهابات يمكن أن تسبب انزعاجاً عند الطعام، وهذا الانزعاج يمكن أن يكون هاماً ومتوافقاً مع تردّد في الحالة العامة للمريض. عند الأشخاص ذوي المناعة الناقصة، بصورة خاصة عند الأشخاص الذين عندهم نقص في الكريات البيض المعتدلة أو الذين عندهم إنتان متقدم بالـ VIH، فإن التهابات الفم تكون كثيرة المصادفة وخطيرة ومترافقة غالباً مع التهاب أو أورام في اللثة (نخرية أو قرصية)، مكونة بوابة دخول لإنتانات عامة. إصابة المريء يمكن أن ترافق هذه الإنتانات (المبيضات، الحلا).

مبادئ المعالجة:

المعالجة العرضية:

- نزع الترسبات لأنه يوجد دائماً إنتان للنبيت الفموي مسؤول عن الألم.
- غرغرة بمعقم (إيلورديل، هيكزتريل/هيبيدنت)، ماء أوكسجيني ممدد 10 حجوم (ملعقة كبيرة/كوب ماء).
- محاليل مُنقصة للحموضة: ماء بيكربونات أو ماء فيشي في حالة وجود مبيضات.

- مخدرات موضعية: مرهم كزيلوكابين لزج، والذي يجب استعماله بحذر (تحسس، استعمال عند البالغ).
- معالجة العوامل المساعدة على حصول التهاب:
- تحسين نظافة الأسنان والعناية بها: فرك الأسنان، أو الطعوم.
- البحث عن التهاب فم كامن.
- إنقاص أو إيقاف الأدوية المؤهبة لحدوث الإنتان (كورتيكوستيرويدات، صادات حيوية) أو المسؤولية عن نقص اللعاب (المضادات الكولينرجية، إلخ...).
- إيقاف التدخين.
- مواد لعابية في حال نقص اللعاب الحاد: أرتيزيال، سيالين بخاب.
- معالجة خاصة مضادة للإنتان:
- المعالجة بالصادات الحيوية عن الطريق العام، منصح بها في حالة التهاب الفم المنتشر، بشكل خاص التهاب الفم القرصي النخري.
- في حالة وجود التهاب بالمبيضات البيض فإنه يجب استعمال مضادات فطرية موضعية: نيساتين (ميكوستاتين)، أمفوتيريسين B (فونجيزون)؛ كيتوكونازول (نيزورال) أو فلوكونازول (تريفلوكان)، هذه الأدوية تستعمل عن طريق الفم في حالة نقص المناعة أو في حالة تكرار الإنتان.
- أسيكلوفير (زوفيراكس) مستطب في حالة التهاب الفم الحلئي الحاد والشديد.

2. التهابات الغدد اللعابية: التهاب الغدة النكفية، والغدد تحت الفك:

الجرثومية: تصادف عند المسنين أو الأشخاص السيئي التغذية، الذين عندهم تجفاف، الحاملين لقطرة فموية معوية للتغذية عن طريق جهاز الهضم، أو عند الأشخاص الذين أجري لهم عمل جراحي حديث أو في حالة وجود عائق (حصاة سادة للقناة اللعابية). الإصابة تكون وحيدة الجانب عادة. المعالجة بالصادات الحيوية عن الطريق العام موصى بها (جدول 3).

هذا وبما أن الإنتان يعود عادة إلى المكورات العنقودية الذهبية، فإن

الصاد الحيوي المختار هو صاد حيوي مضاد للمكورات العنقودية (كلوكساسيلين - أوربينين عن طريق الفم أو الوريد). التفجير الجراحي ضروري إذا لم يحدث تحسن سريع وهو يجرى بعد فحص الإيكو أو التصوير الطبقي المحوري وذلك لتأكيد وجود التجمع القيحي.

التهاب الغدة النكفية المتكرر عند الطفل أو المزمّن عند البالغ يتطلب تصوير ظليل للغدة اللعابية مع غسل للغدة ومعالجة بالصادات الحيوية عن الطريق العام.

الفيروسية: تعود غالباً لفيروس أوزلين. ولا يوجد معالجة خاصة لها.

جدول 5 - الأسباب الإلتانية والعوامل المؤهبة

لإلتهابات الفم

مظهر احمراري	مظهر حويصلي
أسباب موضعية	أسباب حمية: حلا، داء المنطقة، كوكساكي
● غناية سنية بصحة الفم والأسنان: رواسب سنية، نخر سني، أسنان مكسرة، بدلة وسخة	(تتأثر يد - رجل - فم). تتأثر ستيفن - جونسون
● طعوم ثابتة	مظهر فقاعي
● تحريك الأسنان	احمرار متعدد الأشكال (جراثيم فطرية رئوية)
أسباب عامة	مظهر قرصي:
● فيروسية: حصبة، حصبة المانية، نكاف، فيروس إيبشتاين بار	أسباب موضعية:
● جرثومية: سكارلاتين	● غناية سنية بصحة الفم والأسنان
● فطور (قلاع، تقيح زاوية الشفتين، لسان أسود زغبي): وهي تحدث نتيجة: استعمال بعض الأدوية (صادات حيوية، كورتيزونات، مثبطات مناعة) أو نقص مناعة (VIH)	● حوادث عائدة لنمو ضرر العقل السفلي
سكري أو العمر (الأطفال الصغار)	أسباب عامة:
	● قرحة زهرية
	● تقرحات سطحية: VIH (إلتان أولي)
	● آفات قرحية نخرية: أورام حيوية (أمراض دموية، أدوية، أو تسمم)
	● حمة الاندخال الخلوي العرطل

20. الإختانات العينية

الإختانات المختلفة للبنية الحجاجية العينية (جدول 1) يجب أن تعالج من قبل طبيب العينية (داء المنطقة العيني، أنظر الفصل 26).

جدول 1 - المعطيات السريرية للإصابات المختلفة

عين حمراء	عين مؤلمة	دماع	خوف من الضياء	تدن في القدرة البصرية
++	±	+	+	-
+	+	++	++	في حال الإصابة المركزية
+	++	-	++	+++ إلى +
-	-	-	-	+++ إلى +
++	++	-	-	+++ إلى +

التهاب العين
التهاب القرنية
التهاب العين
التهاب الشبكية
التهاب العين
الشامل الحاد

1. إصابات جزء العين الأمامي

1. التهابات الملتحمة:

- غالباً ثنائية الجانب، وتنتشر بعين حمراء مدمعة مؤلمة قليلاً أو غير مؤلمة.
- التهابات الملتحمة الفيروسية: (غالباً الأدينوفيروس)، غالباً معدية، وهي تتميز بالإحساس بوجود جسم أجنبي، دُماع، خوف من الضياء، ونزعة في الأنفان وضخامة في العقد اللمفاوية، القطرات المعقمة أو قطرات الصادات الحيوية تقي من توضع إنتان جرثومي.
- التهابات الملتحمة الجرثومية القيحية: (المكورات العنقودية، المكورات الرئوية، الهيموفيلوس سببسيا)، تتميز بإفرازات قيحية غزيرة، وهي تعالج بقطرات أو مراهم صادات حيوية، هذا ويجب تجنب الفلوروكينولون المولد لمقاومة جرثومية متزايدة. والذي يجب الاحتفاظ به لمعالجة التهابات

القرنية الجرثومية. هناك مضادات استطباب للريفامبيسين عن الطريق العام أو كقطرة وذلك عند الحاملين لعدسات لاصقة. ومن جهة أخرى يوجد مضاد استطباب لوضع العدسات اللاصقة في حالة الإصابة بالتهاب القرنية والملتحمة.

● التهابات الملتحمة العائدة للكلاميديا: (كلاميديا تراكوماتيس من D إلى K)، وهي تلتقط بشكل عام بعد الاستحمام في البيسين أو نتيجة انتقال العدوى عن الطريق التناسلي. أخذ لطاخة من الملتحمة يظهر خلايا بشرية ذات تدخال سيتوبلازمي خاص. الخثر العائد إلى الكلاميديا تراكوماتيس (A حتى C) المنتشر بشكل وبائي في البلاد الفقيرة، يؤدي في حال غياب المعالجة إلى العمى وذلك نتيجة التهاب ملتحمي قرني مزمن (السبب الأول للعمى في العالم). المعالجة تركز على استعمال السيكلين موضعياً وعن طريق الفم 200 مغ/كغ/يوم.

● التهابات الملتحمة عند حديثي الولادة لها أسباب مختلفة:

- كلاميديا تراكوماتيس: تحدث 10 - 15 يوماً بعد الولادة. المعالجة تركز على أخذ مأكروليد عن طريق الفم خلال 15 يوماً ومن الممكن إضافة قطرات صادات حيوية أو قطرات معقمة.
- مكورات بنية: انقرضت في فرنسا منذ الاستعمال الروتيني لقطرات نيترات الفضة أو الإيريترومييسين منذ الولادة.
- جرثومية مزمنة أو متكررة: يجب أن تدعو للشك بوجود انسداد في القناة الدمعية الأنفية.

2. التهابات القرنية:

وحيدة الجانب بصورة عامة، وهي تتظاهر بعين حمراء، خوف من الضياء، ألم، دُماع، أو غالباً نقص في القدرة البصرية. هذا وفي حال عدم المعالجة الجيدة أو وجود مقاومة للمعالجات المختلفة، فإن هذه الآفة يمكن أن تتطور نحو كثافة قرنية أو انتقَاب.

- التهاب القرنية الخلفي: يأخذ شكل قرحة متشعبة. المعالجة تكون باستعمال الأسيكولوفير كمرهم عيني (زوفيراكس: 5 مرات/يوم)، الأشكال العميقة التوضع يكون إنذارها الوظيفي أسوأ وتعالج بواسطة الأسيكولوفير داخل الوريد (10 مغ/كغ/8 ساعات) أو عن طريق الفم (4 غ/24 ساعة). الأشكال المتكررة (التهاب قرنية إيبينثالي متكرر أكثر من 3 مرات في السنة، أو في حال وجود عوامل مؤهبة معروفة، التهاب قرنية سدوي متكرر أكثر من مرتين في السنة) تتطلب معالجة عن طريق الفم ولمدة طويلة بواسطة أسيكولوفير 800 مغ.
- أشكال أخرى من التهابات القرنية فيروسية المنشأ: تعود إلى فيروس الحصبة (طفل سيئ التغذية في البلاد الفقيرة)، فيروس الحماق وداء المنطقة (داء المنطقة العيني)، والفيروسات الغدية (الالتهاب القرني للملتحمة البائي).
- التهابات القرنية الجرثومية: (مكورات غرام +، عصيات غرام سلبية، عصية القيح الأزرق)، الرضوض تشكل عاملاً مؤهلاً للإصابة بها، كذلك التناذر الجاف والقطرات الكورتيزونية، العدسات اللاصقة (في هذه الحالة الإصابة تكون غالباً بجراثيم غرام سلبية وخاصة عصيات القيح الأزرق سببياً). المعالجة تكون بواسطة الصادات الحيوية عن الطريق العام أو موضعياً.
- التهابات القرنية الفطرية: تسببها الرضوض، الأجسام الأجنبية، العدسات اللاصقة.
- التهابات القرنية المتحولية (الأميبية): (أكانتاموبا).
- هناك بعض القواعد التي يجب احترامها في حالة الإصابة بالتهاب القرنية: استشارة طبيب عينية من أجل وضع التشخيص (عينة عينية من أجل الفحص الجرثومي، الفحص بالمصباح الشقي)، ومعالجة الإنتان ومراقبته. هناك مضاد استطباب لاستعمال القطرات الكورتيزونية من دون استشارة الأخصائي (وذلك لوجود خطر زيادة القرحة وتسهيل توضع

إنتان إضافي)، استعمال مستحضرات عينية معقمة أو صادات حيوية (للوقاية أو لمعالجة الإنتانات) وقطرات موسعة للحدقة (للوقاية من تشنجات القرنية).

- التهابات القرنية الخلوية: مناعية - تحسسية، تحدث كاختلاط لإنتانات أخرى كالزهري، السل، مرض لايم.

3. التهابات القسم الأمامي للعين:

التهابات القسم الأمامي للعين سواء كانت حادة أو مزمنة، وحيدة أو ثنائية الجانب تتظاهر بعين حمراء (احمرار بشكل خاص حول القرنية)، خوف من الضوء، ونقص في القدرة البصرية. سببها يمكن أن يكون إنتان (حلاً، سل، زهري، لايم، لبيتوسبيريا إلخ...)، أو داء التهابي عام (ساركويد، داء بهجت...) أو سبب مناعي جيني (LAB₂₇، التهاب الفقرات اللاصق، داء كرون، أو فيسينجر - لوروا - ريتز)، ومع ذلك فإن السبب الأكثر شيوعاً يبقى بؤرة إنتانية موضعية (التهاب الجيوب أو إنتان سني). القطرات الموسعة تقي من الالتصاقات القرنية الزجاجية Iridocrystalliniennes. الفحوص المكملّة توجه نحو معرفة السبب.

2. إصابة جزء العين الخلفي

1. التهابات المشيمة والشبكية، التهابات الشبكية:

لا يوجد احمرار في العين ولا ألم. فحص قعر العين يسمح برؤية الآفة. المسببات مختلفة.

- توكسوبلاسموز عيني ولادّي أو مكتسب: التهاب مشيمي: - شبكي هو الأكثر مصادفة، ولمعالجته يعطى السلفاديازين والبيريميتامين، مرافقة أحياناً بالكورتيزونات.
- التهاب الشبكية العائد إلى فيروس الاندخال الخلوي العرطلي: يشاهد عند المريض مثبط المناعة (خاصة المصاب بالسيدا).

- نخر الشبكية العائد إلى فيروس الحلا: يصادف غالباً عند مثبطي المناعة. ومعالجتها إسعافية بالأسيكلوفير داخل الوريد.
- التهابات الشبكية العائدة إلى المبيضات البيض: أنظر فصل (الدمنين على المخدرات) وهي تتطور نحو التهاب العين الشامل.

2. التهاب العين الشامل:

يتظاهر بعين ملتهبة ومؤلمة مع نقص في القدرة البصرية. هذا وإن التهابات العين الشاملة الجرثومية، تكون غالباً تالية لمرض مخترق للعين أو لجراحة (ساد)، وبشكل أكثر ندرة تعود إلى إنتان داخلي (تجرثم دم). الجراثيم الأكثر مصادفة في حالات التهابات العين الشاملة الحادة هي مكورات غرام ⊕ (المكورات العقدية سببياً، المكورات العنقودية المذهبة...). المعالجة إسعافية، في شعبة خاصة، وهي تشمل معالجة بالصادات الحيوية داخل الوريد وداخل الزجاجي، ويجب اختيار صادات حيوية ذات انتشار عيني جيد (فلووروكينولون، فوسفومييسين، بيبيراسيللين، حمض الفوسيديين). وإذا كان هناك شك بوجود سبب فطري، فيجب إعطاء مضاد فطري (فلوكونازول، أمفوتيريسين B). هذا وإن خزع الزجاجي يمكن أن يكون ضرورياً في بعض الحالات.

3. الإلتهابات حول العينية

1. الظفرات Les Chalasions: مسببها غالباً المكورات العنقودية، المعالجة بالصادات الحيوية الموضعية يجب أن تكمل أحياناً بواسطة الجراحة.
2. التهابات حواف الأجفان Les blépharites: جرثومية أو فطرية (بيتيروسبوروم البيضوية)، تعالج موضعياً (صادات حيوية، مضادات فطرية).
3. التهابات مجرى الدمع: تجمع قيحي في زاوية العين الأنسية، وهي تعالج بالصادات الحيوية عن الطريق العام، مع تفجير للخراج.

4. الالتهاب الخلوي الحجاجي: حالة إسعافية، وتكون تالية لدخول الجرثوم عن طريق الجلد، التهاب الجيوب أو تجرثم الدم. وتختلط أحياناً بخرثرة الجيب الكهفي، مسببها غالباً المكورات العنقودية المذهبة، المكورات العقدية A، المكورات الرئوية، اللاهوائيات. وعند الأطفال الهيموفيلوس أنفلونزا. معالجتها تتم في المشفى بواسطة صاد حيوي قاتل للجرثوم (سيفالوسبورين جيل 3 داخل الوريد + إيميدازول) أو (فلووروكينولون + فوسفوميسين).

جدول 2 - مضادات التهاب ذات استعمال عيني موضعى

(قطرات، مراهم)

مطهرات	من دون مقبضات أو عية: هيكزاميدين، كلورهيكزيدين، بيكلوكسيدين، بود، زنبق، فضة.
	مع مقبضات أو عية: كلورهيكزيدين، بينزودوديسييوم، بورات، زنبق، أزرق الميتلين.
صادات حيوية	مفردة: ريفامبيسين، باسيتراسين، أوكسيتتراسيكلين، أمينوزيد (نيوميسين، جنتاميسين، توبراميسين)، حمض الفوسيديك، فلووروكينولون (سيبروفلوكساسين، أوفلوكساسين، نورفلوكساسين)، كلورامفينيكول. مترافقة: بوليميكسين B + أمينوزيد (نيوميسين، فراميسيتين أو كاناميسين)، بوليميكسين B + باسيتراسين؛ كوليستين + باسيتراسين؛ فراميسيتين + غراميسيد + باسيتراسين.
مضادات فيروسية	أسيكوفير، تريفلوريدين، إيدوكسوريدين، جانتسكلوفير.
* مضاد استطباب مطلق عند الحاملين للحساسات اللاصقة.	

21. الإنتانات العائدة لعصيات غرام السلبية

تضم عصيات غرام السلبية عائلة الجراثيم المعوية، وعصيات غرام السلبية الغير مخمرة. هذه الجراثيم مسؤولة عن التهابات شائعة (العصيات الكولونية، بروتيتوس، كليبسيلا الرئوية) والتهابات نوزوكوميالية بشكل كبير (العصيات الكولونية، كليبسيلا سيبسيا، جراثيم معوية سيبسيا، سيراتيا سيبسيا، بروتيتوس سيبسيا، سيتروباكتير سيبسيا، أسيتوباكتير سيبسيا، بسودوموناس).

1. الإنتانات الشائعة العائدة للجراثيم المعوية

باستثناء السالمونيلا سيبسيا، والشيغيلا سيبسيا، المسببتان لتناذرات زحيرية أو لتجرثم دم (أنظر فصل 2 "تجرثم الدم"، فصل 9 "الإسهالات") فإن الإنتانات الشائعة المسببة من عصيات غرام السلبية تكون مسببة غالباً من قبل العصيات الكولونية، البروتيتوس سيبسيا، والكليبسيلا الرئوية.

1. الإنتانات البولية:

العصيات الكولونية هي الأكثر شيوعاً (80%)، البروتيتوس سيبسيا والكليبسيلا الرئوية تكون أقل مصادفة. غالباً ما تكون العصيات الكولونية مقاومة للأموكسيسيلين (أكثر من 40%) وأيضاً للأموكسيسيلين - حمض الكلافولينيك (أكثر من 30%). الصادات الحوية الأكثر فعالية هي الفلوروكينولون والسيفالوسبورين جيل 3، الاستطبابات تتعلق بالصورة السريرية، والمعالجة بالصادات الحوية تعدل حسب نتائج العزل الجرثومي (أنظر فصل 12 "الإنتانات البولية").

2. الإنتانات الرئوية:

الجراثيم المعوية (وبشكل خاص الكليبسيلا الرئوية) من النادر أن تسبب ذات رئة شائعة (>5%)، وهي تشاهد بشكل خاص عند المرضى الضعفاء (اعتلال القصبات المزمن، المدمنين الكحوليين). ذات الرئة العائدة للكليبسيلا

الرئوية تعطي صورة سريرية شديدة مع تدهور في الحالة العامة، تقشع وسخ أو مدمى، ظل على الصورة الشعاعية وتطور شائع نحو تشكل خراج.

3. الإنتانات السحائية:

عصيات غرام السلبية نادرة جداً كمسبب لالتهابات السحايا البديئة الشائعة، (العصيات الكولونية >5%) عند البالغ، وعند حدوثها تكون تالية لتجرثم الدم، مع وجود فوهة دخول بولية تناسلية أو هضمية. إنها تشاهد غالباً عند الطفل حديث الولادة وعند الشخص المسن.

4. تجرثم الدم:

فوهة الدخول تكون هضمية أو بولية. هذا ولا يوجد أي عرض سريري يسمح بتمييز تجرثم الدم العائد لعصيات غرام السلبية عن تجرثم الدم العائد لجراثيم أخرى، مع العلم أن التجرثم الشديد أو الصدمة الإنتانية يكونان أكثر حدوثاً في حالة عصيات غرام السلبية. أمام كل تجرثم دم عائد إلى الجراثيم المعوية يجب البحث عن فوهة دخول (فحص بول وراسب، إيكو للطرق البولية والصفراوية، استقصاءات هضمية) (جدول 1). ويجب تكثيف المعالجة بالصادات الحيوية حسب نتائج الفحوص الجرثومية (أنظر فصل 2 تجرثم الدم).

جدول 1 - فوهة الدخول في حالة تجرثم الدم الشائع العائد للجراثيم المعوية

الألبوب الهضمي	أورام، Diverticulose colique مرض الركوج القولنجي، ارتفاع الضغط البابي
لثرق البولية	عائق في الطرق البولية، التهاب البروستات، التهاب حويضة وكلية
لثرق الصفراوية	حصاة، التهاب الحويصل الصفراوي

2. الإنتانات الفوقوكومالية العائدة لعصيات غرام السلبية

بما فيها البصولة منقاسية والإسيفيروكالتنير

إن وجود عدة جراثيم في حالة الإنتانات العائدة لعصيات غرام السلبية شائع، لأن هذه الإنتانات تحصل عند المرضى المجري لهم عمل جراحي، والذين قضاوا عدة أيام في قسم العناية المشددة، ومصابين بأمراض مختلفة، بالإضافة إلى كونهم

في المستشفى منذ عدة أيام أو أسابيع. نسبة الوفيات هنا والعائدة للإصابة بعصيات غرام السليبية حوالي 10 - 15%، ولكنها تكون أكثر بكثير في حالة الإصابة بعصيات القبيح الأزرق. العوامل المؤهبة للوفاة هي: العمر < 60 عاماً، حالة المريض السابقة (قصور متعدد الأحشاء، مرض خطير بشكل عام، تجرثم دم)، فترة استشفاء < 21 يوماً، تجرثم دم مثبت، سرطان.

1. تجرثم الدم:

فوهة الدخول غالباً ما تكون بولية أو تناسلية وذلك بالنسبة لعصيات غرام السليبية، والتي هي حسب تسلسل مصادفتها: العصيات الكولونية (أكثر من 60%)، (كليبسيللا، العصيات المعوية، سيرايا سيبسيا)، بروتيوس سيبسيا، أسينيتوباكثير سيبسيا، وبسودوموناس سيبسيا تصادف بشكل أكثر ندرة باستثناء تجرثم الدم العائد إلى إنتان قثطرة بولية وذلك بالنسبة للبسودوموناس.

2. فوهات الدخول وأماكن الإنتان بعصيات غرام السليبية (جدول 2):

البسودوموناس سيبسيا والآسينوباكثير تستعمر العديد من الأماكن في الجسم، هذه الأماكن التي تكون ضعيفة سابقاً أو باتصال مع الوسط الخارجي. وهذا الاستعمار يكون لفترات طويلة، الخصائص الإمرضية تكون في بعض الحالات صعبة التأكيد خاصة إذا كان هناك أنواع متعددة من الجراثيم في المكان المصاب. العصيات المعوية تستعمر الجلد والمخاطية وذلك انطلاقاً من نبيت داخلي، استعمار المواد الأجنبية الموضوعة في الجسم تعود غالباً إلى المكورات المعوية سيبسيا (أحياناً تعود إلى السيرايا سيبسيا).

جدول 2 - خصائص الإنتانات النوزوكوميالية العائدة لعصيات غرام السليبية

الإنتانات		
العوامل المؤهبة للإصابة	جرلحة	أدوات ملوثة (قثطرة، جهاز تنظير، جهاز تنفس اصطناعي)، أفات مزمنة (توسع قصات، حروق...)
	نقص الكريات البيض	نقص الكريات البيض، معالجة بالصادات الحيوية
قثطرة	ميكرو أو متأخر	متأخر (كأسبوع واحد) متأخر جداً (كأسبوعان)
زمن حدوثها	مكان الإنتان	

بولية	+++	++ على قنطرة	++ على قنطرة
تنفسية	+	±	±
رئوية	+	+++ (شخص مسن أو نقص كريات بيض مزمّن)	++
ذات رئة عائدة	+	+++	++
لجهاز التنفس الاصطناعي	+	+++	±
التهاب قصبات	+	+++	±
مزمّن انسدادى	+++	+	+
تجرثم الدم	+++	++	+
التهاب في البطن	+++	++	+
التهاب سحايا تال	+	++	+
لجراحة عصبية	-	جروح مزمّنة، حروق	±
التهاب في منطقة الأذن، أنف، حنجرة (بروتيس سيبسيا)	-	التهاب جيوب عائد للتببيب الأنفي القصبي أو عند ناقصي المناعة، التهاب جيوب متكرر التهاب أنف خبيث (مريض السكري)	-
جلدي	-	طعم (مفصل، ركبة) التهاب الفقرات	±
عظمي مفصلي	التهاب الفقرات	±	±

وهكذا فإن العصيات الزرق (البسودوموناس) تكون مسؤولة عن ذات الرئة الحادة عند أشخاص مصابين بالتهاب قصبات مزمّن (توسع قصبات أو mucovisidose داء الزوجة المخاطية) ومصابين بأفات في التهوية (40%)، وتكون مسؤولة أيضاً عن التهاب بريتوان بعد العمل الجراحي، إنتانات القنطرة للطرق الصفراوية، وإنتانات متكررة على معدات أجنبية: قنطرة بولية أو صفراوية، طعم أو أجهزة عظمية - مفصلية.

الأسينوباكثير سيبسيا إمراضيتها أكثر ندرة، خاصة عند مريض كان قد أجري له عمل جراحي أو تحت جهاز تنفس اصطناعي. في حالة الإنتانات البولية، نوات الرئة، الإنتانات المتوضعة على الجروح، خاصة بعد إقامة طويلة في المشفى (≤15 يوماً).

على العكس من ذلك فإن العصيات المعوية تكون السبب للإنتانات البولية النوزوكوميلية في (≤50%)، أقل من ذلك غالباً في حالات نوات الرئة (10 - 20%)، وإنتان العضو المجرى عليه العمل الجراحي (10%).

العصيات الكولونية تكون شائعة في حال وجود ترفع حروري مع وجود نقص في الكريات البيض.

3. المعالجة الشافية:

1. الأسس:

وحدها المراقبة الدقيقة لمقاومة الجراثيم في كل مشفى أو شعبة، تسمح بتوجيه المعالجة بالصادات الحيوية. هذه المعالجة التي تركز على مرافقة صادين حيويين من الصادات الحيوية التالية: البيتالاكتامين، الأمينوزيد والفلووروكينولون. وحده الإنتان البولي العائد إلى العصيات الكولونية يمكن أن يعالج بصاد حيوي وحيد مناسب وقاتل للجرثوم.

المعالجة بالصادات الحيوية يجب أن تترافق مع:

- معالجة فوهة الدخول ومعالجة الصدمة الإنتانية في حالة وجودها.
- عزل المريض في حال وجود جراثيم متعددة المقاومة (أنظر الوقاية).

جدول 3 - المعالجات حسب آلية المقاومة وأشكال التحسس

لعصيات غرام السلبية على البيتالاكتامين

بيتالاكتامين	بنيسيليناز	بنيسيليناز	بنيسيليناز	بنيسيليناز	بيتالاكتامين
واسعة الطيف	محروّة	حائّة	مقاومة للمنبطات	واسعة الطيف	بيتالاكتامين
R	R	R	R	R	أموكسيسيلين
I-R	R	R	R	S-I	أموكسيسيلين + منبّط
R	R	S	R	R	تيكارسيلين
I-R	R	S	R	S	تيكارسيلين + حمض الكلافولينيك
R	R	S	R	R	بيبيراسيلين
I-R	R	S	R	S	بيبيرتازوباكتام
R	R	R	R	R	سيفالوجيل (1)
					(سيفالوتين)
R	R	R	R	R	سيفالوجيل (2)
					(سيفوروكسيم)
S	R	R	S	R	سيفالوجيل (2)
					(سيفوكسيتين)

R	R	S	S	S	سيفالو جيل (3) (سيفوتاكسيم)
R	S	S	S	S	سيفالو جيل (3) (سيفيبيم)
S	S	S	S	S	إيميبينيم
إيميبينيم	إيميبينيم	إيتيكارسيللين	سيفالو ج1، ج2	أموكسيسيللين	اختيار الصاد الحيوي
سيفاميسين	سيفيبيم	محض ± حمض	ج3 حسب	محض +	
	سيفبيريوم	الكلافولينيك	نمط الجرثوم	كلافولينيك	
		سيفالو ج3	وحدة الإنتان	سيفالو ج3	
			l = ما بين الاثنين	S = حساسة	R = مقاومة

2. اختيار البيتا لاكتامين:

مقاومة عصيات غرام السلبية للبيتا لاكتامين تعود بشكل أساسي لتوليدها للبيتا لاكتاماز (جدول 3)، وبشكل أكثر ندرة لتغير في النفوذية الغشائية. هذا وحسب نوع الجرثوم فإن آليات المقاومة الأكثر مشاهدة هي:

- في حالة الكليبسيللا الرئوية: بنيسيليناز كروموزومية، وبشكل أكثر ندرة بيتا لاكتاماز ذات طيف واسع.

- في حال الجراثيم المعوية سببسيا، سيراسيا سببسيا، السيتروباكتير فرونديي، وبشكل أكثر ندرة جراثيم معوية أخرى: سيفالوسبوريناز مثنوثة (كروموزومية).

- في حالة البسودوموناس أيروجينوزا: يجب إضافة المقاومات الغير أنزيمية. من أجل معالجة إنتان محدد (معروف السبب) فإنه يجب اختيار الصاد الحيوي ذو الخصائص الدوائية الحركية الأفضل (تركيزه داخل الجسم مقابل التركيز المثبط الأصغر). في حال المعالجة الاحتمالية فإنه من الضروري أخذ المقاومة المحلية بعين الاعتبار.

السيفتازديم هو الصاد الحيوي المختار لمعالجة الإنتانات العائدة لعصيات القيق الأزرق، والإيميبينيم من أجل معالجة الإنتانات العائدة للأسيتوباكتير سببسيا. السيفيبيم والسيفبيريوم لهما أهمية في معالجة الإنتانات العائدة للجراثيم المعوية المتعددة المقاومة ولكنها لا تملك أفضلية لمعالجة إنتانات عصيات القيق الأزرق (بسودوموناس أيروجينوزا)؛ إذا كانت هذه العصيات حساسة

على التيكارسيللين، فإن هذا الأخير أو صاد حيوي من زمرة الأوريدوبنيسيللين مستطبان هنا.

هذا وينصح باستعمال البيتاالاكتامين بجرعات يومية مرتفعة، 3 - 6 جرعات/يوم أو حقن مستمر وذلك حسب الدواء المستعمل. الهدف من هذه الطريقة في الإعطاء هو الحصول بشكل دائم على تركيزات عالية > من التركيز المثبط الأصغر.

3. اختيار الأمينوزيد:

أشكال المقاومة الجرثومية متعددة هنا، ويمكن أن تؤدي إلى توليد زمر جرثومية مقاومة لكل أنواع الأمينوزيدات. إن إجراء اختبار التحسس الجرثومي للصادات الحيوية ضروري هنا.

الجنتاميسين هو الصاد الحيوي الأقل كلفة بين الأمينوزيدات. التوبراميسين يعد كصاد حيوي ممتاز مضاد للبسودوموناس أيروجينوزا وقليل الكلفة. الأميكاسين والإيزيباسين يجب أن يحتفظ بها لمعالجة الإنتانات المعروفة السبب، أو للحالات التي المقاومة الجرثومية فيها معروفة بدقة. في حالة الأسينوباكثير سيبسيا، فإن نسبة المقاومة الجرثومية للأمينوزيد يمكن أن تبلغ 50 - 70%. إذا كانت الزمر الجرثومية حساسة فإن إعطاء الأمينوزيد مع صاد حيوي آخر لا مفر منه وذلك من أجل زيادة الفعالية القاتلة للجرثوم.

في حالة الأمينوزيدات التي لها فعالية متعلقة بنسبة تركيزها في الدم. فإن إعطاءها يجب أن يتم بجرعة وحيدة خلال 30 دقيقة. التركيزات المرتفعة (التركيز الأقصى/التركيز المثبط الأصغر < 10) تتوافق عادة مع تطور سريري أفضل ومع توالد أقل للزمر الجرثومية المقاومة. التركيزات الباقية المرتفعة تتطلب مبادعة المسافة ما بين الجرعات وذلك من أجل إنقاص السمية العائدة للأمينوزيد.

4. اختيار الفلوروكينولون:

المقاومة للفلوروكينولون متصالية: السيبروفلوكساسين يحتفظ ببعض الفعالية ضد الزمر الجرثومية المقاومة للبيفلوكساسين. إنه الصاد الحيوي المختار ضد البسودوموناس أيروجينوزا.

في حالة الأسينوباكثير سيبسيا، فإن المقاومة للفلوروكينولون تتجاوز الـ 50%.

5. الجرعات عند البالغ:

- تيكارسيلين: 15 غ/يوم موزعة على 3 جرعات.
- بيبيراسيلين: 12 غ/يوم موزعة على 3 جرعات.
- سيفيفيم: 4 - 6 غ/يوم موزعة على جرعتين.
- سيفيروم: 4 غ/يوم موزعة على جرعتين.
- سيفتازيديم: 6 غ/يوم (أحياناً 9 غ/يوم = Mucovisidose داء الزوجة المخاطية) موزعة على 3 جرعات، بالنسبة للبعض: حقن مستمر.
- إيميبينيم: 500 مغ كل 4 ساعات أو 1 غ كل 8 ساعات.
- أميكاسين وإيزيباميسين: 15 - 20 مغ/كغ/يوم جرعة وحيدة.
- سيبروفلوكساسين: 400 مغ كل 8 - 12 ساعة.

4. الوقاية:

• من الانتشار:

- هناك عدة إجراءات يجب اتخاذها عند المريض المصاب أو الحامل للجراثيم المعوية، للبسودوموناس أيروجينوزا أو للأسينوباكثير المتعددة المقاومة:
- عزل المريض (المكان والوسائل التقنية).
- الزيادة من الاهتمام بالإجراءات الصحية (بصورة خاصة غسل الأيدي).
- سحب الأدوات الطبية الملوثة.
- عدم اللجوء إلى المعالجة بالصادات الحيوية الخاصة بهذه الجراثيم (غير فعالة بصورة عامة، وهي تزيد من خطورة ظهور مقاومة جديدة إلا في حالة الإنتانات المثبتة).
- مراقبة سريرية جيدة وذلك للبحث عن علامات إنتانية.

• من ظهور المقاومة:

- تظهر المقاومة الجرثومية عند استعمال المعالجات الغير مستطبة (في حال وجود تلوث) أو المعالجات ذات الجرعات غير الكافية، أو الطويلة المدة، والغير مترافقة بمعالجة لفوهات الدخول أو لبؤر التوضع الثانوية.

22. الإنتانات الشديدة العائدة للمكورات العنقودية

تعد الإنتانات شديدة وذلك:

- حسب حالة الشخص المصاب: ناقص المناعة، أمراض مسبقة.
 - حسب توضع الإصابة: عظم، شغاف القلب، الدماغ، للرئة.
 - حسب العلامات السريرية: أنظر فصل 3.
- مضادات المكورات العنقودية هي البنيسيلينات M والجليكوببتيدات (جدول 1). هذا وهناك صادرات حيوية أخرى تستعمل (جدول 2) وذلك لفعاليتها على الجرثوم، لانتشارها في النسج، أو لإمكانية إعطائها عن طريق الفم. الصاد الحيوي نو الخيار الأول (جدول 3) والذي هو غالباً احتمالي ويعطى وريدياً، يختار حسب:
- مصدر الإنتان: شائع (مكورات عنقودية حساسة على الميتيسيلين غالباً) أو نوزوكوميالي (مكورات عنقودية حساسة على الميتيسيلين أو مقاومة له وذلك حسب مكان مصدر الإنتان في المشفى، والقصة السريرية للإصابة به).
 - توضع الإنتان.
 - وجود تحسس على البيتالاكتامين أو عدمه.

إن أغلبية المكورات العنقودية (90%) مقاومة للبنيسيلين G أو A وذلك بإفرازها للبنيسيليناز. الزمر المقاومة للميتيسيلين هي دائماً مقاومة للبيتالاكتامين، وغالباً مقاومة للفلووروكينولون، للماكروليدات وللسولفاميدات. أما فيما يتعلق بالأمينوزيد، فإن أغلبية الزمر المقاومة للميتيسيلين (60 - 80%) أصبحت من جديد حساسة على الجنتاميسين أو النيتيلميسين. هذا وإن ظهور زمر مقاومة أو أقل حساسية على الغليكوببتيد (التركيز المثبط الأصغر < 4 مغ)، يتطلب على الأقل في حالة الإنتانات الشديدة، قياس التركيز المثبط الأصغر بالفانكوميسين والتيكلوكلانين وذلك للزمر الجرثومية المعزولة. تكيف المعالجة مع اختبار التحسس الجرثومي للصادات الحيوية ضروري: في حال حساسية الجرثوم على الميتيسيلين، فإنه يجب المحافظة على أو اللجوء إلى البنيسيلين M. في حال وجود إنتان لأدوات طبية أجنبية

في الجسم فإن الريفامبيسين، مرافق مع صاد حيوي آخر، يكون مفيداً. الفلوروكينولون، الريفامبيسين، حمض الفوسيديك والفوسفوميسين يجب أن تستعمل دائماً بالتشارك مع صاد حيوي آخر وذلك لوجود خطر مرتفع لتولد سلالات مقاومة.

استعمال الكينوبريستين - دالفوبريستين (ستريبتوغرامين A و B) ولينوزيليد (أوكسازوليدين) لا يمكن أن يعطى إلا بعد استشارة أخصائية. اختبار التحسس الجرثومي للصاد الحيوي يجب أن يترافق مع استئصال البؤرة الأولية (قنطرة داخل الوعاء مثلاً)، وفعالية المعالجة يجب أن تختبر بإجراء زرع الدم بعد 48 - 72 ساعة من المعالجة.

مدة المعالجة بالصادات الحيوية تقريبية: 14 يوماً في حالة تجرثم الدم مع عدم وجود بؤرة توضع ثانوية عند مريض ليس عنده نقص مناعة؛ 30 يوماً في حالات تجرثم الدم الأخرى وفي حالة التهاب السحايا، 4 - 6 أسابيع في حالة التهابات شغاف القلب الإنتانية، عدة أسابيع أو أشهر في حالات الإنتانات العظمية - المفصليّة، وذلك حسب موضعها وحسب وجود أدوات أجنبية أو عدمه، وحسب خصائص الإنتان حاد أو مزمن.

جدول 1 - مضادات المكورات العنقودية الأساسية

(في حال كون الوظيفة الكلوية طبيعية)

الصاد الحيوي	طريق الإعطاء	الجرعة/24 ساعة عند البالغ	الجرعة/24 ساعة عند الطفل
بنيسيلين M	داخل الوريد، داخل العضل	150 - 100 مغ/كغ	100 - 50 مغ/كغ
أوكساسيلين، كلوكساسيلين	عبر الفم ⁽¹⁾	150 - 100 مغ/كغ	50 - 35 مغ/كغ
غليكوبيبتيد			
فانكوميسين ⁽³⁾⁽²⁾	داخل الوريد	60 - 30 مغ/كغ	45 - 40 مغ/كغ
تيكولانين ⁽⁴⁾	داخل الوريد، داخل العضل	6 مغ/كغ	10 مغ/كغ ⁽⁵⁾

- (1) فقط في حالة متابعة المعالجة داخل الوريد أو العضل في بعض حالات الإنتانات الشديدة.
- (2) التركيزات الدموية يجب أن تكون ما بين 30 - 40 مغ/ل والدواء يعطى بواسطة حقن مستمر.
- (3) 2 - 4 حقن/يوم، أو حقن مستمر ولكن بعد إعطاء جرعة هجومية (15 مغ/كغ).
- (4) جرعة هجومية: 6 مغ/كغ/12 ساعة ومن ثم 6 مغ/كغ مرة واحدة/يوم، معلة في حالة الضرورة وذلك حتى التوصل إلى تركيز باق ما بين 20 - 30 مغ/ل.
- (5) طفل عمره < شهر واحد.

الفصل 22: الإنتانات الشديدة العائدة للمكورات العنقودية 173

جدول 2 - مضادات أخرى للمكورات العنقودية (في حال كون الوظيفة الكلوية طبيعية)

الصاد الحيوي	طريق الإعطاء	الجرعة/24 ساعة للبالغ	الجرعة/24 ساعة للطفل
السيفالوسبورينات			
سيفالوتين، سيفازولين سيفاماندول	داخل الوريد، داخل العضل	4 - 8 غ	100 - 150 مغ/كغ
سيفاتوكسيم ⁽¹⁾ الأمينوزيدات	داخل الوريد	150 - 200 مغ/كغ	150 - 200 مغ/كغ
جنتاميسين	داخل الوريد، داخل العضل	3 - 4 مغ/كغ	3 مغ/كغ
نيتيلميسين	داخل الوريد، داخل العضل	4 - 6 مغ/كغ	6 - 7.5 مغ/كغ
الفلووروكينولون			
بيفلوكساسين	داخل الوريد، فموي	0.8 غ	مضاد استطباب
أوفلوكساسين	داخل الوريد، فموي	0.4 - 0.6 غ	مضاد استطباب
سبيروفلوكساسين	داخل الوريد	0.4 - 1.2 غ	مضاد استطباب
مستريبتوغرامين	فموي	1 - 1.5 غ	مضاد استطباب
بريستناميسين كينبريستين + دالفوبريستين	فموي داخل الوريد	3 غ 22.5 مغ/كغ	50 - 100 مغ/كغ -
لينكوزاميد كلينداميسين	داخل الوريد، داخل العضل	1.2 - 2.4 غ	15 - 400 مغ/كغ
لينكوميسين	فموي داخل الوريد، داخل العضل	1.2 - 2.4 غ 1.2 - 1.8 غ	8 - 25 مغ/كغ 10 - 20 مغ/كغ
صادات حيوية أخرى	فموي	1.5 - 2 غ	30 - 60 مغ/كغ
ريفامبين	داخل الوريد، فموي	20 - 30 مغ/كغ	20 - 30 مغ/كغ
فوسفوميسين	داخل الوريد	200 مغ/كغ	200 مغ/كغ
حمض الفوسيديك	داخل الوريد، فموي	1.5 غ	20 - 40 مغ/كغ
كوتريموكسازول	داخل الوريد، فموي	320 - 1280 مغ + 1600 - 6400 مغ SMZ	TMP: 16 مغ/كغ SMZ: 80 مغ/كغ
لينيزوليد ⁽²⁾	داخل الوريد، فموي	1200 مغ	

- (1) يرافق مع الفوسفوميسين في حال كون الجرثوم حساس لهذا الأخير.
(2) مستطب في حالات ذات الرئة أو الإنتانات الجلدية وإنتانات الأنسجة الرخوة.

جدول 3 - معالجة الإنتانات العائدة

إلى المكورات العنقودية الحساسة على الميثيسيلين

الإنتان	المعالجة عن طريق الوريد	المعالجة الوريدية
تجرثم الدم، التهاب النسج		
● عدم وجود علامات خطيرة	بنيسيلين M	سيفالو جيل (1)، أموكسيسيلين + حمض الكلافولينيك
● وجود علامات خطيرة	بنيسيلين M + أمينوزيد	سيفالو جيل (1) + أمينوزيد، فلوروكينولون + ريفامبيسين أو أمينوزيد أو حمض الفوسيديك ⁽⁹⁾ سيفوتاكسيم + فوسفوميسين ⁽⁹⁾
التهاب شغاف القلب		
● الدسام الأصلي	بنيسيلين M + أمينوزيد	سيفالو جيل (2) + أمينوزيد ⁽²⁾ أو فلوروكينولون + (أمينوزيد ⁽²⁾ أو ريفامبيسين ⁽¹²⁾) أو فانكوميسين ± ريفامبيسين
● طعم نسامي	بنيسيلين M + أمينوزيد ⁽³⁾	أمينوزيد أو فانكوميسين ± أمينوزيد ± ريفامبيسين
التهاب السحايا		
سيفوتاكسيم + فوسفوميسين	بيفلوكساسين ⁽¹¹⁾ + (ريفامبيسين أو فوسفوميسين)	بنيسيلين M أو سيفالو جيل (2) + (أمينوزيد ⁽⁴⁾ أو ريفامبيسين)، أو حمض الفوسيديك + (فلوروكينولون أو ريفامبيسين)
إنتان العظم والمفصل الحاد		
فلوروكينولون + ريفامبيسين	بنيسيلين M أو سيفالو جيل (2) + (أمينوزيد ⁽⁴⁾ أو ريفامبيسين)، أو حمض الفوسيديك + (فلوروكينولون أو ريفامبيسين)	

جدول 4 - معالجة الإنتانات العائدة

إلى المكورات العنقودية المقاومة للبنيسيلين

المعالجة المرجعية: غليكوبيبتيد ⁽¹²⁾ أو صاد حيوي واحد أو اثنان بديان (استنادا إلى اختبار التحسس الجرثومي للصاد الحيوي، ومكان الإنتان، والوبائية).	
تجرثم الدم البطني: غليكوبيبتيد ⁽¹²⁾ + صادات حيوية أخرى ⁽⁶⁾ كبديل: سيفوتاكسيم + فوسفوميسين ⁽⁹⁾ .	
في حال وجود قنطرة بولية فإنه يجب سحبها إجبارياً.	
إصابة الجنب والرنه: غليكوبيبتيد ⁽¹²⁾ + صادات أخرى ⁽⁶⁾ . كبديل: سيفوتاكسيم + فوسفوميسين ⁽⁹⁾ أو لينيزوليد.	
التهاب شغاف القلب الإنتاني:	
● على الدسام الأصلي: غليكوبيبتيد ⁽¹²⁾ (4 - 6 أسابيع) + صادات أخرى من ضمنها الأمينوزيد ⁽²⁾ ، ريفامبيسين أو فلوروكينولون أو فوسفوميسين أو حمض الفوسيديك (4 - 6 أسابيع).	
● على طعم نسامي: غليكوبيبتيد ⁽¹²⁾ (6 أسابيع) + صادات حيوية أخرى ⁽⁶⁾ ؛ من المفضل، إذا كان الجرثوم حساس عليها، الأمينوزيد ⁽³⁾ (15 يوما) والريفامبيسين (6 أسابيع). الجراحة يجب مناقشتها منذ البدء.	

التهاب السحايا:

فانكوميسين⁽⁷⁾ + صادات حيوية أخرى⁽⁸⁾. كبديل: سيفوتاكسيم + فوسفوميسين⁽⁹⁾

إبتان عظمي مفصلي:

غليكوبيبتيد⁽¹³⁾ + صاد حيوي وحيد أو في حال وجود مواد أجنبية، صادان حيويان. من المفضل فيما بينها استعمال الريفامبيسين، الفلوروكينولون، حمض الفوسيديك. كبديل أو لمتابعة المعالجة (في المنزل): صادان حيويان من بينهما تيكوبلانتين⁽¹⁰⁾، ريفامبيسين، حمض الفوسيديك، فلوروكينولون، كوتريموكسازول، بريستيناميسين في حال كون الجرثوم حساس على الإريثروميسين.

1. باستثناء الفلوروكينولون والريفامبيسين التي يمكن أن توصف منذ البدء عبر الفم.
2. جنتاميسين أو نيتيلميسين خلال الـ 5 - 7 أيام الأولى.
3. جنتاميسين أو نيتيلميسين خلال الـ 15 يوم الأولى.
4. في مرحلة تجرثم الدم البنية.
5. من بين الأمينوزيدات (جنتاميسين، أو نيتيلميسين)، حمض الفوسيديك، كوتريموكسازول، فوسفوميسين، ريفامبيسين - في حال المقاومة الجرثومية - أو عدم تحمل الغليكوبيبتيد: مرافقتها 2/2.
6. تكيف المعالجة حسب البيئة، ومن ثم حسب اختبار التحسس الجرثومي للصاد الحيوي.
7. الجرعة 40 مغ/كغ/يوم (غير مسموح بها رسمياً بعد).
8. ريفامبيسين، كوتريموكسازول، فلوروكينولون، فوسفوميسين.
9. مرافقة سيفوتاكسيم - فوسفوميسين لا يمكن استعمالها إلا في حال كون الجرثوم حساس على الفوسفوميسين.
10. بعد قياس التركيز المثبط الأصغر للفانكوميسين والتيكوبلانتين.
11. زيادة الجرعة حتى 800 مغ/12 ساعة.
12. حساسية غير ثابتة للمكورات العنقودية ذات الكواغولاز السلبي بالنسبة للتيكوبلانتين.
13. بعد استشارة أخصائي.

23. الإنتانات الشديدة العائدة للمكورات العقدية

والمكورات المعوية

ما نعينه هنا بالإنتانات الشديدة هي التهابات شغاف القلب، الإنتانات العصبية السحائية (التهاب السحايا والخراج الدماغي)، وتجثرات الدم المترافقة بإنتان جلدي، تناسلي، داخل البطن أو عظمي مفصلي. هذا وتوجد علاقة ما بين الجرثوم المسبب وتوضع الإنتان وفوهة الدخول (جدول 1). اختيار المعالجة بالصادات الحيوية تختلف حسب الجرثوم المسبب، هل هو مكورات رئوية، مكورات عقدية غير المكورات الرئوية، أو مكورات معوية، وهي تتطلب معرفة التركيز المثبط الأصغر للبنيسيللين G و A، ومعرفة الزمرة في حال استعمال السيفوتاكسيم (مكورات عقدية، مكورات رئوية) أو الغليكوبيبتيد. هذا وتوجد عادة مقاومة طبيعية ضعيفة للأمينوزيد. بالنسبة للمكورات المعوية فإنه يجب البحث عن مقاومة عالية المستوى على الأمينوزيدات وذلك لأن هذه المقاومة العالية تلغي التعاضد مع البنيسيلينات (وربما أيضاً مع الغليكوبيبتيدات). اختيار المعالجة والجرع تتعلق إذن بالتوضع وبمستوى الحساسية (جدول 2 حتى جدول 4). المعالجة المرجعية تركز على البنيسيللين G أو A، أحياناً مترافقة مع أمينوزيد، جنتاميسين أو نيتيلميسين، وذلك للحصول على فعالية متعاضدة مماثلة للجرثوم في حال وجود مستوى مقاومة منخفض للأمينوزيدات. في حال وجود حساسية أقل بالنسبة للبنيسيللين (مكورات رئوية وبعض المكورات العقدية)، فإنه من الضروري اللجوء إلى جرعات مرتفعة من البنيسيللين \pm أمينوزيد (في حال وجود مستوى مقاومة منخفض) أو إلى غليكوبيبتيد \pm أمينوزيد (في حال وجود مستوى مقاومة منخفض) أو إلى سيفوتاكسيم (مكورات رئوية). في حال وجود تحسُّس على البنيسيلينات، أو في حالة إرادة تبسيط المعالجة فإن الخيار يتجه نحو السيفترياكسون أو السيفوتاكسيم (مكورات عقدية، مكورات رئوية)، أو

التيكوبلانتين (مكورات معوية). الظهور الحديث لزمر من المكورات المعوية مقاومة للجليكوبيبتيدات (أنظر الملاحظة في الجدول 4) قاد إلى اقتراح الكينوبريستين/دالفوبريستين، اللينيزوليد أو بعض التترافقات الدوائية.

هناك صادات حيوية غير فعالة: الأمينوزيدات مستعملة لوحدها (مستوى مقاومة منخفض)، السيفالوسبورين جيل 3 والفلوروكينولونات (مكورات معوية)، اللينكوزاميدات، والكينوبريستين/دالفوبريستين (إيشيريشيا فيكالييس "الغائطية").

تستند معالجة الإنتانات الحادة العائدة إلى المكورات المعوية على معالجة التهاب شغاف القلب، مدة المعالجة يمكن أن تختصر إلى أسبوعين في حالة تجرثم الدم من دون وجود التهاب شغاف القلب وفي حال غياب توضعات ثانوية. في حالة الإنتانات داخل البطن فإن الأوريدونيسيلاين والإيميبينيم، الفعالة على المكورات المعوية، يمكن أن تستعمل مع العلم أن هذه الإنتانات تعود في بعض الحالات لعدة جراثيم في وقت واحد.

تتعلق مدة معالجة الإنتانات العائدة للمكورات العقدية - باستثناء المكورات المعوية - بمكان الإنتان، بالجراثيم المسبب، وبتحسنه: أسبوعان في حالة تجرثم الدم من دون وجود توضع ثانوي، 10 أيام (مكورات رئوية) إلى 14 يوماً (مكورات عقدية B) في حالة التهاب السحايا، 4 أسابيع في حال التهاب شغاف قلب إنتاني على طعم أو عائد إلى مكورات معوية، 6 أسابيع أو أكثر للخراجات (دماغية، كبدية...) ولتوضعات عظمية مفصلية، أو في حالة جراثيم ذو حساسية منخفضة بشكل غير طبيعي.

جدول 1 - التظاهرات الشديدة الأساسية وفوهة الدخول

حسب نوع المكورات العقدية أو المكورات المعوية

الجراثيم	التظاهرات الشديدة الأساسية	بؤية الدخول
مكورات عقدية A	● إنتان خلوي وإنتان للفاقة	● الجلد
	● النخري	● أنف، بلعوم
	● حمى نقاسية	
	● حمرة	
مكورات عقدية B (مكورات)	● تجرثم دم و التهاب سحايا عند	● الأنبوب الهضمي

عقدية B آغالاكتيل)	حديثي الولادة	
	● حمرة	
مكورات عقدية غير قابلة	● التهاب شغاف القلب	● فموي بعومي
للتصنيف (فيريدانس) مثل	● التهاب الجنب والرئة	
مكورات عقدية متلاصقة،	● خراج دماغي	
ميتيس، فجوية، نموية، موتانس		
مكورات رئوية	● ذات رئة	● أنف، بلعوم، حنجرة
	● التهاب سحايا	● ثغرة سحائية
مكورات معوية	● التهاب شغاف القلب	● الأكتيوب الهضمي
	● إنتانات بولية، تناسلية،	● بولية
	صفراوية بطنية	

جدول 2 - معالجة الإنتانات الحادة العائدة إلى المكورات الرئوية

الإنتان	الخيار العلاجي الأول	الجرعات
ذات رئة	أموكسيسيلين أو سيفترياكسون	50 مغ/كغ داخل الوريد أو فموي 1 غ/يوم، داخل الوريد
التهاب السحايا	(سيفوتاكسيم أو	200 - 300 مغ/كغ/يوم داخل الوريد
● قبل معرفة التركيز المثبط الأصفر	سيفترياكسون) ±	70 - 100 مغ/كغ/يوم داخل الوريد
	فانكوميسين**]	40 - 60 مغ/كغ/يوم حقن مستمر
● التركيز المثبط الأصفر	أموكسيسيلين	200 مغ/كغ/يوم داخل الوريد
● للأموكسيسيلين ≥ 0.5 مغ/ل	سيفوتاكسيم أو سيفترياكسون	نفس الجرعة
● التركيز المثبط الأصفر	سيفوتاكسيم أو سيفترياكسون +	نفس الجرعة
● للأموكسيسيلين < 0.5 مغ/ل	فانكوميسين	
والتكرز المثبط الأصفر		
● للسيفوتاكسيم > 0.5 مغ/ل		
● التركيز المثبط الأصفر		
● للسيفوتاكسيم ≤ 0.5 مغ/ل		
والتكرز المثبط الأصفر		
● للأموكسيسيلين < 0.5 مغ/ل		

* مهما كان التركيز المثبط الأصفر في حال كونه > 4 مغ/ل.
** في حال الشك بحساسية منخفضة على البنيسيلين.

جدول 3 - معالجة الإلتانات الحادة العائدة إلى المكورات العقدية
(باستثناء المكورات الرئوية والمعوية)

الجرثوم	الخيار العلاجي الأول	الجرعة	الخيار العلاجي الثاني
المكورات العقدية A	بنيسيللين G	100000	غليكوبيبتيد أو كلينداميسين
	+ مداخلة جراحية في حال وجود التهاب خلوي أو لفاقي	حتى 500000 وحدة/كغ/يوم	سيفوتاكسيم أو سيفترياكسون أو غليكوبيبتيد
المكورات العقدية B	أموكسيسيللين + جنتاميسين	200 مغ/كغ/يوم 1.5 - 2 مغ/كغ/12 ساعة	
المكورات العقدية الغير قابلة للتصنيف زمرة ميليري أو مكورات عقدية غالولبتيكوس			
• تركيز مثبت أصفر للبنيسيللين $G < 0.5$	إينيسيللين G	300000 - 200000	[(سيفترياكسون 2 غ/يوم وردياً أو سيفوتاكسيم 200 مغ/كغ/يوم ***] ± جنتاميسين** أو [كلينداميسين***]
• تركيز مثبت أصفر للبنيسيللين $G \leq 0.5$	سيفالوسبورين المكورات المعوية	وحدة/كغ/يوم ± جنتاميسين 1.5 - 2 مغ/كغ/12 ساعة]	الجرعة الخاصة به غليكوبيبتيد

* حسب خطورة الإلتان (حمرة أو التهاب لغافة نخري).
** إذا كان التركيز المثبط الأصفر للبنيسيللين $G < 0.1$.
*** باستثناء التهاب شغاف القلب خراج دماغي، إلخ...

جدول 4 - معالجة الإلتانات الشديدة العائدة للمكورات المعوية

الجرثوم	الخيار العلاجي الأول	الجرعة	الخيار العلاجي الثاني
مستوى مقاومة منخفض على الجنتاميسين	[(بنيسيللين G أو أموكسيسيللين)	20 - 40 مليون وحدة/يوم (وردياً ****) 200 مغ/كغ/يوم (وردياً)	[(فانكوميسين أو تيكوبلانتين)
	+ (جنتاميسين أو نيتيلميسين)	2 - 3 مغ/كغ/12 ساعة، وردي 3 - 4 مغ/كغ/12 ساعة وردي	+ (جنتاميسين أو نيتيلميسين)
مستوى مقاومة مرتفع على الجنتاميسين	إينيسيللين G	20 - 40 مليون وحدة/يوم (وردياً ****) 300 - 200 مغ/كغ/يوم (وردياً)	فانكو أو تيكو

إيشيريشيا فاسيوم	[إنيميسلين G	20 - 40 مليون وحدة/يوم (وريد ****)	[فانكو أو تيكو]
	+ جنتاميسين]	2 - 3 مغ/كغ/12 ساعة (وريد)	+ جنتاميسين]
مكورات معوية مقاومة للفانكوميسين**			
● فينوتيب فانكو A	[أموكسيسيللين	200 - 300 مغ/كغ/يوم (وريد)	
	± جنتاميسين]	2 - 3 مغ/كغ/12 ساعة (وريد)	(أ) كينبريستين/والفوريسيتين***
● فينوتيب فانكو B	[تيكوبلادين	400 مغ/يوم، بعد جرعة هجومية	(ب) لينيزوليد
	+ جنتاميسين]	2 - 3 مغ/كغ/12 ساعة (وريد)	(ج) بنيسيللين + فانكو + جنتا

- الإيشيريشيا فاسيوم مقاومة لكل الأمينوزيدات باستثناء الجنتاميسين والستربتوميسين.
- ** معالجة غير ثابتة، يجب اللجوء إلى اختبارات مرافقة للصادات الحيوية داخل الزجاج.
- *** فقط في حال الإيشيريشيا فاسيوم لأنها غير فعالة في حالة الإيشيريشيا فاسياليوس.
- **** حقن مستمر.

ملاحظة: الفينوتيبات فانكو A وفانكو B تعرف بـ:

- فانكو A = مقاومة للفانكو ومقاومة للتيكو.
- فانكو B = مقاومة للفانكو وحساسة للتيكو.

24. داء السل

عصية كوخ عبارة عن جرثومة ذات تكاثر داخل خلوي. إنتان أولي بدئي عرضي أو لا، أو إنتان متبوع بفترة كمون، عودة التظاهر المتأخر من الممكن حدوثها دائماً. الإنذار يتعلق ببدء المعالجة المبكر ومتابعتها الجيدة. مرافقة عدة صادات حيوية ضروري وذلك لتجنب أجيال مقاومة.

1. الأدوية المضادة للسل

1. الأدوية المضادة للسل الأساسية:

الأثر الجانبي	الجرعة: مغ/كغ/يوم	الفعالية	الأدوية
طفل	بالغ		
Algodystrophie، اضطرابات نفسية، فقد وزن، التهاب الأعصاب، التهاب الكبد	10	3 - 5 عن طريق الفم، للعصل، للوريد	INH إيزونيازيد (ريمفون)
تكوين المقرزات، غثيان، إقياءات، التهاب للكبد، انحلال الدم، نقص الصفائح، تحسس، تداخل في مفعول الأدوية	15	10 عن طريق الفم، الوريد	ريفامبين (ريفالين، ريملكتان)
سمية كبدية متوسطة، بالجرعة، سمية عينية، حمة، غثيان، إقياءات، ارتفاع حمض البول، أوجاع مفاصل	20 (الحد الأعلى 30)	20 (عن طريق الفم)	بيرازيناميد (بيريلين)
التهاب العصب البصري، خلف البصري، غثيان، إقياءات، صداع، نوار	25 - 30	10 - 20 عن طريق الفم، للعصل، للوريد	إيثامبوتول (ديسكامبوتول) ميامبوتول

* طفل عمره > 7 سنوات.

2. الأدوية الأخرى المضادة للسل:

الستربتومييسين، الأميكاسين، الفلووروكينولون (أوفلوكسوسين، سيبروفلوكساسين، ليفوفلوكساسين، فوكسيفلوكساسين) أو الريفامبتين تستعمل في الأشكال المتعددة المقاومة أو في حال عدم تحمل لمضادات السل الأساسية. الأدوية الأخرى (كلوفازيمين، إيتيوناميد، PAS، سيكلوسيرين، كابريوميسين) تستعمل بشكل استثنائي (سل متعدد المقاومة).

3. مرافقات دوائية:

ريفاتير (الحبة الواحدة تحوي ريفامبيسين 120 مغ + INH 50 مغ + بيرازيناميد 300 مغ). الجرعة حسب الوزن.
ريفينا حبة واحدة/30 كغ/يوم (الحبة الواحدة تحوي: ريفامبيسين 300 مغ + INH 150 مغ). الجرعة حسب الوزن.

2. الأشكال العلاجية

1. السل الفعال:

إعطاء جرعة واحدة يومياً، إيزونيازيد + ريفامبيسين مترافقة خلال الشهرين الأولين بالبيرازيناميد، وفي حال الشك بوجود مقاومة أو نكس أو إصابة عصبية سحائية أو عظمية ترافق بالإيتامبوتول. في حالة الإنتان بالـ VIH يجب المعالجة بمثبطات البروتياز، الريفامبيسين يجب أن يبدل بالريفامبتين. تكييف الجرعة يتطلب استشارة أخصائية.
مدة المعالجة هي:

- 6 أشهر في حالة السل الرئوي.
- 6 - 9 أشهر في حالة إصابة العقد اللمفاوية أو في حالة التثبيط المناعي.
- 6 - 9 أشهر في حالة الإصابة البولية التناسلية.
- 9 أشهر في حالة عدم استعمال البيرازيناميد (أو إيقافه قبل نهاية الشهر الثاني).
- 12 شهراً في حالة الإصابة العصبية السحائية العظمية.

2. الإلتان البدني أو الإلتان الكامن:

يعالج بالـ INH خلال 6 أشهر + ريفامبيسين خلال 3 أشهر، أو ريفامبيسين + بيرازيناميد خلال شهرين.

3. السل المقاوم:

يتطلب عزلاً صارماً للمرضى في المشفى، معالجة طويلة (≤ 18 شهراً) حاوية على الأقل 3 مضادات سل فعالة (واحداً منها يجب أن يكون فلورووكينولون فعال على عصيات كوخ) مختارة حسب اختبار التحسس الجرثومي للصادات الحيوية.

3. مراقبة المعالجة

1. مراقبة الفعالية:

- سريريّاً: حمى، علامات عامة وموضعية (سعال). صورة صدر شعاعية خلال الشهر 1، 2، 4، 6، 9، 12.
- جرثومياً: إذا بقي الزرع إيجابياً بعد الشهر الثاني، يجب الشك بمتابعة سيئة للمعالجة أو بوجود مقاومة.

2. مراقبة تحمل المعالجة: سريريّاً ومخبرياً:

- قبل البدء بالمعالجة: ترانس أميناز، كرياتينين الدم (تكييف العلاج حسب الكرياتينين ضروري)، البولة، فحص عيني مع فحص قعر العين ورؤية الألوان (في حال استعمال الإيتامبوتول).
- خلال المعالجة: ترانس أميناز في اليوم 7، يوم 14 ومن ثم كل 15 يوماً خلال الشهرين الأولين، ومن ثم في حال وجود شواذات أو استمرار استعمال البيرازيناميد: الساحة البصرية ورؤية الألوان كل شهر في حال استعمال الإيتامبوتول.

- كيفية التصرف في حال ارتفاع الترانس أميناز:
 - في حال ارتفاعها < 3 أضعاف القيمة الطبيعية: يجب إيقاف البيرازيناميد (بشكل نهائي في حال الارتفاع < 6 أضعاف) والـ INH. في حال عودة القيمة إلى الطبيعي يجب إعادة إدخال الـ INH فقط، وبجرعة أقل مع مراقبة متقاربة للترانس أميناز. عودة استعمال البيرازيناميد، بجرعة أقل، غير مسموح به إلا إذا كان ارتفاع الترانس أميناز > 6 أضعاف القيمة الطبيعية، وتحت مراقبة صارمة للوظيفة الكبدية وفي المشفى.
 - في حال ارتفاعها > 3 أضعاف القيمة الطبيعية: يجب إنقاص جرعات البيرازيناميد والـ INH، ومراقبة متقاربة للترانس أميناز.
 - في حال وجود سمية عينية للإيتامبوتول: يجب إيقافه.
- يعرض الريفامبيسين للخطورة التالية:
 - تحسس يفرض مراقبة خاصة في حالة إعادة استعماله.
 - تدخل في التفاعلات الدوائية (يجب تكيف جرعة مضادات التخثر الفموية، والسيكلوسبورين، مضاد استطباب في حالة معالجة مرافقة لمثبطات البروتياز).
 - تثبيط مضادات الحمل الفموية (يجب استعمال مضادات حمل مناسبة).
 - تلوين غير قابل للزوال للعدسات اللاصقة اللينة.
- يجب عدم استعمال معالجة بصاد حيوي مضاد للسل وحيد.

3. مراقبة التقيد بالمعالجة: هامة جداً:

- سريريًا: الاستجواب، تشجيع المريض على متابعة العلاج، تلون أحمر للبول (ريفامبيسين).
- أحيانًا اللجوء إلى فحوص مخبرية: معايرة الـ INH، فرط حمض البول (تصادف في 80% من الحالات) وتشير إلى أخذ منتظم للبيرازيناميد.

4. إجراءات مرافقة:

- إعلام السلطات المختصة بوجود إصابة بالسل إجباري، هذا المرض يعالج

مجاناً (تأمين صحي 100%).

- عزل المريض في غرفة خاصة خلال 15 يوم الأولى لبداية المعالجة، إذا كان فحص الدم إيجابياً.
- البحث عن وجود المرض عند الأشخاص المحتكين بالمريض ومتابعتهم.
- البحث الروتيني عن وجود إنتان بالـ VIH (سل + VIH = سيدا).

5. الوقاية من السل في أماكن العناية:

تستند على مبدئين:

1". الكشف والمعالجة المبكرة لمرض السل.

2". تجنب انتقال العدوى الهوائي:

عدوى مرض السل تتناسب مع عدد الجراثيم المزفورة في الهواء وهي

تتعلق:

- بمكان الإنتان (رئوي، حنجري).
- بوجود سعال أو أشياء تزيد من إمكانية حصول العدوى (نقشع، Aérosols ضبوب للبنتاميدين، تنظير قصبات...)، وهكذا فإنه يجب تجنب - في حدود الإمكان - في المرحلة البدئية (العلاج الفيزيائي التنفسي مثلاً).
- بوجود BAAR في النقشع، بواسطة الفحص المباشر.
- باستطاعة المريض تغطية فمه أثناء السعال.
- بوجود انفتاح في الكهف السلي.
- بمدة المعالجة السابقة للفعالة بالصادات الحيوية.
- بمدة وجود الأعراض.

عدوى المرضى المصابين بالـ VIH مماثلة لعدوى المرضى الآخرين.

مدة العدوى بعد البدء بالمعالجة الفعالة تنقص بسرعة كبيرة، وتصبح

تقريباً منعدمة بعد بضعة أيام، إذا كانت مترافقة مع تحسن سريري وجراثومي.

3". الاحتياطات التنفسية الواجب اتخاذها من أجل الوقاية من انتقال

العدوى الهوائي:

الإقامة في المشفى تكون في غرفة خاصة، والباب مغلق. يجب تحديد

تُنقل المريض خارج غرفته وفي حال تنقله يجب أن يضع كمامة. كل فرد يدخل غرفة المريض يجب أن يضع كمامة. يجب أن يجدد هواء الغرفة على الأقل 6 مرات/ساعة في المشافي المكيفة، وهكذا فإن هواء المكيف يطرح نحو الخارج بعد تصفيته من دون أن يعاد دورانه داخل الجزء العام للمشفى، في المشافي الغير مكيفة فإن التهوية يحصل عليها بواسطة فتح النوافذ المتكرر، مع إبقاء الباب مغلقاً.

المرضى ذوي العدوى الشديدة مع وجود جراثيم متعددة المقاومة يجب أن يوضعوا في المشفى في غرف ذات ضغط سلبي بالنسبة للممر والجزء المشترك في المشفى. في حال عدم إمكانية تحقيق الضغط السلبي فإنه من الضروري جداً إبقاء الباب مغلقاً، وأن يضع المريض كمامة في حال فتح الباب. الأشخاص القريبين من المريض يجب أن يُعلموا بخطورة انتقال العدوى عن طريق التنفس ويجب أن يتجنبوا الزيارات خلال مرحلة المعالجة الأولى.

لكي يكون القناع فعالاً فإنه يجب أن يغطي الأنف، الفم، الخدين والذقن. ويجب أن يوضع قبل الدخول إلى الغرفة وحتى الخروج منها. هذا وإن مدة فعالية الأقنعة ذات الاستعمال لمرة واحدة هي 3 ساعات. يجب تجنب استعمال الأقنعة المسماة "أقنعة الزيارة" والتي قدرتها على التصفية ضعيفة جداً، أو أقنعة العناية.

هذه الإجراءات يجب أن تتخذ:

- حال الشك بتشخيص سل فعال معوي، وذلك حتى نفي هذا الشك.
- في حال السل الفعال المعدي، وفي حال كون الفحص المباشر للعينات التنفسية إيجابياً، وذلك خلال الـ 15 يوماً الأولى للمعالجة.
- في حال القيام ببعض الإجراءات أو الفحوص التي من الممكن أن تحرض السعال أو النقشع؛ Aérosols الضبوب (ممنوع في حالة السل الفعال)، علاج فيزيائي تنفسي، تنظير قصبات، تحريض النقشع.

25. التهاب الكبد الإلتهابي

سنة فيروسات تكون مسؤولة عادة عن التهاب الكبد الإلتهابي: الفيروسات A، B، C، D (دلتا)، E و G (جدول 2). كل هذه الفيروسات يمكن أن تولد التهاب كبد حاد. وحدها الفيروسات B، D و C ممكن أن تؤدي إلى التهاب كبد مزمن، الذي يمكن أن يختلط بتشمع أو كارسينوم كبدي خلوي. فيروسات أخرى ممكن أن تؤدي إلى التهاب كبد قليل الشدة في أغلب الأحيان وبترافق بعلامات سريرية أخرى تابعة للمرض المسبب من قبل الفيروس (فيروس إيبشتاين - بار، فيروس الاندخال الخلوي العرطل، فيروس الحلا البسيط...) جدول 1.

جدول 1 - الفيروسات المسؤولة عن الإلتهال الخلوي الحاد

وننتائج الفحوص الخاصة المصلية - الفيروسية

الفيروس	الفحص الخاص (المشعر - Marqueurs)
فيروس التهاب الكبد A	IgM مضاد لفيروس التهاب الكبد A (+)
فيروس التهاب الكبد B	AgHBs(+) Anti-HBs(-) Anti-HBc(+) IgM-HBc(+)
فيروس التهاب الكبد C	IgM مضاد لفيروس التهاب الكبد C ARN فيروس التهاب الكبد C
فيروس التهاب الكبد D	IgM مضاد - فيروس التهاب الكبد D، Ag التهاب الكبد D
فيروس التهاب الكبد E	مضاد فيروس التهاب الكبد E
فيروس التهاب الكبد G	ARN فيروس التهاب الكبد G
فيروس الاندخال الخلوي العرطل	IgM مضادة لفيروس الاندخال الخلوي العرطل (+)
فيروس إيبشتاين - بار	IgM مضادة لفيروس إيبشتاين بار (+)، اختبار MNI، اختبار بول - دافيدسون (+)
فيروس الحلا البسيط	IgG أو IgM

المستضد السطحي (العامل الأسترالي HbsAg).

المستضد النووي: HBcAg.

المستضد الإلتهابي: HBcAg.

1. التشخيص

1. التشخيص الإيجابي لالتهاب الكبد الحاد:

يشك عادة بالتهاب الكبد الحاد في حال ترافق يرقان مع علامات وظيفية وعامة (تعب، انعدام الشهية، غثيان، آلام شرسوفية يمنية) وأحياناً مسبوقة بترفع حروري، صداع، آلام مفاصل، آلام عضلية، طفح جلدي خلال 1 - 3 أسابيع. البول ذو لون قاتم، الغائط ذو لون فاتح. الفحص السريري: ضخامة كبد بسيطة مؤلمة بالجبس، وضخامة طحال أحياناً.

عدد الحالات غير العرضية يتغير حسب الفيروس المسبب (جدول 2) والتشخيص يوضع في هذه الحالة أثناء إجراء فحوص لأشخاص مشكوك بتعرضهم للعدوى (فيروس التهاب الكبد A، B، C) أو أمام ارتفاع للترانس أميناز غير مفسر.

تشخيص التهاب الكبد يؤكد أمام وجود انحلال خلوي مترافق مع ارتفاع الترانس أميناز (ASAT و $ASAT < ALAT$)، أو في حال وجود ركودة صفراوية (ارتفاع الفوسفاتاز القلوية والبيليروبين المقترن)، قيمة الترانس أميناز لا تؤثر على الإنذار.

جدول 2 - طريق العدوى والتطور السريري لفيروسات التهاب الكبد الأساسية

فيروس A	B	C	D	E	G
+++	0	0	0	+++	0
+	+++	+++	+++	+	+
+	+++	+	++	0	?
0	+++	+	+	0	+
$\pm (0.5\%)$	+++ (1%)	0 (?)	+++ (5%)	++ (>5%)	0 (?)
45 - 15	120 - 30	90 - 15	45 - 30	40 - 10	?

2. من المنطقي إذن:

- السبحث عن السوابق والعوامل المؤهبة: أمراض منتقلة عن طريق الجنس، علاقات جنسية ممكن أن تعرض للإصابة، إدمان على المخدرات، نقل دم، عدوى طعامية، عائلية، أو في مكان العمل، سفر إلى الخارج، عدم توازن غذائي، إدمان كحولي: 30 غ عند المرأة، 40 غ عند الرجل، عند الأطباء أو الممرضين،...
 - السبحث عن علامات خطورة تشير إلى وجود قصور خلوي كبدي، وذلك عند المراقبة: السريرية (اضطراب عقلي، flapping tremor، تتأذر نزفي جلدي مخاطي)، البيولوجية (اليومين الدم < 30 غ/ل، TP > 30٪، فيبرينوجين > 1 غ، عامل V منخفض).
 - نفي الأسباب الأخرى للانحلال الخلوي الكبدي: الأدوية (جدول 3)، استقلابية (داء ويلسون، هيموكروماتوز) سمية (كحول، فوسفور)، إبتان جرثومي (ليبتوسبيريا، جثرم دم بعصيات غرام +)، التهاب كبد سلي، بروسيللا، حمى تيفية، حمى (Q)، فيروسي (إيبشتاين - بار، فيروس الحلأ، فيروس الاندخال الخلوي العرطل...)، طفيلي (توكسوبلاسموز)، إصابات عامة (ساركونيد)، التهاب كبد مناعي... ثلاثة أسباب رئيسية يجب نفيها: زيادة وزن أو ارتفاع شحوم الدم، إدمان كحولي مزمن، تناول أدوية. كما يجب السبحث عن أسباب استقلابية أخرى لارتفاع الترانس أميناز: أمراض قلبية، أمراض عضلية...
 - نفي أسباب اليرقان الأخرى: نتيجة انسداد (حصاة القناة الصفراوية الأساسية، سرطان البنكرياس)، انحلال الدم، مرض جيلبيرت.
- الفحوص المخبرية الخاصة، الفحوص التصويرية (الإيكو، التصوير الطبقي المحوري، المرنان المغناطيسي)، الخزعة الكبدية أحياناً، جميعها تكون مفيدة لنفي الأسباب الأخرى.

جدول 3 - الأدوية المسببة لالتهاب الكبد الحاد (لائحة غير موسعة)

الصادات الحيوية: إيزونيازيد، بيرازيناميد، مأكروليد، كيتوكونازول، نيتروفورانتوين، سلفاميد، أمودياكين، مضاد الريتروفيرس.
مضادات الإحباط: أمينوبيتين، أميتريبتلين، إيزوبرونيازيد.
مضادات ألم ومضادات التهاب غير كورتيزونية.
أدوية تخدير من عائلة الهالوثان.
مضادات ارتفاع الضغط: الدوميت، بابافيرين.
مضادات تخثر: بنديون.
ستيروئيد: مانعات حمل فموية، Stéroïdes anabolisants.
فيتوفازين.
مضادات روماتيزمية: زيلوريك، أكلوريستين.

3. التهاب الكبد الفيروسي المزمن:

يُعرَّف باستمرار ارتفاع الترانس أميناز أكثر من حدّها الطبيعي لمدة تتعدى الستة أشهر. الخزعة الكبدية لا بد منها لتقييم الإصابة الكبدية، كما يجب البحث عن الأسباب التي تزيد خطورة الإنذار (كحول، VIH، أدوية، تشحم...)، كما يجب وضع استئطاب المعالجة.

2. الفحص

1. التهاب الكبد A (حمى التهاب الكبد A):

مرض وبائي في البلاد الفقيرة، وخاصة عند الأطفال والبالغين. العدوى تحدث عن طريق الهضم (فموية - شرجية)، مع فترة حضانة قصيرة (2 - 6 أسابيع). غير عرضي في أغلب الأحيان، أكثر شدة عند البالغ. تطوره عادة سليم، يتظاهر أحيانا بشكل ركودة صفراوية طويلة (عدة أسابيع أو أشهر)، النكس نادر. الأشكال الصاعقة نادرة (1/10000). لا يوجد أشكال مزمنة ولكن أشكال تتظاهر على عدة مراحل.

التشخيص مصلي (أجسام ضدية مضادة لحمى التهاب الكبد A من زمرة الـ IgM، ومن ثم الـ IgG تظهر مع بداية العلامات السريرية وفي نفس الوقت الذي ترتفع فيه الترانس أميناز).


2. التهاب الكبد B (فيروس التهاب الكبد B):

يتواجد هذا الفيروس في الدم، اللعاب، المفرزات الجنسية، وهو ينتقل عن طريق الدم أو مشتقاته...، الجنس، أو من الأم إلى الجنين.
أغلبية التهابات الكبد B الحادة لا تتظاهر سريريا؛ 10% منها تكون عرضية، ومن بينها 1% صاعقة. الإلتان المزمن (10% من مجموع التهابات الكبد B) يؤدي إلى حمل مزمن لالتهاب بعد 6 أشهر من AgHBs (3%)، أو إلى التهاب مزمن مستمر (4%) أو إلى التهاب مزمن فعال (3%) مع خطورة التشمع أو سرطان الكبد (4.5%). تطور الفحوص المصلية يسمح بتحديد مرحلة التهاب الكبد (جدول 4، صورة 1).

جدول 4 - التشخيص المصلي لالتهاب الكبد B

المشعرات المصلية الخاصة	التفسير
AgHBs+	إلتان حالي أو حامل مزمن
	AgHBe+ توالد فيروسي كبير
	AC Anti-HBe+ قدرة إلتانية ضعيفة، إنذار جيد
AC anti-HBe+	IgM(+); إلتان حديث
	IgG(+), و IgM(-) مع AgHBs(-), إلتان شافي، أو إيجابية كاذبة مع AgHBs(+): إلتان مزمن
	ADN فيروسي: وجوده يعني وجود تكاثر فيروسي
	AgHBs = الغلاف الفيروسي
	AgHBe و AgHBC = الكبسولة الفيروسية

صورة 1 - تطور مختلف المشعرات المصلية الخاصة الفيروسية خلال التهاب الكبد B الحاد



النكس يمكن حدوثه كما يمكن حدوث عودة فعالية الإنتان. هذا ويجب التمييز ما بين هجمات عودة فعالية الإنتان عند الشخص الحامل AgHBs (انحلال خلوي حاد، إيجابية الـ AgHBe والـ ADN لفيروس التهاب الكبد B) وعودة فعالية الإنتان عند شخص AgHBs ومضادات جسمية Anti-HBs إيجابية وذلك خلال تثبيط مناعي أو غالباً خلال الحمل. مع تطور التقنيات الحديثة فإن الـ ADN لفيروس التهاب الكبد B يمكن أن تكون إيجابية عند مرضى كانوا يعتبرون حتى الآن حاملين أصحاء غير عرضيين (+)AgHBs، ADN لفيروس التهاب الكبد B سلبية، (-)AgHBe، مضاد جسم anti-HBC إيجابي).

التظاهر السريري لهذه التفاعلات الفيروسية غير واضح بعد.

3. التهاب الكبد D أو دلتا (فيروس التهاب الكبد D):

فيروس دلّتا عبارة عن فيروس غير فعال، وذلك لاستعماله غلاف فيروس التهاب الكبد B. ومن غير الممكن تظاّهره إلا عند المرضى الحاملين لمولد ضد HBs: إما بحدوث إنتان بـفيروس التهاب الكبد B وفيروس التهاب الكبد D في نفس الوقت، مع وجود خطورة مضاعفة (10 - 20 مرة) لحصول التهاب كبد صاعق، وإما حصول إنتان بـفيروس التهاب الكبد D عند المرضى الحاملين للمزمنين لمولد ضد HBs مع خطورة التطور نحو التهاب الكبد المزمن الفعال أو التشمع. تشخيص التهاب الكبد B - دلّتا مصلي (جدول 5) والبحث عن الـ ARN هو من اختصاص المختبر الأخصائية.

جدول 5 - التشخيص المصلي لالتهاب الكبد دلتا المترافق مع التهاب الكبد B

إنتان إضافي	إنتان مترافق		
+	+	AgHBs	فيروس التهاب الكبد
-	+	IgM anti-HBc	B
+	+	AgHD	فيروس التهاب الكبد
- ومن ثم +	- ومن ثم + (انقلاب التفاعل المصلي)	Anti-HD	D
+	+	IgM anti HD	
+	+	ARN VHD (PCR)	

4. التهاب الكبد C (فيروس التهاب الكبد C):



يقدر عدد المرضى ذوي التفاعل المصلي الإيجابي لفيروس التهاب الكبد C بـ 600000 في فرنسا. العدوى عن طريق الدم في أغلب الحالات (<70% من الحالات): نقل دم، الممنعين على المخدرات، اختلاط لمعالجة طبية، مهني، انتقال عن طريق الجنس نادر (>1 - 3%) والانتقال من الأم إلى الجنين ضعيف >5% إلا في حالة ترافق الإلتهابين VIH - فيروس التهاب الكبد C. تمثل الأشكال العابرة (من دون وجود قدرة على العدوى) 20 - 30% من الحالات. هذا ويقترح البحث عن وجود المرض عند الأشخاص المؤهين للإصابة به (ممن على المخدرات، عند الأشخاص الذين نقل لهم دم قبل عام 1991، كل مداخلة طبية اختراقية خاصة قبل عام 1997، معالجة بالوخز إلخ...). وهو يركز على البحث عن الأجسام الضدية المضادة لفيروس التهاب الكبد C بواسطة اختبار ELISA الجيل 3 المحقق على عينتين مختلفتين (جدول 6).

جدول 6 - تفسير الاختبارات البيولوجية لالتهابات الكبد الإلتهابية C

الترانس أميناز	ARN فيروس	ELISA	التهاب الكبد C
التهاب الكبد C			
مرتفعة أو طبيعية	+	+	التهاب الكبد C المزمن
طبيعية	-	+	التهاب الكبد C الشافي
طبيعية	-	+	إيجابية كاذبة

التهاب الكبد الإلتهابي C الحاد غير عرضي عادة ولا يعطي يرقان في 90 - 95% من الحالات. هذا ولا يوجد أشكال صاعقة منه، ولكن المرور نحو الأزمان بعد 6 أشهر كثير المصادفة (85%)، مع خطورة حصول تشمع (20% من الالتهابات الكبدة المزمنة بعد مدة متوسطة قدرها 15 عاماً) أو كارسينوم كبدي. يمكن حصول تظاهرات خارج كبدية مثلاً (التهاب كبد وكلية، بورفيريا جلدية متأخرة...). العوامل الأساسية المرتبطة بالتطور نحو التليف وبالتالي نحو شدة الإلتهاب هي: العمر < 4 عاماً عند الإصابة، الجنس الذكر، مدة الإلتهاب، إلتان ناتج عن طريق نقل الدم، نقص مناعة (VIH)، إدمان كحولي.

المضادات الجسمية في الدم تظهر بعد 8 - 15 أسبوعاً في بدء الإصابة (أنظر صورة 2). اكتشاف وجود الـ ARN لفيروس التهاب الكبد C مهم لمراقبة العلاج. هذا وإن تحديد نمط الجين (المولد) يسمح بتمييز المرضى الذين يستجيبون بشكل جيد (مولد نمط 2 أو 3) أو بشكل سيئ (مولد نمط 1) للعلاج الخاصة.



5. التهاب الكبد E (فيروس التهاب الكبد E):

مرض منقول من بلاد أخرى، نادر الحصول في فرنسا، يلاحظ عند المسافرين أو الجنود العائدين من المناطق الموبوءة (آسيا الجنوبية الشرقية، الهند، أفريقيا، أمريكا الوسطى، الشرق الأوسط). طريق العدوى غالباً هضمي، نادراً عن طريق الجنس. الإلتان الحاد يترافق غالباً مع يرقان ولكن تطوره سليم بشكل عام. الأشكال الصاعقة والخطيرة ممكنة الحصول خاصة عند المرأة الحامل في نهاية حملها. التشخيص يستند على قصة سفر، على نفي أسباب التهاب الكبد الحاد الأخرى، وعلى الاختبارات المصلية (مضادات جسمية ضد فيروس التهاب الكبد E).

6. التهاب الكبد G (فيروس التهاب الكبد G):

يوجد مناطق موبوءة بهذا الإلتهاب في أفريقيا الغربية. الانتقال يحصل غالباً عن طريق نقل الدم. ولكن الانتقال عن طريق الجنس أو من الأم إلى الجنين ممكن الحدوث. الإلتهاب الحاد يتظاهر بالتهاب كبد بعد نقل الدم. هذا وقد ذكرت بعض الحالات الاستثنائية لالتهاب الكبد المزمن ولكن مترافقة مع فيروس التهاب الكبد B أو C. التشخيص يرتكز على RT-PCR في المخابر المختصة أو على نفي أسباب التهاب الكبد الحاد الأخرى.

3. المعالجة

1. الاستطبابات وأشكال المعالجة:

- من المحبذ التوقف عن الإدمان الكحولي في كل الحالات.
- في الأشكال الحادة المشتركة، فإنه لا يوجد أي معالجة خاصة. استعمال الأنترفيرون في التهابات الكبد C الحادة أو بعد التعرض العرضي يمكن اقتراحه وذلك تبعاً لبروتوكولات خاصة. في الأشكال الصاعقة، المعالجة عرضية ويجب اقتراح إجراء زرع الكبد إسعافياً.
- في حالة التهاب الكبد المزمن B، المعالجة مستطبة في الحالات الفعالة (علامات تشريحية مرضية مع انحلال خلوي، وADN مصلي (+))، في حال غياب التشمع. الأنترفيرون الحاوي لألفا 2أ (روفيرون، لاروفيرون) أو ألفا 2ب (أنترونا، فيرافرون) 2.5 - 5 مليون وحدة عالمية/م² 3 مرات في الأسبوع خلال 4 - 6 أشهر يسمح، في 30% من الحالات تقريباً، بإيقاف فعالية حمى التهاب الكبد B (الـ ADN والـ ADN بوليميراز المصلي يصبحان سلبيين، ومن ثم - وبشكل غير ثابت - ينقلب التفاعل المصلي للـ HBe والـ HBs).
- اللاميفودين (زيفيكس حبوب أو سائل للشرب) يستعمل بجرعة 100 مغ/يوم كمعالجة لمدة طويلة حتى الحصول على انقلاب التفاعل المصلي للـ HBe والـ HBs. هذا الدواء مستطب في حالة التشمع أو قصور الكبد. أهمية مرافقة اللاميفودين مع الأنترفيرون ما زالت قيد النقاش.

- في الأشكال المزمنة لالتهاب الكبد C فإن المعالجة مستطبة في حال وجود فعالية واضحة على الخزعة الكبدية. ومع ذلك فإنه في بعض الحالات يمكننا الاستفادة من تحاليل الفحوص المصلية الخاصة بالتليف مثل حمض الهيلورونيك، زمن البروترومبين، أو أسيتيل فيبروتست Fibrotest. الخزعة الكبدية تسمح بالتمييز ما بين التهابات الكبد الضعيفة الشدة والتهابات الكبد المزمنة الفعالة ووضع التشخيص النسيجي للتشمع. هذا وإبنا نقيم خطورة التهاب الكبد حسب محصلتين (كنودل Knodell وميتافير Metavir). محصلة Knodell التي تتراوح ما بين 0 - 16، نقيم خطورة 4 قياسات: النخر البابي، النخر داخل العقدي، الارتشاح الالتهابي والتليف. وفي الحقيقة تستعمل محصلة Métavir التي نقيم بصورة متفرقة الفعالية الالتهابية (من A_0 حتى A_3) والتليف (F_0 حتى F_4).
- عند مريض من غير تليف كبدي هام ($F > 2$)، وبالأخص عندما يكون تاريخ بدء الإصابة قديم، أكثر من 20 سنة، فإن خطورة الالتهاب تكون ضعيفة. ومع ذلك فإنه يجب مراقبة المريض مع فحوص سنوية تتضمن: فحص سريري، فحص بيولوجي كبدي، وأحياناً إيكو للبطن، خزعة كبد جديدة يجب القيام بها بعد 3 - 5 سنوات، من أجل الحكم على تطور التهاب الكبد، تناول الكحول المنتظم يجب أن يقود إلى مراقبة أكثر صرامة.
- عند مريض عنده التهاب كبد مزمن فعال أو تليف، فإنه يجب البدء بالمعالجة في حال كون ($A \leq 2, F \leq 2$).
- عند مريض عنده تشمع كبد، يجب اقتراح المعالجة ولكن مع مراقبة أشد صرامة. هذه المراقبة التي تجرى كل 6 أشهر تتضمن فحوص بيولوجية كبدية. معايرة الألفا - فيتو - بروتئين المصلي، إيكو بطني وكل 4 سنوات يجب إجراء تنظير المريء، المعدة والاثني عشري وذلك بحثاً عن الدوالي.
- في بعض الحالات يمكن الاستغناء عن تحقيق الخزعة الكبدية وذلك عندما يكون الاستطباب العلاجي واضحاً.
- إنسان عند المريض الناقص المناعة مع وجود نمط جيني ذو تجاوب جيد (2 أو 3).

- تشمع معاوض.
- تحقيق استئصال كامل للفيروس وذلك قبل الحمل.
- المعالجة تستند على مرافقة الأنترفيرون ألفا 2 (1.5 مكغ/كغ/أسبوع وذلك حقنة واحدة تحت الجلد) مع ريبافيرين (ريبيتول) بجرعة على الأقل 10.6 مغ/كغ/يوم عن طريق الفم على دفعتين، خلال 6 - 12 شهراً وذلك حسب نمط الجين (المولد).

2. مراقبة المعالجة:

هذه المعالجة ثقيلة وتتضمن كثيراً من الآثار الجانبية (عند مريضين/3) التي تكون شديدة أحياناً وتتطلب إنقاص الجرعات أو حتى إيقافها. هذا وإن مراقبة المعالجة بالأنترفيرون تكون سريرية (تتأثر نزلة وافدة، كثير الحوث ويمكن إنقاص شدته بتناول الباراسيتامول، ضعف عضلي، فقد وزن، اضطرابات عصبية نفسية، شذوذ في وظيفة الغدة الدرقية، تظاهرات مناعية)، بيولوجية (تعداد وصيغة، صفائح، TSH قبل المعالجة ومن ثم تعداد وصيغة كل شهر و TSH كل 3 أشهر). الريبافيرين يمكن أن يؤدي إلى حصول فقر دم انحلاسي وهو يتطلب الامتناع عن الإنجاب عند الرجل والمرأة بسبب آثاره الجانبية المشوهة للجنين.

الفعالية العلاجية تتظاهر بعودة قيمة الترانس أميناز إلى الطبيعي (يجب معايرة الـ ALAT كل شهر خلال مدة المعالجة، ومن ثم كل شهرين خلال 6 أشهر، ومن ثم مرتين بالعام)، وتطور التفاعلات المصلية الخاصة الفيروسية: الـ ADN المصلي يصبح سلبياً، انقلاب التفاعل المصلي للـ HBe والـ HBs في حالة للتهاب الكبد B، الـ ARN المصلي يصبح سلبياً (مراقبة بعد 3 أشهر ومن ثم 12 شهراً تحت المعالجة، ومن ثم 6 أشهر بعد إيقاف المعالجة) بالنسبة لالتهاب الكبد C.

4. الوقاية

1. التهاب الكبد A:

- اتخاذ إجراءات صحية (نظافة الأيدي والأطعمة) وذلك لتجنب العدوى عن طريق الغائط.
- لقاح غير مفعّل (inactivé) (هافريكس Havrix 1440 للبالغ، وهافريكس 720 للطفل أو الرضيع < 1 سنة، أفاكسيم للبالغ والطفل < سنتين، فاكتا للبالغ والطفل < سنتين): حقنة واحدة داخل العضل، مع إعطاء جرعة التذكير بعد 6 - 18 شهراً ومن ثم كل 10 سنوات هذا وينصح بإعطاء هذا الطعم (أنظر فصل 47 الطعوم) لكل شخص ليس عنده سوابق إصابة بالتهاب الكبد A، عمره أقل من 45 عاماً ويجب أن يذهب إلى منطقة موبوءة، كما ينصح به عند العمال في مصانع التغذية وعند الأشخاص ذوي المهن التي تعرض للإصابة. الطعم توينريكس Twinrix 720 - 20 للبالغ و360 - 10 للطفل (1 - 15 عاماً)، 3 حقن (يوم 0، الشهر 1، الشهر 6)، يؤمن حماية مشتركة من فيروس التهاب الكبد A وB.

2. التهاب الكبد B:

- لقاح فيروسي ميت (inerte). يستعمل المستضد السطحي، ويحصل عليه من إعادة دمج جيني [إيجيريكس B 20 مكغ للبالغ و10 مكغ للطفل والرضيع، HB VAX DNA 5 وحدات، 10 وحدات (< 15 عاماً)، 40 وحدة (للأشخاص تحت الكلية الاصطناعية)] أو بواسطة زرع على سلالة خلوية (Gen Hevac Pasteur): حقنيتين يوم 0 ، شهر 1 ومن ثم جرعة ثالثة ما بين 5 و12 شهراً بعد الجرعة الثانية. هذا الطعم ينصح به في روزنامة الطعوم منذ عمر 2 - 3 أشهر (أنظر فصل 47 اللقاحات). هذا الطعم إجباري عند كل العاملين في الصحة. عند الرضع الطعم يمكن أن يبدأ به في نفس الوقت الذي يعطى فيه الطعم

الخماسي Pentavalent. الجرعة الثالثة يمكن أن تعطى إما مفردة أو عند إعطاء ROR، أو أخيراً عند إعطاء جرعة التذكير الأولى للـ Pentavalent. هذا ويجب الأخذ بعين الاعتبار السوابق الشخصية والعائلية لمرض عصبي مزيل للنخاعين Démiélénisant ولكن الخطر ضعيف جداً تحت عمر الخمس سنوات. ليس من الضروري إعطاء جرعات التركيز إذا أعطي الطعم في عمر أقل من 25 عاماً. بعد هذا العمر فقط بالنسبة للمرضى ذوي الخطورة المرتفعة، فإنه يجب إعطاء جرعة تذكيرية بعد 5 سنوات من الجرعة الأولى، كما يجب إجراء مراقبة مصلية بعد 1 - 2 شهر. إذا كانت نسبة الجسم الضدي للمستضد السطحي < 10 ملايين وحدة عالمية/مل فلا مكان لإعطاء أي جرعة تذكيرية. إذا كانت نسبته أقل فإنه من الممكن اقتراح إعطاء جرعة إضافية.

في حال وجود ضرورة قصوى للحصول على مناعة سريعة (الذهاب إلى منطقة موبوءة، الأشخاص العاملين في الصحة...)، فإنه من الممكن عند البالغ اقتراح إعطاء 3 جرعات متقاربة يوم 0، يوم 7، يوم 21، مع إعطاء جرعة رابعة بعد عام واحد.

- إعطاء المناعة السلبية يحصل عليه بواسطة الغلوبولينات المناعية للمستضد السطحي وذلك في حالة العدوى نتيجة حادث عرضي (500 وحدة عالمية داخل العضل) أو للحصول على مناعة وقائية عند المرضى المجري لهم تحال بالكلية الاصطناعية (8 مغ/كغ داخل العضل) أو في حالة زرع الكبد عند شخص المستضد السطحي عنده إيجابي (داخل الوريد)، هذه المناعة السلبية يجب أن تترافق مع لقاح يحقن في مكان آخر.

- التقيد بالوقاية الأساسية من قبل العاملين في المجال الصحي، أو العاملين في المخابر.

- البحث بشكل روتيني عن (المستضد السطحي والجسم الضدي للمستضد النووي).

- خلال الحمل البحث الروتيني عن وجود التهاب كبد B يكون إجبارياً عند

إجراء فحوص الشهر الرابع. وإذا كانت الأم حاملة للمستضد السطحي، فإنه يجب حماية حديث الولادة بواسطة حقن الغلوبولينات المناعية الخاصة (أول حقنة منذ الولادة).

- الوقاية من انتقال الإصابة عن طريق الجنس.
- إعطاء اللقاح للأشخاص القريبين من الحامل المزمن للمستضد السطحي.

3. التهاب الكبد D:

الوقاية منه هي نفسها المطبقة في حالة التهاب الكبد B.

4. التهاب الكبد C:

البحث الروتيني عن حملة الالتهاب عند المتبرعين بالدم، تطبيق قواعد الوقاية العالمية من قبل العاملين في المجال الصحي، تعقيم جهاز التنظير الهضمي، الوقاية من العدوى عن طريق الجنس، الوقاية عند المدمنين على المخدرات.

5. التهاب الكبد E:

لا يوجد طعم واقٍ، يجب اتخاذ إجراءات وقاية صحية عامة (الوقاية من انتقال العدوى عن طريق الغائط).

6. التهاب الكبد G:

لا يوجد لقاح واقٍ. يجب اتخاذ إجراءات وقاية صحية عامة، تجنب أخذ الدم من الأشخاص المؤهين للتعرض للإصابة.

26. الإنتانات بفيروس الحلأ (العقبول)

تتضمن فيروسات الحلأ فئة فيروس الحلأ البسيط (HSV₁، HSV₂)، فيروس الحماق وداء المنطقة (VZV)، فيروس إبتان وحيدات النوى (فيروس إيبشتاين - بار EBV)، فيروس الاندخال الخلوي العرطل (CMV)، الـ HHV₆، HHV₇، HHV₈. إنها فيروسات خاصة بالإنسان فقط. خاصتهم السريرية المشتركة هي أنه بعد الإبتان البدئي سواء كان عرضياً أو لا، فإن الفيروس يبقى في العضوية (مرحلة الكمون)، واحد أو عدة تظاهرات سريرية ثانوية (عودة التظاهر) ممكنة الحصول.

يكون الإبتان سليماً في أغلب الحالات والامتناع عن المعالجة هي القاعدة العامة. ولكن بعض الحالات تتطلب معالجة مضادة للفيروسات.

الأجسام الضدية المضادة لفيروس الحلأ لا تؤمن حماية مناعية.

1. فيروس الحلأ البسيط (HSV)

1. الصورة السريرية:

عندما يكون هناك تظاهر سريري، فإن الإبتان الأولي بالـ HSV₁ أو HSV₂ يمكن أن يكون التهاب لثة وفم، التهاب قرنية، تقرحات حادة تناسلية، التهاب دماغ، التهاب لحمة ظفر كاذبة. (La pustulose) أو داء البثرات القوبائي الشكل لكابوسي - جوليوسبيرج يشاهد عند الطفل المصاب بإكزيما.

عودة التظاهر تكون غالباً فموية وعلى حواف الشفاه وتناسلية.

الحلأ عند حديثي الولادة (يصيب 3 - 5 حديثي ولادة من أجل 10000 حمل) عبارة عن إبتان بدئي خطير. يصيب الطفل أثناء الولادة عن طريق المهبل عند أم مصابة بهذا الفيروس، سواء كانت حاملة للأعراض أو لا.

عند المريض ذو المناعة الناقصة، فإنه من الممكن حدوث توضعات حشوية معزولة لهذا الفيروس، أو مترافقة مع توضعات جلدية مخاطية، هضمية، رئوية أو كبدية.

2. التشخيص:

يكون سريرياً في حالة التظاهرات الجلدية المخاطية العادية. أخذين بعين الاعتبار دوال وجود هذا الفيروس وفترته الكامنة، فإن وجود تفاعل مصلي إيجابي لا يسمح بتحديد زمن الإصابة بالإنتان ولا يمكن عزوه إلى تظاهرات سريرية حادة. هذا ومن غير الضروري البحث عن الفيروس بواسطة الزرع أو بواسطة النقاط مولد ضد إلا في الحالات المختلطة وغير النموذجية: سائل دماغي شوكي في حالة التهاب الدماغ، تنظير الكولون في حالة الإصابة الهضمية، خزعة كبدية في حالة التهاب الكبد، حويصلات الحلاّ التناسلي خلال الحمل.

3. ما هي الأشكال التي يجب معالجتها وكيف؟

1. التهاب الفم واللثة الحلني (إنتان بدني):

إعطاء سوائل في حالة الحاجة وذلك عن طريق الفم أو الوريد.
غسل الفم مع مخمضة بواسطة ماء بيركبنات وأسبيرين.
أغذية ما بين الصلبة والسائلة وباردة لأنها تهدئ الألم.
زوفيراكس عن طريق الفم (حبوب أو سائل للشرب 200 مغ 5 مرات/يوم) أو داخل الوريد (5 مغ/كغ 3 مرات/يوم لمدة 10 أيام، ويجب البدء بهذه المعالجة أبكر ما يمكن).

2. عودة تظاهر العقبول الفموي الوجهي:

لا يوجد أية توصيات تتعلق بإعطاء المضادات الفيروسية عن الطريق العام أو موضعياً وذلك لغياب الدراسات السريرية، ومع ذلك فإنه في حالة ترافق عودة التظاهر مع إصابة حشوية (التهاب السحايا، حمرة متعددة المظهر...) فإن المعالجة مستطبة.

3. العقبول التناسلي (إنتان بدني):

زيلتريكس عن طريق الفم 500 مغ حبة واحدة مرتين/يوم لمدة 10 أيام أو زوفيراكس عن طريق الفم 200 مغ، حبة واحدة 5 مرات/يوم لمدة

10 أيام، أو في حالة الأشكال الشديدة زوفيراكس داخل الوريد 5 مغ/كغ/8 ساعات.

4. عودة تظاهر العقبول التناسلي - في حال وجود أعراض هامة:
زيليتريكس 500 مغ عن طريق الفم لمدة 5 أيام: حبتين دفعة واحدة أو
دفعتين/يوم أو زوفيراكس 200 مغ، حبة واحدة 5 مرات/يوم لمدة 5 أيام.
5. العقبول القرني:

وهو عبارة عن مضاد استطباب مطلق لاستعمال الكورتيكوستيرويدات
والمخدرات الموضعية وذلك لتجنب امتداد الآفات القرنية. المعالجة تكون
بإعطاء الأسيكلوفير كمرهم عيني، 5 مرات/يوم ويستمر به 3 مرات بعد
الاندمال. في حال وجود التهاب قرنية عميق أو التهاب قرنية وعين:
أسيكلوفير داخل الوريد 5 مغ/كغ 3 مرات/يوم حتى الحصول على الاندمال،
أو 10 حبات 200 مغ، أو ملعقة عيار 5 مل. هذا ويجب اللجوء إلى أخصائي
العينية في هذه الحالة.

6. التهاب الدماغ العقبولى:
وهو عبارة عن حالة تتطلب معالجة إسعافية، حتى قبل إثبات التشخيص،
بواسطة الأسيكلوفير داخل الوريد (15 مغ/كغ/8 ساعات) خلال 15 يوماً.
الخطة التشخيصية تتطلب إجراء فحص مرنان مغناطيسي للدماغ، أو في
حال عدم توفره، إجراء تصوير طبقي محوري دماغي، كما يجب البحث عن
الفيروس في السائل الدماغي الشوكي بواسطة البزل القطني.

7. العقبول عند المريض ناقص المناعة:
التظاهرات العقبولية التي غالباً ما تكون خطيرة تعالج بواسطة
الزوفيراكس داخل الوريد 5 - 10 مغ/كغ/8 ساعات، حتى الشفاء الكامل. عند
هؤلاء الأشخاص فقط تم عزل الفصائل المقاومة للأسيكلوفير (>5%)،
المعالجة في هذه الحالة تكون بواسطة الفوسكارفير (Foscarvir). وهي تتم في
المشفى.

4. الوقاية:

1. ليس هناك من لقاح متوفر حالياً:

2. الوقاية، من عودة الالتهابات التناسلية:

في حالة عودة الالتهابات المتكررة (أكثر من 6/سنة)، أو الشديد الأعراض، يقترح إعطاء ويليتريكس عن طريق الفم 500 مغ/يوم جرعة واحدة أو جرعتين، أو زوفيراكس عن طريق الفم 200 مغ حبتين مرتين/يوم، خلال 6 - 12 شهراً. هذه المعالجة يجب أن تقوم كل 6 أشهر. في حالة فشلها، فإنه من غير المفيد الاستمرار بها. في حالة فعاليتها فإن تحقيق توقعات عنها مرغوب فيه كل سنة وذلك لرؤية ضرورتها. هذا وإن سلامة هذه المعالجة الطويلة الأمد قد أثبتت حالياً.

3. الوقاية من عودة الالتهابات الفموية - الوجهية (≤6 أعوام):

- العقبول العابر (Labile) الغير متعلق بأشعة الشمس. زوفيراكس عن طريق الفم 200 مغ حبتين مرتين/يوم. الفعالية غير أكيدة ويجب تقويم المعالجة كل 6 أشهر.

- العقبول العابر الشمسي:

الفعالية الوقائية لمضادات الفيروسات عن الطريق العام أو الموضعي غير مثبتة. ينصح في هذه الحالة بالمراهم الحامية من أشعة الشمس.

4. الوقاية من العقبول عند حديثي الولادة:

- الإنتان الأولي التناسلي عند الحامل.

- خلال الشهر السابق للولادة:

زوفيراكس عن طريق الفم 200 مغ حبة واحدة 5 مرات/يوم حتى الولادة.

- قبل الشهر الأخير: معالجة مماثلة للعقبول التناسلي البدئي في حال حصوله خارج فترة الحمل هذا ويوصى فيما بعد بالمعالجة الوقائية من عودة الإنتانات اعتباراً من الأسبوع الـ 36 وحتى الولادة: زوفيراكس عن طريق الفم 200 مغ حبتين 3 مرات/يوم.

- في حال تكرر الإنتانات: معالجة شافية مماثلة لمعالجة العقبول التناسلي في حالة حصوله خارج الحمل. هذا ولا يوجد توصيات للاستعمال الروتيني للأسيكلوفير من أجل الوقاية من عودة الإنتان خلال الشهر الأخير للحمل.
- القيصرية:
- الإنتان البدئي: بشكل استطباً قطعياً للقيصرية إذا كانت الإصابات العقبولية موجودة خلال المخاض. بينما يكون هذا الاستطاب قابل للمناقشة في حال غياب الإصابات العقبولية خلال المخاض. الولادة عن الطريق الطبيعي مسموح بها إذا كان تاريخ الإنتان الأولي أكثر من شهر. أما إذا كان تاريخ هذا الإنتان أقل من شهر وكان قد عولج فإنه لا يوجد توصيات للولادة عن طريق العملية القيصرية بشكل روتيني، أما في حال غياب المعالجة فيجب مناقشة إجراء العملية القيصرية، الفحوص الفيروسية يمكن أن تساعد على اتخاذ القرار في هذه الحالة.
- تكرر الالتهاب: يسمح هنا بالولادة عن الطريق الطبيعي وذلك إذا كان تاريخ هذا التكرار أكثر من 7 أيام، وفي حال غياب الآفات العقبولية في لحظة المخاض.
- عند حديث الولادة وفي حالة إصابة خطيرة، فإنه يجب تجنب التماس المباشر مع الآفات العقبولية، وهناك مضاد استطباب للبوليفيدون اليودي.

2. فيروس الحماق ودام المنطقة (VZV) - الحماق

- قدرة هذا الفيروس على العدوى كبيرة جداً، وذلك عن طريق الهواء. وهي تبدأ قبل ظهور الطفح ببضعة أيام، ومن ثم تنتقل العدوى عن الطريق الجلدي بعد ظهور الحويصلات.
- التشخيص سريري، والإنذار يكون سليم عند الطفل الغير ناقص المناعة، أما عند البالغ فإنه يمكن حصول اختلاطات (ذات الرئة، التهاب الدماغ).
- تزيد ذات الرئة الحماقية عند المرأة الحامل من نسبة الولادة المبكرة أو موت الجنين داخل الرحم. هذا وإن خطورة اعتلال الجنين الحماقي هو

بنسبة 2% (فقط في حال الإصابة بالحماق قبل الأسبوع الـ 20 من انقطاع الطمث).

عند ناقص المناعة، الطفح الجلدي والمخاطي يكون نخرياً نزفياً وشديد الانتشار، وهو يترافق بتوضعات حشوية متعددة.

1. المعالجة العرضية:

- هناك مضاد استطباب للأسيبرين وذلك لخطورة حصول تاندر ري Reye.
- مضادات الهيستامين في حال حصول حكة.
- من أجل الوقاية من اختلاط المرض بإنتان إضافي فإنه يجب العناية بنظافة الأيدي، قص الأظافر، أخذ حمام مرتين باليوم بماء فاترة مع استعمال صابون غير محسس والكلوريكسدين. يجب عدم استعمال أي مادة أخرى (مراهم، إلخ...) والتي من الممكن أن تسهل التكاثر الجرثومي.
- في حال توضع إنتان جلدي إضافي: صادات حيوية فعالة على المكورات العنقودية والعقدية، عن طريق الفم (أموكسيسيلين - حمض الكلافولينيك أو سيفالوسبورين جيل 1).

2. ما هي أشكال الالتهاب التي يجب معالجتها بالمضادات الفيروسية وكيف؟

استعمال الآسيكلوفير غير مستطب كمعالجة شافية عن طريق الفم في الأشكال غير المختلطة عند شخص غير ناقص المناعة وغير معرض لخطر.

- استطبابات المعالجة بالمضادات الفيروسية هي:
- عند حديث الولادة غير العرضي ولكن في حال ولادته من أم أصيبت بالحماق خلال الأيام الخمسة السابقة للولادة أو خلال اليومين التاليين للولادة.
- حديث ولادة مصاب بالحماق.
- حماق نزفي أو مختلط بتوضعات حشوية (رئوية، عصبية).
- حماق عند المرأة الحامل في حال حصول طفح خلال الأيام العشرة السابقة للولادة.

الجرعات المنصوح بها هي 20 مغ/كغ/8 ساعات عن طريق الوريد عند حديث الولادة، 15 مغ/كغ/8 ساعات عن طريق الوريد عند المرأة الحامل، 10 مغ/كغ/8 ساعات عن طريق الوريد عند البالغ، تتراوح مدة المعالجة ما بين 8 - 10 أيام.

• الحماق عند المريض ناقص المناعة:

إعطاء الأسيكلوفير داخل الوريد لا بد منه 10 مغ/كغ/8 ساعات عند البالغ، 250 - 500 مغ/م²/8 ساعات عند الطفل خلال 10 أيام.

3. الوقاية:

- إجراءات وقائية خاصة بالأشخاص القريبين من المريض: تجنب التماس ما بين المريض وبين الأشخاص المعرضين للإصابة بأشكال الحماق الخطيرة (المسنين، الأطفال المصابين بالأكزيما، امرأة حامل ذات تفاعل مصلي سلبي، ناقصي المناعة).
- اللقاح الحي المضعف مستطب عند الأطفال مثبتي المناعة، عند إخوتهم والأشخاص الذين يعتنون بهم والذين هم بتماس معهم. ولا يوجد فائدة من هذا اللقاح في حال وجود سوابق إصابة بفيروس داء المنطقة والحماق مؤكدة بواسطة فحص مصلي إيجابي.
- الفائدة من استعمال الغلوبولينات المناعية الإنسانية المتعددة المفعول داخل الوريد من أجل الوقاية من الحماق خاصة عند مثبط المناعة عند تعرضه لعدوى حماقية غير مؤكدة. أما الغلوبولينات المناعية الخاصة فهي لم تعد متوفرة.

3. فيروس الحماق وداء المنطقة (VZV): داء المنطقة

وهي عبارة عن تكرر موضع للإنتان بفيروس الحماق وداء المنطقة. المعالجة بالمضادات الفيروسية مستطبة:

- للوقاية من الآلام الحاصلة بعد الإصابة بداء المنطقة.

- لمعالجة داء المنطقة المعمم أو النزفي، المترافق بإصابات حشوية عند المريض المثبط المناعة.

1. المعالجة العرضية:

من أجل تجنب الإصابة بالإنتانات الإضافية: حمامات يومية بالماء الفاترة مع استعمال صابون غير محسس: كلور هيكسدين.
معالجة الآلام في المرحلة الحادة: في حالة الآلام المعتدلة: باراسيتامول مع كودينين، باراسيتامول - ديكستروبروبوكسيفين، أما في حالة الآلام الشديدة فيجب استعمال المورفين.

الآلام الحادثة بعد الإصابة بداء المنطقة يمكن أن تتحسن باستعمال الأميتريبتيلين (75 مغ/يوم) وذلك من أجل الآلام الخفيفة المستمرة والكاربامازيبين (400 - 1200 مغ/يوم) من أجل الهجمات الشديدة للإلام.

2. ما هي الأشكال التي يجب معالجتها بواسطة المضادات الفيروسية وكيف؟

لا يوجد استطباب للمعالجة بالمضادات الفيروسية بالنسبة للأشكال غير المختلطة للمريض الذي عمره أقل من 50 عاماً.

• استطبابات المعالجة بالمضادات الفيروسية هي:

- عند المريض المثبط المناعة: زوفيراكس داخل الوريد 10 مغ/كغ/8 ساعات عند البالغ، 500 مغ/8 ساعات عند الطفل خلال 8 - 10 أيام على الأقل.

- عند المريض الذي عمره < 50 عاماً وذلك للوقاية من الآلام بعد الإصابة بداء المنطقة: المعالجة يجب أن تبدأ باكراً (72 ساعة من بدء ظهور الطفح على الأقل)، يعطى زيليتريكس 500 مغ، حبتين 3 مرات/يوم أو أورافير 500 مغ 1 - 3 مرات/يوم خلال 7 أيام.

- داء المنطقة العيني: اللجوء إلى الأخصائي ضروري جداً. ويقترح استعمال زيليتريكس 500 مغ 2 - 3 مرات/يوم خلال 7 أيام. الأسيكلوفير داخل الوريد (10 مغ/كغ/8 ساعات) يحتفظ به لمعالجة الأشكال المختلطة

(التهاب القرنية العميق). المستيرويدات عن الطريق العام (نظرياً هناك مضاد استطباب لها) يمكن أن توصف بعد استشارة طبيب العينية.

- الأشكال التي معالجتها بالمضادات الفيروسية قابلة للنقاش:
- إنتان بفيروس VIH مع CD₄ طبيعية، أو سرطان صلب خلال فترة عدم المعالجة.
- داء المنطقة الغير عيني عند الشخص الذي عمره > 50 عاماً، وذلك عند وجود عوامل مؤهبة لحصول آلام بعد الإصابة بداء المنطقة: طفح هام، شدة الآلام في مرحلة الطفح، حصول آلام عدة أيام قبل ظهور الطفح: زيليتريكس.

4. فيروس الإندخال الخلوي العرطل (CMV)

للايضاح: الإنتان الأولي بهذا الفيروس يكون خفياً في أغلب الحالات، 80 - % من البالغين يحملون في دمهم أجسام ضدية موجهة ضد هذا الفيروس. انتقال العدوى يكون بين الأشخاص، ولكن من الممكن انتقاله عن طريق نقل الدم الطري (جهاز الدوران خارج الجسم)، طعم نقي العظم، أو في حالة نقل الأعضاء. عند الحامل المصابة بالإنتان الأولي احتمال مرور الفيروس إلى الطفل هو 20%، عن طريق الدم. تتببط المناعة ذو النموذج الخلوي (سيذا، طعم نقي العظم أو الأعضاء) يؤهب لعودة تفعيل فيروس الاندخال الخلوي العرطل.

التشخيص يستند على كشف الفيروس في الدم أو في الخزع المأخوذة من المريض وعلى الفحص التشريحي للمرضي لهذه الأخيرة.

1. ما هي أشكال التهاب التي يجب معالجتها بالمضادات الفيروسية وكيف؟

- الإنتانات الحادثة عند المرضى الذين نقل لهم طعم نقي العظم، أو المزروع عندهم عضو ما، أو عند المرضى المصابين بالسيدا يجب أن تعالج:
- جانسيكلوفير (سيميفان): يوصف كمعالجة هجومية من 4 - 21 يوماً بجرعة 5 مغ/كغ/12 ساعة (حقن مستمر داخل الوريد لمدة ساعة واحدة). في حالة التهاب الشبكية الحاصل أثناء الإصابة بمرض السيدا من

الضروري الاستمرار بالمعالجة وذلك لمنع حدوث النكس والدواء المفضل هنا هو الفالجانسيكلوفير (روفالسيت) حبتين/يوم، في حال عدم إمكانية إعطاء هذا الدواء، يستعمل جانسيكلوفير داخل الوريد 5 مغ/كغ/يوم مرة واحدة.

- في حال حصول تسمم بالجانبسيكلوفير أو إخفاق المعالجة به، يستعمل الفوسكارنيه (فوسكافير) وهو يعطى بجرعة 180 مغ/كغ/يوم موزعة على حقتين بشكل مستمر داخل الوريد كل واحدة لمدة ساعة على الأقل، خلال 14 - 21 يوماً، مترافقة مع حقن سيروم فيزيولوجي 1 - 2 لتر/يوم وذلك من أجل إنقاص خطورة الانسمام الكلوي. الاستمرار بهذه المعالجة يتم بإعطاء جرعة 9 - 120 مغ/كغ/يوم وذلك حقناً داخل الوريد مرة واحدة.

- السيدوفوفير (فيستيد) داخل الوريد يحتفظ به للاستعمال في حالة التهابات الشبكية العائدة لفيروس الاندخال الخلوي العرطل الحادث أثناء الإصابة بالسيدا، حيث أن المعالجات السابقة تكون غير مناسبة هنا، وهو يستعمل في حالة عدم وجود قصور كلوي. الجرعة هي 5 مغ/كغ داخل الوريد مرة واحدة/أسبوع لمدة 15 يوماً (معالجة هجومية) ومن ثم يرافق بصورة إجبارية مع البروبيينسيد (4غ عن طريق الفم) وإعطاء سيروم ملحي 2 لتر. السمية الكلوية تتطلب مراقبة مرتين بالأسبوع لبروتين البول وللكرياتينين، هذا ويجب إيقاف هذه المعالجة في حال حدوث سمية كلوية مثبتة. في حالة عدم تحمل هذه المعالجة المذكورة سابقاً أو في حالة فشلها المتكرر، فإنه يمكن استعمال السيدوفوفير (فيستيد) مع البروبيينسيد.

2. الوقاية:

إن حزف الكريات البيض روتينياً من الدم المنقول ينقص من احتمال انتقال المرض عن طريق نقل الدم.

- في حالة زرع الأعضاء:

يجب استعمال طعم مأخوذ من معطٍ تفاعله المصلي لفيروس الاندخال الخلوي العرطل سلبي، ويعطى لآخذ تفاعله المصلي لهذا الفيروس سلبي أيضاً، يجب تطبيق هذا المبدأ في حال نقل الدم أيضاً.

بعد الزرع وفي حال كون التفاعل المصلي إيجابياً، فإنه يوجد احتمال لظهور أعراض سريرية للمرض لذلك يجب إعطاء جانسيكلوفير (سيميفان) داخل الوريد: 5 مغ/كغ/12 ساعة خلال 14 يوماً ومن ثم 6 مغ/كغ/يوم خلال 14 يوماً، 5 أيام/أسبوع، أو زيليتريكس 8 غ/يوم، أي 4 حبات عيار 500 مغ 4 مرات/يوم وينصح بالبدء بهذه المعالجة أبكر ما يمكن بعد زرع العضو.

يجب تكثيف الجرعات حسب قيمة تصفية الكرياتينين.

• عند المريض المصاب بالسيدا:

الوقاية الأولية صعبة التحقيق، الجانسيكلوفير عن طريق الفم كمعالجة وقائية ليس له إلا فعالية ضئيلة. هذا وإن كشف الإنتان بفيروس الاندخال الخلوي العرطل (التهاب الشبكية)، عند المرضى الذين عندهم نسبة الـ $CD_4 > 100/mm^3$ والتفاعل المصلي لفيروس الاندخال الخلوي العرطل إيجابي، يركز على المراقبة الروتينية لقرع العين وللمشعرات الخاصة بالإنتان الفعال لفيروس الاندخال الخلوي العرطل (مولد الضد النووي PP₆₅، أو PCR) وذلك كل 2 - 3 أشهر.

• عند المرأة الحامل أو المحتمل أن تصبح حاملاً، والتي تفاعلها المصلي للفيروس سلبى، يجب أن تتصح بالابتعاد عن المرضى المصابين بالاندخال الخلوي العرطل. هذه الوقاية ينصح بها بشكل خاص للعاملين في دور الحضانة أو المدارس الابتدائية.

5. حميات الحلا الأخرى

تكون المعالجة للأعراض، إلا في الحالات الخطيرة (عسرة البلع، الزلة التنفسية الشديدة، فقر الدم الانحلالي) تتطلب معالجة لمدة قصيرة بالكورتيزونات (بريدنيزون 1 - 1.5 مغ/كغ/يوم خلال 15 يوماً). هذا وإن المضادات الفيروسية لم تثبت فعاليتها في معالجة هذا الداء.

لا يوجد معالجة شافية أو وقائية بما يخص الإنتانات العائدة

للـ 8, 7, 6, H, H.

27 الإبتان بفيرس الـ VIH

تتاذر عوز المناعة المكتسب الإيدز، السيدا

الإبتان بالـ VIH مهما كانت مرحلته فهو مرض يجب الإبلاغ عنه بشكل إجباري.

1. استطببات الفحوص المصلية الخاصة بالـ VIH

يجب عدم القيام بأي فحص مصلي لكشف المرض دون إعلام المريض وموافقته. هذا وإن القيام بالفحوص المصلية الخاصة بالـ VIH يجب ألا تجعلنا ننسى القيام بفحوص الكشف الخاصة بإبتانات أخرى يمكن أن تنتقل، كالتهابات الكبد B و C ومرض الزهري.

1. الحالات التي توجب القيام بالفحوص الاستقصائية بشكل إجباري أو روتيني:

- بشكل إجباري في حالات التبرع بالدم أو الأعضاء أو النطاف.
- يقترح القيام بها بشكل روتيني عند القيام بالفحص الطبي قبل الزواج وعند القيام بأول فحص عند المرأة الحامل. كما يقترح به عند استشارة الطبيب المخدر وذلك قبل القيام بالعمل الجراحي.
- عند الشك بالتعرض للإصابة نتيجة حادث عرضي خلال ممارسة المهنة (عند الأطباء أو الممرضين مثلاً...) أو عند الشخص الذي تعرض لحادث اغتصاب جنسي. يجب إجراء الفحوص السريعة في هذه الحالة.

2. استطببات إجراء فحوص الكشف:

- عند الشخص الذي إيجابية تفاعله المصلي على الـ VIH مرتفعة: سواء كان مثلياً أو طبيعياً، مدمناً على المخدرات عن طريق الوريد، شخصاً ذا علاقات جنسية أو عرضية، وبشكل خاص إذا كان مصاباً بمرض ينتقل عن طريق الجنس، عند الشخص الذي يمارس الجنس مع شخص قادم من

المناطق جنوب الصحراء الأفريقية، من الكارييب أو من مناطق آسيا الجنوبية الشرقية، وعند الشخص الذي يمارس الجنس مع شخص آخر احتمال كونه ذا تفاعل مصلي إيجابي مرتفع، عند حديث الولادة من أم ذات تفاعل مصلي إيجابي، نقل دم أو مشتقاته خاصة في حال تحقيقه قبل شهر آب 1985 أو في حال حصوله في بلد ذي وبائية بالسيدا مرتفعة (جدول 1 - أ).

- أمام علامات سريرية تجعلنا نشك بإلتان عائد للـ VIH.

جدول 1 - أ: الدول ذات الوبائية المرتفعة بالسيدا (أكثر من 1%)

حسب منظمات الصحة العالمية سنة 2000

أفريقيا: أفريقيا الجنوبية، أنجولا، بوسوتانا، بيبان، بوركينافاسو، بوروندي، كامرون، كونغو برازافيل، ساحل العاج، جيبوتي، إيرتريا، إثيوبيا، غابون، غانا، غامبي، غينيا، كينيا، ليبيريا، مالاوي، مالي، موزامبيق، ناميبيا، نيجيريا، نيجر، أوغندا، تشاد، توغو، زامبيا، زيمبابوي.
أمريكا: باهاما، باربادوس، بيليز، غواتيمالا، غويان، هايتي، هاندراس، باناما، الجمهورية الدومينيكية، سورينام، ترينيداد وتوباغو.

آسيا: كامبودجيا، ميانمار، تيبال، تايلاند.

بعض الولايات الهندية بعد إعادة تقويم المعطيات في كانون الأول 2001 (أندهار براديش، كارناتكا، ماهاراشترا، مارينجو، ناجالاند، تاميل نادو).

2. التشخيص السيلولوجي

وهو يعتمد على الكشف عن الأجسام الضدية المضادة للـ VIH، هذا الكشف يتطلب ممارسة تقنيتين على نفس العينة، أحد هاتين التقنيتين هي ELISA مختلطة (تكشف عن الأجسام الضدية المضادة للـ VIH₁ والأجسام الضدية المضادة للـ VIH₂). كل عينة إيجابية يجب أن تؤكد بفحص ويسترن - بلوت (Western-blot) الذي يجري على عينة أخرى. هذا الفحص الثاني المؤكد يسمح بتحديد الفيروس VIH₁ أو VIH₂ (متوضعة بشكل خاص في أفريقيا الغربية حيث تترافق مع VIH₁). فحص الويسترن - بلوت VIH₂ يكشف عن أجسام ضدية موجهة ضد البروتينات السكرية المحفظة (بروتينات سكرية 160، 120، 41)، للبروتينات الجسمية (بروتينات 55، 24، 17) أو الخمائر (66، 51، 31). هذا وإن وجود الأجسام الضدية المضادة للبروتينات السكرية

المحفظية وللبروتينات الجسمية ضروري لتأكيد الاختبار المصلي الإيجابي. الأجسام الضدية تظهر بعد الإصابة بالعدوى بـ 3 - 6 أسابيع. هذا ويمكن إعادة إجراء الفحص في حالة كونه سلبياً، 3 أشهر بعد الإصابة المفترضة، و6 أشهر بعد إصابة مهنية.

في حالة الإنتان الأولي أو في حالة تعرض لإصابة محددة بدقة، من الممكن الكشف عن الفيروس وذلك خلال الفترة التي تكون فيها التفاعلات المصلية صامتة، وذلك إما بعزل الـ ARN-VIH البلازمي (أول كاشف ممكن التقاطه ما بين اليوم الثامن واليوم السابع عشر بعد التعرض للإصابة، ولكن هناك خطورة وجود إيجابية كاذبة، كما هي الحال لجميع الـ PCR) أو عزل مولد الضد P₂₄ في الدم يكون إيجابياً ما بين اليوم 12 إلى 26 ويبقى إيجابياً لمدة 10 أيام).

عند حديث الولادة من أم ذات تفاعل مصلي إيجابي، تشخيص الإنتان بالـ VIH يستند على عزل الفيروس بواسطة تفاعلات بيولوجية جزيئية (ADN خلوي أو ARN بلازمي) مجرات على عينة محققة خلال الأيام الأولى للحياة، وحتى 1 - 3 أشهر. في حالة وجود معالجة مضادة للفيروس خلال الأسابيع الأولى من الحياة، فإن هذه الفحوص يجب إعادتها 4 - 6 أسابيع بعد إيقاف المعالجة. في حال غياب الإنتان، تختفي الأجسام الضدية الآتية من الأم في عمر الـ 15 - 18 شهراً.

3. تصنيفات جدول 2 و جدول 3

جدول 2 - مراحل CDC (تعريف 1993) عند البالغين والبالغين

فئة أ: وجود واحد أو أكثر من الخصائص المذكورة لاحقاً، وفي حال عدم وجود أية خاصية من فئة ب أو ج: إنتان بالـ VIH غير عرضي، إصابة العقد للمقاربة المعمم والدائم، إنتان أولي عرضي.

فئة ب: مظاهر سريرية (الآفة غير محددة) غير موجودة في الفئة ج: ورم دموي عصوي، إصابة البلعوم والحلجرة بالمبيضات البيضاء، إصابة المهبل الدائمة بالمبيضات البيضاء، استئصال العنق (متوسطة أو خطيرة) أو سرطان داخل الخلوي، تكرار خاص يتضمن حرارة < 38.5° أو إسهال < شهر؛ Leucoplasi chevelue طولان شعري للسان، داء منطقة متكرر أو منتشر مترافق مع ورم جلدي، فرغرية نتيجة نقص صفائح مجهول السبب، التهاب ملحقات خاصة إذا كان مختلط بخراج بوقي - مبيضي، اعتلال أعصاب محيطي.

فئة ج: تعني الإصابة بالسيدا: إصابة بالمبيضات الفهائية وفروغها أو المريء، سرطان مخترق للعنق، coccidiomycose مكررات فطرية منتشرة أو خارج رئوية، إصابة بالكريبتوكوك خارج الرئوية، إصابة معوية بالكريبتوسبورويد، إبتنان عائد لفيروس الانتخال الخلوي العرطل (خارج الكبد، الطحال أو العقد للمفاوية)، التهاب الشبكية العائد لفيروس الانتخال الخلوي العرطل (مع فقدان البصر)، التهاب الدماغ العائد للـ VIII، إبتنان جلدي عقبولي مع وجود قرحة مزمنة < شهر واحد، أو قصبي رئوي أو مريئي، إصابة بالهستوبلازما منتشرة أو خارج رئوية، الإصابة المزمنة بالإيزوسبورويد المعوي < شهر؛ مرض كابوزي Kaposi، لمفوما بوركيت Burkitt، أو مناعية قاعدية immunoblastique، لمفوما دماغية بنئية، إبتانات منتشرة عائدة للجراثيم الفطرية (ميكوبلاكتيريا) أمينوم أو كاتسازي أو خارج رئوية، إبتانات عائدة للجراثيم الفطرية السلية مهما كان وضعها (رئوي أو خارج رئوي)، إبتانات عائدة لجراثيم فطرية معزولة أو لا، منتشرة أو خارج رئوية، ذات رئة عائدة للمتكيسات الرئوية كارييني، ذات رئة جرثومية متكررة، التهاب دماغ متعدد البؤر وفي حالة انتشار تدريجي، تجرثم دم متكرر وعائد للسالمونيلا غير التيفية، إصابة دماغية بالتوكسوبلاسموز، هزل عائد للـ VIH.

عندما يحمل شخص إصابة واحدة من هذه الإصابات المذكورة سابقاً فإنه يصنف بشكل نهائي في الفئة ج.

جدول 2 - التصنيف الخاص بالأطفال 1994 (CDC)

التصنيف السريري أ يتقاطع مع التصنيف البيولوجي ب.

أ - التصنيف السريري:

فئة N	غير عرضية	فئة A
أعراض قليلة الشدة، اعتلال عقد لمفاوية، ضخامة كبدية - طحالية، اعتلال جلدي، التهاب الغدة النكفية، إبتانات أنن، أنف حنجرة متكررة أو التهابات قصبية متكررة.	فئة B	أعراض متوسطة الشدة (قائمة غير محددة): إبتنان جرثومي، اعتلال رئوي لمفاوي، نقص الصفائح، فقر دم، نقص الكريات البيض، داء المنطقة، إصابة بالمبيضات أو عقبول قموي متكرر، اعتلال كلوي، إصابة قلبية.
أعراض شديدة: إبتنان انتهازوي Opportuniste، إبتانات جرثومية شديدة ومتكررة، اعتلال دماغي، ورم لمفاوي أو سرطان، هزل.	ب - تقويم درجة نقص المناعة بالاستناد إلى عدد الخلايا اللمفاوية CD4 وذلك حسب العمر (هذا العدد يعطى كقيمة مطلقة أو كنسبة مئوية)	فئة C
ليس هناك نقص مناعي	CD4 %	فئة A
ع م	1500 ≤	1000 ≤
نقص متوسط الشدة	% 24 - 15	% 24 - 15
ع م	1499 - 750	999 - 500
نقص شديد	% 15 <	% 15 <
ع م	750 <	500 <

* هذه القيم ربما تكون أكثر ارتفاعاً عند الطفل الذي عمره أقل من 6 سنوات. العدد الطبيعي للخلايا اللمفاوية CD4 عند الولادة حوالي 3000/مم³.

** ع م = عند مطلق/مم³.

4. المتابعة السريرية والبيولوجية

الفحوص الأولية ومن ثم المتابعة تسمح بتحديد استجابات المعالجة المضادة للفيروس القهقري أنتيريتروفيروال Antirétroviral، والوقاية من الإنتانات الانتهازية وذلك حسب الحالة السريرية، ودرجة تثبيط المناعة (الكريات للمفاوية CD_4)، (جدول 1 وأ)، ومستوى التنسخ أو التكرار الفيروسي (الحمل الفيروسي Charge virale، أو الـ ARN VIH البلازمي).

1. الفحوص الأولية (الفحوص المرجعية)

- العوامل المؤهبة للـ VIH (نمط الحياة، تعدد المرافقين الجنسيين، المدمن، نقل الدم).
 - البحث عن عوامل إمراضية مرافقة والتي من الواجب أخذها في الحسبان في حالة اقتراح المعالجة (سوابق شخصية أو عائلية للإصابة بداء السكري، لارتفاع في شحوم الدم، لارتفاع في التوتر الشرياني أو لمرض إكليلي)، إلمان على التخخين، الكحول أو المخدرات، البحث عن سوابق لأمراض نفسية.
 - فحص سريري: الوزن، فحص الفم، الجلد وأماكن العقد اللمفاوية.
 - فحص نسائي عند المرأة مع أخذ لطاخة من عنق الرحم.
 - فحوص مكملة: تعداد وصيغة مع تعيير مستوى الصفائح الدموية، خلايا لمفاوية CD_4 و CD_8 (النسبة المئوية والقيمة المطلقة) مستوى التنسخ الفيروسي (ARN VIH البلازمي أو المصلي)، الترانس أميناز، كرياتينين، الفحوص المصلية لفيروس التهاب الكبد B و C، للسيفيليس، التوكسوبلاسموز، فيروس الاندخال الخلوي العرطل، والتفاعل الجلدي على السللين Tuberculine، صورة سريرية للصدر.
 - الشرح للمريض عن كيفية انتقال المرض والوقاية الضرورية أو الغير ضرورية خلال الحياة العادية (العلاقة الجنسية، الأسرة، المهنة) وانعكاسات المرض ومتطلباته الخاصة (التأمين والتأمين الصحي).
- المصاب بإبتان الـ VIH مؤمن صحياً 100%.

- عند المريض المدمن على المخدرات يجب تحديد حالة الإدمان عنده، ويجب دراسة إمكانية إيقاف هذا الإدمان بالأدوية المناسبة. المدمن على المخدرات مريض هش نفسياً، ويتقبل بشكل أقل كونه ذو تفاعل مصلي إيجابي (الذي من الممكن أن يولد عنده قلقاً كبيراً)، كما أن متابعته صعبة. وهكذا فإن إعطاء الأدوية الخاصة بإيقاف الإدمان كالسبوتيكس Subutex أو ميتادون يمكن أن تسهل متابعة المريض. هذا ومن المفضل متابعة مريض السيدا المدمن من قبل طبيبين (أخصائي بالسيدا وأخصائي بالإدمان).
- تقويم انعكاسات هذا المرض على المستوى النفسي والاجتماعي والمهني، وتقويم الرغبة بالحمل.

2. المتابعة:

المتابعة السريرية والبيولوجية تكون كل 3 - 6 أشهر وذلك في حال غياب المعالجة المضادة للفيروس القهقري، وتكون أكثر تقارباً في حالة وجود هذه المعالجة (كل 15 يوماً أو كل شهر في بداية المعالجة، ومن ثم كل 3 أشهر في حال كون التحمل السريري والبيولوجي جيداً).

المتابعة البيولوجية الروتينية تتضمن: تعداد وصيغة، صفائح، CD_4 ، ARN VIH، ترانس أميناز، يضاف إليها في حالة المعالجة: الكرياتينين، الليباز، سكر الدم، الكولسترول، تريغليسيريد. ومرة في السنة: فحص نسائي عند المرأة.

يجب إعادة إجراء الفحوص المصلية في حال سلبيةها: التوكسوبلاسماز، فيروس الاندخال الخلوي العرطل، فيروس التهاب الكبد الإبتاني B و C وأحياناً السيفيليس.

في حال تثبط المناعة ($CD_4 < 200$ /مم³) يفضل إجراء متابعة سريرية أكثر تقارباً وذلك من أجل الكشف عن إبتان انتهازية. في حال كون الـ $CD_4 < 50$ /مم³ ووجود فحص مصلي إيجابي بالنسبة لداء الاندخال الخلوي العرطل (مولدات الضد الدمية، PP_{56} ، أو PCR) يجب أن تكرر كل 2 - 3 أشهر. وجود ترفع حروري يتطلب البحث عن الجراثيم الفطرية أفيوم Avium بواسطة زرع الدم.

هدف المعالجة أيضاً تقويم المعالجة المضادة للفيروس القهقري والإجراءات الوقائية المتخذة والانعكاسات النفسية والاجتماعية للإبتان على حياة المريض.

5. الأشكال السريرية والمعالجة للإبتان بالـ VIH باستثناء مضادات الفيروس القهقري

1. الإبتان البدني:

العلامات الخاصة بالإبتان البدني يمكن أن تكون: حمى آلام عضلية، التهاب بلعوم، اعتلال عقد لمفاوية، طفح جلدي، صداع وبشكل أكثر ندرة التهاب سحائي دماغي، التهاب الجذور والأعصاب، ارتفاع في الترانس أميناز، تناذر ارتفاع الكريات الوحيدة النواة... هذا وإن إيجابية التفاعل المصلي لا تترافق مع إبتان بدئي عرضي إلا في 30 - 50% من الحالات. الإبتان البدني الأولي العرضي يشكل استطباب ممكن للمعالجة بالمضادات الفيروسية، على الرغم من أن النسبة ما بين الفائدة/الخطورة الناتجة عن هذه المعالجة ولفترة طويلة لم تثبت بعد.

2. الإبتان المزمن:

بعد اجتياز مرحلة الإبتان البدني فإن التكاثر الفيروسي يكون مستمراً، خلال عدة سنوات (سواء كان عرضياً أو لا باستثناء اعتلال العقد اللمفاوية الرقبية أو الإبطية).

الحمل الفيروسي وعيار نسبة الـ CD_4 يشكلان أفضل مشعرين للتنبؤ بتطور المرض. انخفاض عدد الكريات اللمفاوية CD_4 (بشكل وسطي 50/مم³ في العام الواحد) يتناسب طردياً مع ارتفاع مستوى التنسخ الفيروسي. العلامات الأولية لتطور الصورة السريرية غالباً ما تكون جلدية مخاطية (داء المنطقة، فطور فموية، طولوان شعري صنف B). ولكن من الممكن أن يكون التظاهر المرضي منذ البداية بشكل سريري مصنف في الفئة ج (جدول 2).

3. التظاهرات السريرية المرتبطة بالـ VIH ومرض السيدا:

1. الإصابات الرئوية:

كثيرة الشبوع، وتعود إما إلى إنتان انتهازي (ذات الرئة بالمتكيسات الرئوية كاريبي، السل، وبشكل أكثر ندرة التوكسوبلاسما والفطور)، أو إلى إنتان جرثومي (مكورات عقدية رئوية، هميوفيلوس أنفلونزا، عصيات غرام سلبية)، أو توضع رئوي لمرض كابوزي. إن احتمال الإصابة بسرطان الرئة يزداد عند هؤلاء المرضى.

صورة الصدر الشعاعية ضرورية جداً، ومن الممكن أن توجه التشخيص:

- تتأخر ارتشاحي ما بين الخلوي ومرض المتكيسات الرئوية Pneumocystosc (إذا كانت $CD_4 > 200$ مم³ وفي حال غياب الوقاية بالكونتريموكسازول).
- ارتشاحات عقدية كبيرة أو مجهرية، متكيفة أو لا: سل (مهما كان عيار الـ CD_4) بشكل أكثر ندرة داء النوكارديات.
- تتأخر سنخي: مكورات عقدية رئوية أو هميوفيلوس أنفلونزا، وأحياناً ليجيونيللا.

- تتأخر عقد كبيرة: ساركوم كابوزي، سرطان رئوي.
قياس الإشباع بالأوكسجين ضروري جداً لاتخاذ قرار المعالجة. إشباع ضئيل بالأوكسجين يشير إلى وجود حاجز سنخي شعيري تقاس خطورته بعيار غازات الدم. التنظير القصبي مع غسل قصبي - سنخي يشكل الفحص الأساسي. من ناحية يسمح بفحص مباشر مما يسمح برؤية المتكيسة الرئوية كاريبي ومن ناحية أخرى فإن سائل الغسل القصبي السنخي يجب أن يزرع للبحث عن المسبب الإنتاني (جراثيم فطرية، جراثيم عادية، فطور، فيروس الاندخال الخلوي العرطل).

من الناحية العملية، أمام ذات رئة ذات مظهر إنتاني:

- إذا كانت الصورة السريرية هي صورة ذات رئة فصية واضحة، فإن المعالجة الاحتمالية بالصادات الحيوية تفرض نفسها.

- إذا كانت الصورة السريرية هي صورة ذات رئة ارتشاحية منتشرة مع نقص في أوكسجين الدم فإنه من الضروري البدء بالمعالجة بالكوتريموكسازول بصورة سريعة والقيام بغسل قصبي سنخي في أقرب فترة ممكنة.

1. معالجة أمراض الرئة هي الكوتريموكسازول (باكتريم): تريميتوبريم

15 - 20 مغ/كغ/يوم وسولفاميتوكسازول 75 - 100 مغ/يوم موزع على 3 - 4 جرعات عن طريق الوريد أو الفم (داخل الوريد في البداية أو في حالة عدم التحمل الهضمي)، وذلك لمدة 21 يوماً.

المعالجة بالكورتيزونات (1 مغ/كغ/يوم خلال 5 أيام ومن ثم يجب إنقاص الجرعة تدريجياً) هذه المعالجة تضاف إلى المعالجة الشائعة في حال وجود نقص في أوكسجين الدم ($PaO_2 > 70$ مم زئبقي).

في حال وجود تحسس أو عدم تحمل، فإنه يجب تبديل هذه المعالجة في الحالات القليلة الشدة بالثيميتوبريم - دابسون، الأتوفاكون (ويلفون 750 مغ × 2/يوم) أو في الحالات الشديدة الخطورة بالبينتاميدين داخل الوريد (3 مغ/كغ/يوم) ذو الآثار الجانبية الكثيرة الشيوع والتي غالباً ما تكون خطيرة أو للثريميتريكسات (نوتريكسين 45 مغ/م² مرافق مع حمض الفولينيك 20 مغ/م² كل 6 ساعات).

فعالية هذه المعالجة يحكم عليها سريرياً، وعلى صورة الصدر وغازات الدم، تنظير قصبات جديد لا يقام به إلا في حالة الاستجابة السريرية السيئة وذلك للبحث عن إبتان مرافق كالسل أو إبتان عائد إلى فيروس الاندخال الخلوي العرطل التي يجب أن تؤخذ في الحسبان. المعالجة الوقائية (ضد النكس) ضرورية، وتكون إما بإعطاء الكوتريموكسازول عن طريق الفم 600/80 أو 800/160 (حبة/يوم)، أو في حالة عدم التحمل بإعطاء ضبوب (Aérosol) شهري بنتاكارينا (300 مغ) الأتوفاكون (1500 مغ/يوم) أو الدابسون (50 مغ/يوم مرافق مع بيريميتامين 50 مغ/أسبوع أو 100 مغ/يوم وحيداً) وحمض الفولينيك 25 مغ/أسبوع.

2. عند الإصابة بالسل فإن حساسية الجراثيم الفطرية السلية تكون محفوظة بشكل عام، ولكن فشل المعالجة العائد لنقص المطاوعة، وعدم التحمل الدوائي يكونان أكثر مصادفة عند المرضى المصابين بالـ VIH، هذا وإن خطة المعالجة تكون مماثلة لخطة المعالجة عند الشخص ذو الـ VIH السلبي. مرافقة الريفامبيسين مع مثبطات البروتياز يشكل مضاد استطباب، وهذا يفرض تفضيل الريفابوتين ومضادات البروتياز وذلك لوجود تداخلات دوائية. المعالجة الوقائية الثانوية غير مستطبة عندما تكون الاستجابة للمعالجة الأولية جيدة. ومع ذلك فإنه من الضروري إجراء مراقبة سريرية وشعاعية.

3. الإنتان العائد للجراثيم الفطرية آفيوم داخل الخلية أصبح أقل مصادفة وذلك منذ استعمال المعالجة الثلاثية. وهو يتظاهر كإنتان متعمم، كبدي - طحالي وهضمي وبشكل أكثر ندرة رئوي. هذا الإنتان مقاوم للمضادات السلية العادية. الخطة العلاجية تتضمن مرافقة الكلاريتروميسين (زيكلار) [1 - 1.5 غ/يوم] إيتامبوتول (ميامبوتول) [15 مغ/كغ/يوم] وريفابوتين (إنساتينين) [300 مغ/يوم]. المعالجة الهجومية تكون لمدة 3 - 6 أشهر وتتبع بمعالجة مديدة بواسطة الكلاريتروميسين والإيتامبوتول مدى الحياة وذلك في حال غياب عودة المناعة وعلى الأقل لمدة 12 شهراً في حال ارتفاع الـ $CD_4 < 200/مم^3$. في حال كون الـ $CD_4 > 75/مم^3$ ، الأزيتروميسين (أزدوز) بجرعة 1200 مغ مرة واحدة/أسبوع ينقص من حدوث إنتان منتشر بالجراثيم الفطرية آفيوم، ويمكن استبدال هذه المعالجة بالريفابوتين (إنساتينين) بجرعة 300 مغ/يوم.

2. الإصابات العصبية المركزية:

وهي تعود إلى إصابة مباشرة للجهاز العصبي بالـ VIH أو لإنتانات انتهازية أو لإصابات ورمية، وهي تتظاهر غالباً بأشكال غير نموذجية.

- صداع، اختلاجات، اضطرابات في الوعي، علامات توضع مركزية، اضطرابات نفسية (تخليط، حالة خرف)، هذه الأعراض تتطلب تحقيق

تصوير طبقي محوري بشكل إسعافي من دون حقن مادة ظليلة في البدء ومن ثم مع حقنها.

- عندما يبدي التصوير الطبقي المحوري صور خراجات فهذا يؤدي إلى الشك بالتوكسوبلاسموز الدماغى، على الأخص إذا كانت الـ $CD_4 > 100$ /مم³، وإذا كانت التفاعلات المصلية الخاصة بالتوكسوبلاسموز إيجابية، وإذا كان المريض لا يأخذ معالجة وقائية بالكوتريموكسازول، هذه الصور تتطلب معالجة خاصة (بريميتامين - سلفاديازين - حمض الفولينيك) بصورة إسعافية. وفي حال غياب التجاوب السريري أو الشعاعي (بعد 15 - 21 يوماً) فإن التشخيص الأكثر احتمالاً هو الورم اللمفاوي (لمفوما Lymphome) وإثباته يكون بأخذ خزعة.

- صور كثافات ضحلة (أو قليلة الكثافة) تؤدي إلى الشك بالتهاب بيضاء الدماغ المتعدد البؤر ذو التطور التدريجي، أو التهاب الدماغ والسحايا تحت الحاد الفيروسي (العائد للـ VIH، لفيروس الاندخال الخلوي العرطل، أو لفيروس الحلا). المرنان المغناطيسي أكثر حساسية والتشخيص يتم بدراسة السائل الدماغى الشوكي (فيروسات الاندخال الخلوي العرطل، الحلا، ARN VIH).

- التناذر السحائي أو في حال كون التصوير الطبقي المحوري للدماغ طبيعياً نجعلنا نبحث عن الكريبتوكوك في السائل الدماغى الشوكي (الحبر الصيني، مولدات الضد، الفحص المباشر + الزرع)، وفي الدم (مولد الضد). هذا ويمكن أن تعود الإصابة هنا إلى السل، الليستيريا أو السيفيليس.

- في حال وجود إصابة نخاعية شوكية مرافقة يجب أن نجعلنا نبحث عن إصابة بفيروس الاندخال الخلوي العرطل، أو فيروس الحلا (PCR) أو التوكسوبلاسموز.

معالجة التوكسوبلاسموز الدماغى تكون بمرافقة - عن الطريق الفموي - للسلفاديازين (أديازين) [4 - 6 غ/يوم، مع جعل البول قلوي] - بيريميتامين (مالوسيد) [100 مغ في اليوم الأول ومن ثم 50 - 75 مغ/يوم] مع حمض

الفولينيك [25 مغ/24 سا - 48 سا]. في حال عدم تحمل السلفاميدات، فإنه يجب اقتراح الكلينداميسين (دالاسين) [1.8 غ إلى 3.6 غ/يوم عن طريق الفم أو الوريد]. المعالجة الهجومية لمدة 6 أسابيع، تتبع بمعالجة دائمة بنصف الجرعة وذلك مدى الحياة. هذا وإن عودة ارتفاع الـ CD₄ الدائم والهام يمكن أن يسمح بإيقاف المعالجة الوقائية الثانوية عند المرضى المصابين بالتوكسوبلاسمازول الدماغية.

المعالجة الوقائية الأولية بواسطة الكوتريموكسازول عند الشخص الذي عنده تفاعل مصلي إيجابي للتوكسوبلاسمازول ضرورية في حال كون الـ CD₄ >100/مم³ (باكتريم قوي حبة/يوم). ويمكن إيقاف هذه المعالجة في حالة ارتفاع الـ CD₄ لأكثر من 200/مم³. في حال عدم تحمل السلفاميدات فإننا نقترح مرافقة الدابسون (50 مغ/يوم) وبيريميتامين (50 مغ/أسبوع) مع حمض الفولينيك (25 مغ/أسبوع). في حال عدم تحمل الدابسون فإننا نقترح استعمال البيريميتامين وحيداً (50 مغ 3 مرات بالأسبوع مع حمض الفولينيك).

3. الإصابات الهازمية:

الإسهال المزمن، المترافق بدم أحياناً، يجب أن ينفعا للبحث في الغائط عن جراثيم (سالمونيلا، كاميلوباكتر، كلوستريديا، ديفيسيل وسمها) أو عن طفيليات (كريبيتوسبورديس، ميكروسبورديس، إيزوباريللي). داء الكريبيتوسبورديوز يتحسن أحياناً باستعمال الباروموميسين (هوماتان) أو النيتازوكسانيد (كريبيتاز). أما بالنسبة للميكروسبورديوز فإن "الزيتيل" فعال على الأونسيفاليتوزون المعوية بينما الفوماجيلين فعال على عصيات بينوزي. في حال كون فحص الغائط سلبياً، فإن تنظير الكولون مع أخذ خزعة وعينات بيولوجية يكون ضرورياً، ويجب البحث عن آفات التهاب معوي كولوني نخرية عائدة لفيروس الاندخال الخلوي العرطل، عن آفات كابوزي أو الجراثيم الفطرية.

يجب فحص الفم بعناية، والبحث عن التهاب اللثة أو عن آفة ورمية لثوية، عن آفات فموية عائدة للمبيضات وعن طلوان شعري على حافة اللسان. العناية بالأسنان يجب أن تكون نموذجية، المعالجة بالفلوكونازول ضرورية في حالة كثرة تكرار الإصابة بالمبيضات وفي حال عدم فعالية المعالجة الموضعية.

عسرة البلع تدعو للشك بإصابة المري بالمبيضات، أو بوجود تقرحات مريئية عائدة لفيروس الاندخال الخلوي العرطل أو لفيروس الحلا، التشخيص يتم بالتظير العلوي هذا الفحص يكشف أيضاً عن وجود آفات أخرى كآفات كابوزي أو التهاب اللثني عشري (أخذ خزعة هنا هو بهدف البحث عن كريبتوسبورديس، جراثيم فطرية أو فيروس الاندخال الخلوي العرطل).

4. الإصابات الجلدية المخاطية:

متعددة، وغالباً ما يوجد أكثر من إصابة في آن واحد، وغالباً ما تكون التظاهر السريري الذي يؤدي لاكتشاف الإصابة بالسيدا. التهاب الجلد المني Séborrhéique والحكة المنتشرة كثيرة الانتشار في مرحلة المرض البكرة. الإصابة بالمبيضات للطلوان الشعري تعد الآفة الأكثر شيوعاً، مثلها مثل ساركوم كابوزي، داء المنطقة، وداء الحلا. هذا وإن كثرة الإصابة بالأورام اللقمية (Condylomes) الشرجية التناسلية العائدة لفيروس البابيوم تبرر اللجوء إلى البحث الروتيني عنها، خصوصاً أنها يمكن أن تتطور نحو عسرة تنسج شديدة لعنق الرحم أو للشرج والتي من الممكن تحولها إلى سرطان.

5. الإصابات العينية:

الكشف عنها يتم بإجراء فحص قعر العين، ولكن إجراؤه يكون ضرورياً خاصة عند وجود علامات إصابة عينية عند المريض أو في حال وجود فيروس الاندخال الخلوي العرطل بفحص الدم. العقد القطنية تشير إلى التهاب أوعية غير محدد وليس لها قيمة لتحديد إنذار المرض.

التهاب الشبكية يعود إلى فيروس الاندخال الخلوي العرطل، وبشكل أكثر ندرة إلى التوكسوبلاسموز عند الأشخاص الذين عندهم الـ CD₄ > 50 - 100/مم³. أصبحت هذه الإصابة نادرة منذ المعالجة الثلاثية. تصوير الشرايين الشبكية يمكن أن يساعد على وضع التشخيص التفريقي. في حال وجود التهاب شبكية عائد لفيروس الاندخال الخلوي العرطل فالبدء بالمعالجة يجب أن يكون سريعاً (وذلك لوجود خطر تطور هذه الإصابة نحو فقدان

البصر). نخر الشبكية الحاد (بفيروس الحلا، أو فيروس الاندخال الخلوي العرطل) يكون أكثر ندرة.

معالجة الإبتان العائد لفيروس الاندخال الخلوي العرطل تتضمن مرحلة هجومية ومرحلة معالجة الصيانة. المعالجة الهجومية للإصابة بفيروس الاندخال الخلوي العرطل والتي مدتها 3 أسابيع (أنظر فصل 26 الإبتانات العائدة لفيروس الحلا) تكون بواسطة الجانسيكلوفير داخل الوريد (سيميفان) أو بالفوسكارنيه (فوسكافير). الفالجانسيكلوفير أو الروفاليست والتي هي مستحضرات جديدة للجانسيكلوفير فعاليتها مماثلة عن طريق الوريد بجرعة 900 مغ مرتين/يوم كمعالجة هجومية ومرة واحدة في اليوم لمعالجة الصيانة.

في حالة عدم تحمل هذه المعالجة أو فشلها المتكرر، يمكن أن نلجأ إلى استعمال السيذوفوفير داخل الوريد (فيسيتيد)، أو إلى الحقن داخل الازجاجي للجانسيكلوفير الذي لا يمنع انتقال الإصابة إلى العين الأخرى أو إلى عضو حشوي. الاختلاط الأكبر للجانسيكلوفير هو نقص الكريات البيض، مما يتطلب إعطاء عامل النمو (G-CSF، GM-CSF). الفوسكافير والفيسيتيد لهم أثر سمي كلوي، مما يتطلب اتخاذ احتياطات عند إعطائهما والقيام بمراقبة هامة.

عند المرضى المعالجين بمضادات الفيروس القهقري يجب إجراء مراقبة فعالة ومستمرة للحمل الفيروسي المصلي، ومراقبة الارتفاع المستمر للـ CD4 $< 100 - 150 / \text{مم}^3$ ، هذا ومن الممكن إيقاف معالجة الصيانة على شرط إجراء مراقبة صارمة لقعر العين.

6. الإصابات الدموية:

اللمفومات الغير هودجكينية تتميز بتوضعات خارج عقدية، وبظواهرات تشريحية مرضية ذات خبائة عالية وإنذار سيئ. هذا وإن ازدياد حجم عقدة لمفاوية ما وصلاتها بفرضان استئصال هذه الغدة وأخذ خزعة منها.

إن نقص الكريات البيض، ونقص الكريات اللمفاوية كثيرا الشيع ويتناسبان مع تطور المرض. نقص الصفيحات الدموية ذو الآلية المناعية، كثير المصادفة في مرحلة أبكر للإبتان. في الحالات الإسعافية (نزف)، من الممكن اللجوء إلى

مرافقة الغلوبولينات المناعية داخل الوريد (2غ/كغ موزعة على 2 - 5 أيام) ونقل الصفائح. هذا ويستطب استئصال الطحال في حال وجود نقص صفائح كبير $>30000/\text{مم}^3$ عرضي وذلك بعد فشل معالجة دوائية لمدة 6 أشهر (معالجة مضادة للفيروس القهقري أو معالجة كورتيكوستيرويدية).

7. الترفعات الحرجية المستمرة والغير معروفة السبب:

شائعة وخاصة في مرحلة الإصابة بالمرض (السيدا)، وسببها يتعلق بدرجة تثبط المناعة.

- إذا كانت الـ $\text{CD}_4 > 100/\text{مم}^3$: إنتان بجراثيم فطرية غير نموذجية (يجب إجراء زرع دم، وأخذ خزعة) أو إنتان بفيروس الاندخال الخلوي العرطل (فحص قعر العين، البحث عن الفيروس في الدم)، السل، لمفوم (تصوير طبقي محوري للصدر والبطن).
- إذا كانت الـ $\text{CD}_4 < 100/\text{مم}^3$: سل، لمفوما، هو دجكين.
- في كل الحالات يجب ألا يغيب عن البال سبب دوائي أو حمى عائدة لمرض سرطاني.
- في المناطق الموبوءة (المتضمنة المنطقة الجنوبية الشرقية من فرنسا)، ومهما كانت درجة تثبط المناعة، يجب البحث عن الليشمانيا الحشوية.
- عند المدمن على المخدرات، يجب البحث عن التهاب شغاف القلب الإنتاني.

8. مرض كابوزي Kaposi:

عند المريض غير المعالج بالأدوية المضادة للفيروس القهقري، المعالجة بمضادات الـ VIH تشكل المعالجة الأكثر فعالية (استجابة خلال بضعة أشهر)، في حالة وجود مرض كابوزي جلدي ومزيج، يمكن اقتراح معالجات موضعية إضافية: لازر، معالجة كيميائية داخل خلوية (فينبلاستين) أو معالجة شعاعية. تستطب المعالجة الكيماوية السامة للخلايا في حالة وجود شكل ذو تطور سريع ومنتشر للمرض أو في حالة وجود توضع حشوي. الدونوروبيسين لليبوزومال (دونوكسوم) والدوكسوروبيسين لليبوزومال (كالكس) يحققان أفضل

نسبة ما بين الفعالية/التحمل الدموي. الدوسيتاكسيل (تاكسوتير) والباليتاكسيل (تاكسول) يحتفظ باستعمالها لأشكال مرض كابوزي الحشوية أو المنتشرة والمقاومة للأنتراسيكلين.

6. الوقاية من الإنتانات الانتهازية (16)

1. الطرق الأساسية للوقاية من الإنتانات الانتهازية (أنظر جدول 3).
2. إيقاف الوقاية وعودة إدخالها:

عندما يسمح إعادة تكوين المناعة بزيادة عيار الـ $CD_4 < 200/mm^3$ (و) 15% خلال 3 أشهر فإن الوقاية الأولية (خاصة من المتكيسة الرئوية والتوكسوبلاسموز) يمكن إيقافها. هذا ويجب أن نكون أكثر حذراً في حال إيقاف الوقاية الثانوية (للتوكسوبلاسموز والكريبيتوكوك) حيث يجب أن ننتظر 6 أشهر بدل 3.

جدول 3 - الوقاية الأولية والثانوية من الإنتانات الانتهازية

العامل المسبب	الحالة الأولية	الوقاية الأولية الدواء	الوقاية الثانوية الدواء
المتكيسة الرئوية	$CD_4 < 200/mm^3$	كوتريموكسازول حبة/يوم عيار 800/160 أو 400/80 مغ	معادل للسابقة
		دابسون 50 مغ/يوم مدلواة بالبخ الهوائي للبنتاميدين 300 مغ/شهر	
		أتوفلاكون 1500 مغ/يوم	
توكسوبلاسم	$CD_4 < 100/mm^3$	كوتريموكسازول حبة/يوم عيار 800/160 أو 400/80 مغ	بيريميتامين 25 - 50 مغ/يوم + (سلفاديازين 2 غ/يوم أو كلينداميسين 1.2 غ/يوم) + حمض الفوليك 25 مغ/يوم
عصيات كوخ	IDR $< 10/mm^3$	إيزونيايد - ريفامبيسين 3 أشهر	غير مفيدة
مُعدي		ريفامبيسين - بيرازيناميد شهرين	

جراثيم فطرية	CD ₄ > 50 -	أزيتروميسين/حيثين/اسبوع عيار	كلاريتروميسين 1غ/يوم + إيتامبوتول 15 مغ/كغ/يوم
أفيوم داخل الخلية	70/م ³	600 مغ ريفابوتين 300 مغ/يوم	
فيروس الاندخال الخلوي العرطل		غير مستطبة (مراقبة قعر العين كل شهرين)	فالكانسيكلوفير عن طريق الفم 900 مغ/يوم فوسكارنيه داخل الوريد 120 مغ/كغ/يوم جانسيكلوفير داخل الوريد 5 مغ/كغ/15 يوم خلال 7 أيام سندوفوفير داخل الوريد 5 مغ/كغ/15 يوم (فقط في حال التهاب الشبكية)
كريبتوكوك	غير مستطبة	فلوكونازول 200 مغ/يوم	
المبيضات	غير مستطبة	فلوكونازول 100 - 200 مغ/يوم في حالة النكس المتكرر	
الحلأ		فالاسيكلوفير 1000 مغ/يوم إذا كان الحلأ ذو خطورة كبيرة وإذا كان متكرراً 4 - 6 مرات/عام	

7. الملقحات عند الأشخاص ذوي التفاعل المصلي الإيجابي

هناك مضاد استطباب للقاح الـ BCG مهما كان الوضع المناعي، اللقاح anti-amaril. ممكن إجراؤه في حال غياب تثبيط مناعي شديد (CD₄ < 200/مم³) هذا وقياس مستوى الأجسام الضدية مرغوب به بعد اللقاح. الحالة المصلية فيما يتعلق بالتهابات الكبد A و B يجب أن تكون معروفة، وفي حال وجود عدم حماية، فإن اللقاح المضاد لالتهاب الكبد B و A منصوح به. اللقاحات المضادة للكرزاز، للدفتيريا ولشلل الأطفال المضعفة يمكن أن تعطى. اللقاحات المضادة للمكورات الرئوية وللنزلات الوافدة غير متفق على أهميتها، هذا وعند الأشخاص الذين من غير الممكن عندهم قياس الحمل الفيروسي فإنه من الممكن إعطاء اللقاح المضاد للنزلة الوافدة.

8. المعالجة المضادة للفيروس القهقري Antiretroviral

1. استطببات الأدوية المضادة للفيروس القهقري:

- استطببات البدء بالمعالجة في سنة 2003 أكثر تحديداً منها سابقاً، وذلك نظراً لآثارها الجانبية الاستقلابية الضارة الملاحظة عند المعالجة لمدة طويلة (اضطرابات في توزيع الشحوم، اضطرابات في شحوم الدم، مقاومة للأنسولين).

وهكذا فإننا نأخذ في الحسبان الاستطببات التالية:

- المرضى العرضيين (سيداء، فئة B).
- المرضى غير العرضيين الذين عيار الـ CD_4 عندهم أقل من 200/مم³.
- عند المرضى غير العرضيين الذين نسبة الـ CD_4 عندهم ما بين 200 - 350/مم³. المعالجة ممكنة هنا ولكنها قابلة للنقاش أمام كل حالة ويجب أن نأخذ في الحسبان أهمية وجود منحنى صاعد لتطور الـ CD_4 وللحمل الفيروسي وذلك لاقتراح المعالجة.
- في حال كون الـ $CD_4 < 350$ /مم³، فإنه لا يوجد إطلاقاً استطببات لهذه المعالجة باستثناء الحالات التي يوجد فيها تظاهرات سريرية.
- المعالجة الأولى تكون ثلاثية وهي تضم:
 - دوائين من النوكليوزيد ودواء من مثبطات البروتياز.
 - أو دوائين من النوكليوزيد ومثبط غير نوكليوزيدي للترانسكربتاز المعاكس.
 - أو 3 أدوية من النوكليوزيد (إذا كان الحمل الفيروسي أقل من 100000 نسخة/مل).
- هذا وتعديل المعالجة في حال وجود سمية أو عدم تحمل، أو فشل فيروسي بدئي (نقص أقل من Pog-1 للحمل الفيروسي بعد شهر من المعالجة) أو تجاوب فيروسي غير دائم (ازدياد الحمل الفيروسي على عينتين متتاليتين).

في حال إبدال المعالجة بسبب فشل فيروسي، فإن القيام باختبار محدد للجينات المقاومة يمكن أن يسمح باختيار معالجة أفضل مع الاحتفاظ بنفس الوقت بأدوية أخرى لاستعمالها في المستقبل.

- عند الأشخاص الذين يوجد عندهم نجاح في الاستجابة المناعية - الفيروسية بعد أول استعمال للمعالجة الثلاثية المتضمنة دوائين من النوكليوزيد ودواء وحيد من مثبطات البروتياز، فإنه من الممكن تبديل الدواء المثبط للبروتياز بدواء مثبط للترانسكريبتاز المعاكس والغير نوكليوزيدي أو بالأبأكافير من دون خطورة حدوث مقاومة فيروسية.
- عند المرأة الحامل: المعالجة يمكن أن تستطب إما بسبب الحالة المناعية - الفيروسية للأم، أو فقط بهدف الوقاية من انتقال العدوى من الأم إلى الطفل. اتخاذ قرار المعالجة صعب هنا ويجب أن يأخذ في الحسبان العلاقة ما بين الفائدة/الخطورة، تتطلب هذه المعالجة شرحاً هادفاً للمرأة الحامل مذكرين أنه لا يوجد ضمانة مطلقة لعدم وجود سمية لمدى طويل.
- في حالة التعرض للإصابة نتيجة حادث.
- في حالة الإنتان بالـ VIH_2 ، المعالجات غير مقررّة بعد، لأن هذا الإنتان نادر في بلادنا. والأدوية المثبطة غير النوكليوزيدية للترانسكريبتاز المقلوب غير فعالة على الـ VIH_2 ، من الممكن استعمال الأدوية الأخرى.

2. النوكليوزيد والنوكليوتيد المضادة للـ VIH:

النوكليوزيدات تتفاعل بإيقاف الترانسكريبتاز المطلوبة، وهي تتطلب فسفرة ثلاثية حتى تكون فعالة، على عكس النوكليوتيد الذي يخضع لمرحلة فسفرة واحدة على الأقل. هذا وبوصفها مترافقة، فإن مفعولها يتناسب طردياً مع تركيزها، وهذا ما يسمح بأخذها بعدد مرات أقل يومياً.

الجدول 4 - يذكر بالآثار الجانبية الخاصة وخصائص المراقبة.

- فرط الحساسية: الزياجين Ziagen مسؤول عن حوادث فرط حساسية يمكن أن تكون مميتة في حالة إعادة استعماله. هذا ويجب إعلام المريض بوجود هذا الخطر. فرط الحساسية هذه تحدث - مهما كان عمر المريض - في 4% من

الحالات وذلك خلال الأسابيع الستة الأولى من المعالجة. والأعراض تتجلى بترفع حروري، طفح، زلة تنفسية. هذا وينصح المريض بأن يستشير الطبيب إسعافياً في حالة حدوث هذه الأعراض. إن إيقافاً متعسفاً من دون استشارة طبيب أخصائي يمنع إعادة إدخال هذا النواء في المعالجة.

- تشوهات ميتوكوندرية: إن مفعول النيوكلويد يكون على الغامبوليميراز الخاصة بالـ AND الميتوكوندري، وهي مسؤولة عن آثار جانبية من الممكن تراكمها لتعطى بدرجات مختلفة انحلالات عضلية، التهابات بانكرياس واعتلالات عصبية، تشحمت كبدية وارتفاع في اللاكتات الدموية. هذا الاختلاط الخطير تسببه كل النيوكلوزيدات وكل النوكليوتيدات.

الحماض اللبني نادر الحدوث، ولكنه مسؤول عن نسبة وفيات تقارب الـ 50% من الحالات في حال حدوثه. وهناك دواءان هما Zerit و Videx يسببان أكثر من غيرهما حماضاً لبنياً. الأمر ينطبق على الريبافيرين عند إعطائه من أجل معالجة إنتان مرافق بالـ VHC.

في البداية تكون العلامات السريرية ناقصة، حيث تبدو كعلامات دعت عام، تسرع في التنفس، مترافق مع اضطرابات هضمية، التحليل الجيد لشوارد الدم يظهر نقصاً غير مفسر للاحتياطي القلوي وهذا يجب أن يدفع إلى عيار اللاكتات. إعطاء السكر والإيقاف المؤقت للمعالجات بمضادات الفيروس القهقري يجب القيام به وفي نفس الوقت يجب نقل المريض إلى قسم العناية المشددة.

- المقاومة للنوكليوزيد والنوكليوتيد: في حال حدوث مقاومة فيروسية خلال المعالجة بالنوكليوزيد، فإن وجود تحولات كبيرة أو صغيرة في الرموز الخاصة المتوضعة على البوليميراز الفيروسي يدعو إلى الافتراض بأن فعالية الدواء أصبحت أقل أو معدومة. غياب هذه التحولات لا يسمح بالاعتقاد بفعالية هذه الأدوية إذا كان المريض قد تعرض لها سابقاً.

3. المثبطات الغير نوكليوزيدية للترانسكربتاز المقلوبة:

- هناك مستحضرين متوفرين حالياً: النيفيرابين والإيفافيرينز المتميز بنصف

حياة مصلية طويلة جداً وبالتالي بنصف حياة طويلة داخل الخلية مما يسمح بأخذها مرة واحدة في اليوم. هذه المعالجة تحتاج لمراقبة صارمة في البداية، هذا ويجب البدء بنصف جرعة بالنسبة للنيفيرابين (200 مغ/يوم) خلال أسبوعين ومن ثم 400 مغ/يوم). الإيفافيرينيز (600 مغ/يوم) يوصف بجرعة واحدة مرة واحدة مساءً قبل النوم. هذا ويجب أن يُعلم المريض بإمكانية حصول عدم تحمل لهذه الدوائين في البداية.

التفاعلات ما بين هذه الأدوية وما بين السيوكروم P_{450} تفسر تفاعلاتها مع الأدوية الأخرى.

• التحمل لهذه الأدوية (جدول 4).

النيفيرابين وبشكل أقل الإيفافيرينيز يمكن أن تؤديان إلى حصول حوادث مناعية - تحسسية (جلدية أو كبدية) أحياناً خطيرة (تتأخر لآيل أو التهاب كبد صاعق). الإيفافيرينيز سام للأعصاب ويمكن أن يؤدي - خاصة عند بدء العلاج - إلى حدوث دوار وهلوسات، وأحياناً إنباطات يمكن أن تؤدي إلى الانتحار.

• المقاومة لهذه الأدوية:

الطفرات الحاصلة تؤدي بصورة عامة إلى فقدان فعالية هذه الأدوية، هذا ومما يسهل حصول هذه الطفرات هو المراقبة السيئة وذلك يعود إلى فترة نصف حياتها الطويلة وإلى طول فترة الخطورة عند المعالجة الوحيدة الدواء. وأخيراً عند إيقاف الدواء لفترة محدودة فإنه من المفضل متابعة إعطاء النوكليوزيدات لمدة 8 - 10 أيام بعد إيقاف المثبطات الغير نوكليوزيدية وذلك لتجنب توليد المقاومة.

4. مثبطات البروتياز:

1. لعبت هذه الأدوية دوراً بارزاً في تراجع هذا المرض. وتتميز مركباتها بتوفر بيولوجي (biodisponibilité) متقاربة وغالباً ضعيفة. الاستقلاب كبدي عن طريق السيوكروم P_{450} . الريتونافير له مفعول مثبط للسيوكروم وهو يستعمل مترافقاً مع أدوية أخرى مثبطة للبروتياز وذلك لزيادة تركيزها القمي أو المتبقي ولإنقاص عدد مرات أخذها وبالتالي لتحسين المعالجة بها.

2. تحمل مثبطات البروتياز:

عدم التحمل لهذه العائلة الدوائية يكون هضماً بشكل أساسي (غثيان، إسهالات)، وهي أكثر مصادفة مع الأمبينايفير والنيلفينايفير. الأندينايفير يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع في بيليروبين الدم إلى مغص كلوي وإلى مشاكل جلدية.

كل أدوية هذه العائلة يمكن أن تؤدي إلى ظهور داء سكري كامن خاصة في حالة وجود سوابق عائلية. كل أدوية مثبطات البروتياز تؤدي إلى فرط شحوم الدم.

- ارتفاع التريغليسيريدي في الدم، خاصة عند استعمال الريتونايفير ولو بجرعات قليلة. هذا وإن تناول الكحول يزيد من ارتفاع التريغليسيريدي، هذا الارتفاع لا يحمل خطورة إلا في حالات بلوغه مستويات عالية.

- ارتفاع الكوليسترول مع فرط الـ LDL وانخفاض الـ HDL، وبالطبع يجب أن يؤخذ هذا الارتفاع بعين الاعتبار خصوصاً عند ترافقه مع عوامل خطر وعائلية أخرى (سوابق عائلية لاحتماء عضلة القلب، تدخين، ارتفاع توتر شرياني، سكري...).

هذا وتوجد آثار جانبية أخرى:

- احتمال حصول أورام دموية بزداد عند المصابين بمرض الناعور.
- ازدياد مسافة الـ Q-T خصوصاً عند استعمال اللوبينايفير والنيلفينايفير.
- الحذر واجب عند الأشخاص الذين عندهم سوابق حصول دعت أو سوابق عائلية لموت مفاجئ، أو في حالة أخذهم في نفس الوقت لأدوية أخرى تزيد من طول الـ Q-T.

3. التفاعلات مع الأدوية الأخرى.

في حال وصف الأدوية المثبطة الغير نوكلوزيدية للترانسكريبتاز المنقلب مع مثبطات البروتياز فإن نتائج الحركة الدوائية غير أكيدة. ترافق واحد أثبت فعاليته: لوبينايفير وإيفايفيرينز، مما يفرض زيادة جرعة اللوبينايفير (4 حبات مرتين/يوم).

4. المقاومة للأدوية المثبطة للبروتياز:

مثل كل الأدوية المضادة للفيروس القهقري، فإن طفرات صغيرة وكبيرة للـ VIH على البروتياز يمكن أن تؤدي إلى إبطال مفعول أدوية هذه العائلة.

هذا وإن عدد هذه الطفرات ونمطها يدرسان بواسطة تحليل جيني génotypage ومن المهم أخذ هذا التحليل بالحسبان قبل البدء بتغيير المعالجة. في حال حدوث مقاومة منذ البداية لهذه الأدوية فإنه من المفضل القيام بتحقيق عام يتضمن الاستجواب (أخذ الدواء، التفاعلات ما بين الأدوية)، التحليل الجيني والعيار المصلي للأدوية. إن زيادة جرعة الدواء قد تؤدي أحياناً في بداية العلاج إلى جعل الحمل الفيروسي غير قابل للكشف من جديد.

جدول 4 - الآثار الجانبية الأساسية لمضادات الفيروس القهقري وللأدوية المضادة للمسيذا قواعد المراقبة

نمط عدم التحمل	الأدوية	خصائص المراقبة وخطة المعالجة
عدم تحمل جلدي	سلفاميدات ++ فيرامون ++ سوستيفا أجينيروز	
فرط التحسس	زياجين	متابعة شديدة في الأسابيع الأولى
سمية دموية	سلفاميدات رينتروفير	تعداد وصيغة في بداية المعالجة
عضلية	جانسيكوفير	تعداد وصيغة
اضطرابات في تخثر الدم	رينتروفير	CPK في البداية
عصبية	مثبطات البروتياز	في حالة الإصابة بمرض الناعور؛ خطورة نزف
- مركزية (دوار، اضطرابات في النوم)	سوستيفا	متابعة سريرية بعد 15 يوم من بدء المعالجة ومن ثم كل شهر في البداية
- محيطية	ريميفون	خصائص ذاتية، مراقبة للمنعكسات العظمية اللوتكية
	زيريت	خصائص ذاتية
	فيديكس	خصائص ذاتية
	هيفيد	خصائص ذاتية
سمية كبدية	ريميفون	ترانس أميناز في بداية المعالجة
	بيريلين	ترانس أميناز في بداية المعالجة
	فيرامون	البدء بجرعة قليلة تزداد فيما بعد
		ترانس أميناز في بداية المعالجة
	سوستيفا	ترانس أميناز في بداية المعالجة
فرط بيليروبين الدم	فيديكس	لبياز في بداية المعالجة
	زيريت	لبياز في بداية المعالجة
	بنتاميدين	لبياز في بداية المعالجة

إسهال	فبراسبيت أجينييراز ريتافيير فينيكس	
سمية قلبية		
اعتلال العضلة القلبية	ريتروفير	سريرية وإيكوكلي في حالة وجود أعراض
تطاول في مسافة Q-T	بنتاميدين	E.C.G
	كاليترا ومثبطات	E.C.G في حالة وجود دعت وخفقات وفي
	البروتيياز	حال وجود سوابق موت مفاجئ في العائلة
	كينولون	E.C.G في حالة مرافقته مع أدوية أخرى
كلوية	فيريدا	اعتلال الأنيبيب الكلوية، مراقبة بروتين البول،
	كريكسيفان	فوسفور الدم، سكر البول، كرياتينين الدم
		إمكانية حدوث حصيات بولية، يجب إعطاء
		سوائل
	فوسكارنيه	إعطاء سوائل
	سيدوفوفير	إعطاء سوائل
	سلفاميد	إعطاء سوائل
اضطرابات استقلابية		
- اضطراب شحوم الدم	كل مثبطات البروتياز ما عدا الألتازانافير	مراقبة التري غليسريد - كولسترول كل 3 أشهر
	كل مثبطات البروتياز	مراقبة سكر الدم كل 3 أشهر
- حثل شحمي	مثبطات البروتياز كل التوكليوزيدات (خاصة الزيريت، الفينيكس) مرافقة مع مثبطات البروتياز	مراقبة سريرية

جدول 5 - خطة مرافقة مثبطات البروتياز مع الريتونافير

(100 مغ مرتين/يوم) وذلك لزيادة التأثير الدوائي

ساكينافير أو إينفيراز	1000 مغ × 2/يوم
	يمكن إنقاصه إلى 800 مغ × 2 عند بعض المرضى بعد معايرته
أندنافير أو سريكسيفان	800 مغ × 2/يوم
	ممكن أن ينقص إلى 600 مغ × 2
	حتى إلى 400 مغ × 2 عند بعض المرضى
امبريتافيير أو أجينييراز	600 مغ × 2/يوم
فوسامبر ينافيير	700 مغ × 2/يوم
	أو 1400 مغ مرافقة مع 200 مغ ريتونافير × 1/يوم
لوبينافير أو كاليترا	مرافقة ثابتة (3 حبات × 2/يوم)

28. الأمراض العائدة لعوامل قابلة للانتقال غير مألوفة

(ATNC) (*) الإجراءات الوقائية في المشافي

العوامل المسؤولة عن التهابات الدماغ الإسفنجية الشكل تحت الحادة القابلة للانتقال (ESST) (***) والتي من ضمنها نذكر مرض كروزفيلت - جاكوب Creutzfeldt-Jacob، وشكله الجديد الآخر، كلها جُمعت تحت عنوان "عوامل قابلة للانتقال غير مألوفة" (ATNC).

الـ ESST حيوانية كانت أو إنسانية، هي عبارة عن أمراض استحالية للجهاز العصبي المركزي، قابلة للانتقال، غير معدية، ذات فترة حضانة طويلة، بل أحياناً طويلة جداً، ذات تطور تحت حاد، مميت دائماً.

الـ ATNC هذه تكون شديدة المقاومة لعدة إجراءات فيزيائية وكيميائية هادفة لإزالة مفعولها (جدول - 1). وحده ترميد المواد المستعملة للعناية في المشافي والفضلات الناتجة عنها، يضمن الإبادة الكاملة للقدرة الخمجية لهذه العوامل.

1. الاحتياطات

حددت الوقاية من الـ ATNC في فرنسا، بالتشريع DGS-5C-DHOS-138-2001-F2 الصادر في 14/03/2001. هذا ومن الضروري الأخذ بالحسبان منذ الآن الشكل الجديد الآخر لمرض كروزفيلت - جاكوب. هذه الاحتياطات تستند:

- على اتخاذ إجراءات الوقاية ذات المستوى الأكثر علواً، والمتناسبة مع الإمكانيات الطبية المتوفرة، مع حالة المريض، مع طبيعة التدخل الجراحي ومع النسيج المتدخل عليها.

(*) Agents transmissibles non conventionnels (ATNC).
(**) Encephalopathies spongiformes subaiguës transmissibles (ESST).

- على استخدام أدوات ذات استعمال لمرة واحدة، في حال توفرها، على شرط أن تسمح هذه الأدوات بتدخل جراحي ناجح بالنسبة للمريض. هذا الاستعمال لمرة واحدة ضروري جداً بالنسبة للأدوات صعبة التنظيف، أو في حال تدخل حامل لخطورة معينة مؤهلة للإصابة بهذا المرض أو على نسيج مؤهب للإصابة أيضاً (عدسات لاصقة للتجريب، بزل قطني، استئصال الزائدة، استئصال اللوزتين، استئصال عقد لمفاوية، تنظيف المنصف مع أخذ خزعة غدية لمفاوية). هذه الأدوات يجب عدم استعمالها إطلاقاً بعد ذلك.

في حال عدم توفر الأدوات ذات الاستعمال لمرة واحدة، فإن الخيار يتجه نحو الأدوات القابلة لعودة الاستعمال والقابلة للتعقيم (بخار الماء المشبع)، والتي تتحمل إجراء إلغاء الفعالية الكيميائي بواسطة هيبوكلوريت الصوديوم (فئة III). في حال عدم توفر هذه الأدوات الأخيرة، فإنه يمكن استعمال أدوات تستحمل إجراء إلغاء فعالية فعال ولكن بشكل غير كامل (فئة II).

جدول 1 - إجراءات إلغاء الفعالية

فئة I: مواد وإجراءات غير فعالة

المواد التالية غير فعالة وتزيد بقوة درجة الإخماع المتبقية

الحرارة الجافة

الإيثانول

فورمالدهيد غازي Formaléhyde gazeux

غلوتارالدهيد Chutaraldéhyde

محاليل الفورمالدهيد (فورمول)

المواد التالية غير فعالة

حمض كلور الماء

الأمونياك

بيتا - بروبيولاكتون

المشتقات للفينولية

الماء المغلي

حمض الإيثيلين

بيروكسيد الهيدروجين

الأشعة الشاردية، الأشعة فوق البنفسجية أو الكهرامغناطيسية

كبريتات الصوديوم (5%)

محاليل الماء الأوكسجين

فئة I: مواد وإجراءات ذات فعالية جزئية

حمض الليبواسيتيك (إنقاص للفعالية الخمجية حوالي 98%)

معقم حراري (فرن) درجة 121° خلال 30 دقيقة

ثاني أوكسيد الكلور

هيبوكلوريت الصوديوم

محلول 3% لكبريتات الصوديوم المغلية (غمر خلال 3 دقائق)

ميثايريونات الصوديوم

صود 0.5M، خلال على الأقل 30 دقيقة.

فئة III: إجراءات ذات فعالية جيدة فيزيائية أو كيميائية

غمر في هيبوكلوريت الصوديوم ذو تركيز 2% لمدة ساعة واحدة +++

غمر في الصود M₁ خلال ساعة واحدة ++

معقم حراري (فرن) درجة 134° خلال 18 دقيقة في معقم حراري مسامي +

فئة IV: إجراءات ذات فعالية أعظمية، إجراءات فيزيائية وكيميائية مترافقة:

- غمر في الصود M₁ أو هيبوكلوريت الصوديوم بتركيز 2% لمدة ساعة واحدة، ومن ثم معقم حراري

مسامي درجة 134° خلال ساعة واحدة (إزالة الفعالية + تعقيم) +++.

- غمر في هيبوكلوريت الصوديوم ذو درجة التركيز 2% خلال ساعة واحدة، متبوع بتعقيم حراري

بدرجة 134° خلال 18 دقيقة في معقم حراري مسامي (إزالة الفعالية + تعقيم) ++.

- غمر في الصود M₁ خلال ساعة واحدة، متبوع بتعقيم حراري بدرجة 134° خلال 18 دقيقة في معقم

حراري مسامي (إزالة الفعالية + تعقيم) +.

- معقم حراري بالصود M₁ بدرجة 121° خلال 30 دقيقة.

- غمر في الصود M₁ أو في هيبوكلوريت الصوديوم بتركيز 2% خلال ساعة واحدة، متبوع بتعقيم

حراري بالماء 121° خلال ساعة واحدة في فرن.

فئة V: تخريب أو تدمير:

ترميد، حرارة < 800° مع حرق أو حل حراري.

جدول 2 - درجة التأهب للإصابة حسب خصائص المريض،

طبيعة التدخل الجراحي، والنسج المعنية

حسب خصائص المريض

مرضى غير حاملين لخصائص معينة

يجب اعتبار كل مريض أنه قادر على نقل الشكل الجديد لمرض كروزيلت - جاكوب

المرضى الحاملين لعوامل خطر ذاتية موهبة للإصابة بالـ ESST العائلي:

- سوابق معالجة بهرمون النمو.

- سوابق عائلية لإصابة بالـ ESST.

- سوابق تداخل جراحي مع فتح للألم الجافية (قبل تاريخ 1/1/1995 بالنسبة لفرنسا).
مرضى مصابون أو مشتبه بإصابتهم:

مشتبه بإصابتهم: تظاهر حديث، تو تطور تدريجي، من دون تراجع لواحدة من العلامات الموحية،
مترافقة مع اضطرابات عقلية** أو نفسية*** (بعد نفي كل الأسباب الأخرى).
مصabون: نتائج إيجابية لأحد الفحوص العصبية المرضية.
حسب طبيعة التداخل الجراحي:

تماس مع النسيج المعتبرة حاملة لخطورة إنتانية:

- إما نتيجة لتمزق رضي (أو تماس مع ترح).
- أو بواسطة تماس لمدة طويلة (< ساعة واحدة).

حسب النسيج المظنية (درجة إخراج كامنة Infectiosité potentielle)

نسيج ذات درجة تأهب للإصابة عالية

- الجهاز العصبي المركزي (بما فيه النخاع الشوكي، الغدة النخامية، الأم الجافية، السائل الدماغي الشوكي).

- العين، العصب البصري.

نسيج ذات درجة تأهب للإصابة متوسطة (كروزلت - جاكوب) أو مرتفعة (الشكل الجديد لكروزلت - جاكوب)

بُنى لمفاوية مع مراكز مُنتشرة: طحال، العقد اللمفاوية، اللوزتان، الزائدة الدودية، صفائح باير Peyer (بالإضافة إلى البنى المشابهة في المعى الغليظ، المستقيم).

نسيج ذات درجة تأهب للإصابة الإنتانية ضعيفة:

الكلى، للكبد، الرئة، الممتلئة، المشيمة، نقي العظم، اللثة، لب السن.

نسيج لم يثبت أنها مؤهلة للإصابة الإنتانية:

- العضلات الحمر، القلب، الكلى، الغدة الدرقية، الغدة النثوية، الحليب، الدم، الإلكتين، الغدة اللعابية، اللعاب، المبيض، الرحم، الخصية.

* اضطرابات في النظر، اضطرابات مخيخية، ارتجافات عضلية، اضطرابات هرمية، اضطرابات خارج هرمية، رنح

cataxia رقص Choréa، نقص القوة، أعراض حسية مؤلمة دائمة، صرع، خرس غير حركي.

** تأخر نفسي - حركي، خرف.

*** إبطاء، قلق، خمول، هذيان.

معالجة المواد القابلة لعودة الاستعمال تكون حسب الخطة التالية:

- مرحلة أساسية مخصصة للتنظيف، خلال أقصر فترة تالية للتدخل (تجنب تجفيف الأوساخ). هذه المرحلة تُنقص من القدرة الإنتانية وتساعد على فعالية المراحل التالية. استعمال المواد الحاوية على الألدهيد ممنوع إطلاقاً.
تنظيفان متتاليان يكونان ضروريين في حال اللجوء إلى إجراءات ذات

- فعالية جزئية (فئة II). أو قبل العزل (تنظيف يدوي).
- مرحلة إلغاء فعالية الـ ATNC، بواسطة الإجراءات الأكثر فعالية التي من الممكن أن تتحملها المواد والأدوات.
- مرحلة غسل جيد بالماء.
- مرحلة التعقيم (فرن مسامي حرارة 134° خلال على الأقل 18 دقيقة)، أو تطهير من الإنتان (باستعمال المواد الأكثر فعالية والمتوفرة في الأسواق: الغلوتارالدهايد يجب أن يبطل استعماله).
- مراحل إلغاء الفعالية والتعقيم يمكن أن تجرى في نفس الوقت، وذلك حسب الإجراء المختار.
- الإجراءات اليدوية للتنظيف، لإلغاء الفعالية وللتعقيم يجب أن تُفصل، خصوصاً في حالة كون المداخلة الجراحية أو المريض أو الأنسجة المتداخل عليها ذات خطورة.
- وأخيراً فإن تسجيل ما قمنا به من إجراءات إلغاء الفعالية والتعقيم والتطهير على دفتر خاص، يجب أن يكون إجبارياً وذلك بالنسبة لكل جهاز أو أدوات قابلة للاستعمال أكثر من مرة واحدة.

2. طرق الفضلات الناتجة عن العناية في المستشفى:

عند المرضى المشتبهين، أو المصابين أو الحاملين لواحد أو عدة عوامل خطر شخصية للـ ESST، فإن الفضلات الناتجة عن العناية والحاوية على السائل الدماغي الشوكي، بالإضافة إلى حطام النسيج والفضلات التشريحية المعتبرة منتنة، يجب أن تطرح بواسطة الترميد، في سلسلة طرح الفضلات الناتجة عن العناية في المشفى وذات الخطورة الإنتانية. التعقيم لهذه الفضلات ممنوع، حتى ولو كانت ستُرمَد فيما بعد.

عند الأشخاص الآخرين، يجب اتباع السلسلة العادية لطرح الفضلات.

3. حالات خاصة:

1. حوادث تعرض للإصابة أثناء مزاولة المهنة:
كل حادث تعرض للإصابة أثناء مزاولة المهنة يجب أن يعلن عنه كحادث تعرض مهني. في حالة حدوث جرح أو وخز، يجب الغسل بعناية بماء جافيل لمدة 5 - 10 دقائق، وذلك للمناطق المصابة، وللمناطق السليمة المجاورة، ومن ثم الغسل بالماء بشكل وفير. في حال إصابة العين برذاذ، فإنه يجب إجراء غسل فوري وفير وغزير بالماء أو بواسطة سيروم ملحي. هذا ولا ينصح بأية معالجة وقائية هنا.
2. في حال وفاة مريض مصاب بمرض كروزفيلت - جاكوب:
يجب أن يُرْمَدَ الجسد. ومن ثم يسمح بنقله حسب الطرق العادية.
3. في حالة التشريح المرضي:
يجب تطبيق توصيات صارمة لكل ما يتعلق بالخزع، مهما كان سبب الوفاة، ولكل ما يتعلق باستعمال الأدوات: قفازات معدنية فوق القفازات العادية، نظارات مغلقة، صدرية واقية ذات استعمال لمرة واحدة، برادات خاصة مغلقة بمفتاح مع كتابة الاسم عليها.

29. الإنتانات النوزوكوميالية

الإنسان الحاصل في مشفى أو مصح يعتبر إنتان نوزوكوميالي، على شرط ألا يكون موجوداً لحظة الدخول إلى المشفى، وألا يكون في فترة الحضانة أيضاً عند لحظة الدخول. في حالة الشك، فإن فترة 48 ساعة فاصلة ما بين الدخول إلى المشفى ولحظة بداية الإنتان تؤكد الخصائص النوزوكوميالية لهذا الأخير. الخصائص النوزوكوميالية لإنتان بعد عمل جراحي تؤكد في حال حصول الإنتان خلال الـ 30 يوماً التالية للعمل الجراحي، وخلال السنة التالية لهذا العمل إذا كان هذا الأخير يتضمن وضع أنوات أجنبية (طعم، زرع...)، هذا على الرغم من أن المريض يكون قد ترك المشفى. ومن الضروري معرفة الخصائص النوزوكوميالية لإنتان ما لأنه: (1) اختيار المعالجة بالصادات الحيوية يكون محكوماً بالمقاومة الشائعة للجراثيم على الصادات الحيوية، (2) بعض الإنتانات النوزوكوميالية الإعلان عنها إجباري، (3) مراقبة بعض الإنتانات النوزوكوميالية منصوح بها (تحسين طريقة العمل، تحسين نوعيته...). هذا وإن الوقاية من هذه الإنتانات تشكل هدفاً أساسياً في المشفى.

1. الإنتانات البولية النوزوكوميالية

1. التشخيص:

1. تجرثم بول غير عرضي:

- عند مريض حامل لقطرة بولية (دائمة) خلال الأيام السبعة السابقة، وجود زرع بول إيجابي من الناحية الكمية (10^5 مل)، من دون وجود أكثر من نوعين جرثوميين مختلفين، ومع غياب العلامات السريرية.
- عند مريض غير حامل لقطرة بولية (دائمة) خلال الأيام السبعة السابقة وجود زرعان بوليان متتاليان وإيجابيان كميًا (10^5 مل)، من دون وجود أكثر من نوعين جرثوميين مختلفين، ومع غياب العلامات السريرية.

2. تجرثم بول عرضي:

- وجود واحدة من العلامات التالية: حرارة $>38^{\circ}$ ، حاجة ملحة للتبول، عسرة تبول أو حساسية في المنطقة فوق العانة.
- أو وجود زرع بول إيجابي كميًا $\leq 10^5$ /مل، من دون وجود أكثر من نوعين جرثوميين مختلفين.
- أو وجود واحدة من العلامات التالية: (1) شريط بولي إيجابي بالنسبة للإستيراز الخاصة بالكريات البيض أو النيتريت، (2) تفقيح بولي مثبت (≤ 10 كريات بيض/مل) (3) وجود عضويات مجهرية بتلوين غرام للبول، (4) عزل متكرر لنفس الجرثوم غرام Θ على زرعين بولين كميين ($\geq 10^5$ /مل) عند مريض يأخذ صاداً حيويًا مناسباً، (6) تشخيص طبي (7) معالجة بصادات حيوية مناسبة.

2. البوائية:

الجراثيم المسؤولة تتميز بمقاومتها الشائعة للصادات الحيوية: إيشيريشيا كولي، مكورات معوية، بسودوموناس أيروجينوزا، كليبيسيللا سيبسيا، مكورات معوية سيبسيا، سراسيا سيبسيا، مبيضات سيبسيا.

3. التشخيص: (أنظر فصل - 12 - الجزء الأول "الإنتانات البولية")

4. الوقاية:

1. التعرف على العوامل المؤهبة:

- القنطرة البولية: 80% من الإنتانات البولية النوزوكوميالية تحدث على قنطرة بولية مع ازدياد احتمال الإصابة بازدياد مدة القنطرة (زيادة قدرها 5 - 10% مع كل يوم إضافي).
- مداخلة على الطرق البولية: تنظير، جراحة بولية.
- تفريغ غير كامل للمثانة.
- إسهال.

2. القواعد الواجب اتباعها للوقاية من الإلتانات البولية النوزوكوميالية (جدول 1)

جدول 1 - قواعد للوقاية من الإلتانات البولية المرتبطة بقثطرة مثانية

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. تحديد أساليب القثطرة: تجنب القثطرة المستطبة لإراحة المريض فقط، استعمال مجمع البول الخارجي عند الرجل بدل القثطرة. | الوصل ما بين القثطرة وكيس تجميع البول، تفريغ الكيس من الأسفل، أخذ العينات عند مستوى الحلقة بعد تعقيمها. |
| 2. احترام القواعد الصحية العامة: غسل الأيدي قبل وبعد العناية بالمريض المقتطّر. | 6. احترام قواعد العناية اليومية بالقثطرة: غسل لطيف للمنطقة التناسلية مرتين باليوم، غسل للمنطقة حول الشرج بعد كل تغوط، تطهير مرتين في اليوم للقثطرة، عدم ترك كيس تجميع البول بتماس مع الأرض. |
| 3. وضع القثطرة بشكل عقيم: اتباع بروتوكول عناية، تنظيف للمنطقة التناسلية بواسطة صابون معقم، تطهير المنطقة حول العناية، غسل معقم للأيدي أو استعمال محاليل كحولية - مائية، وضع قفازات معقمة. | 7. فحص سريري روتيني: البحث عن ترفع حروري، سيلان قيحي على امتداد القثطرة، التهاب فوهة الدخول. |
| 4. القثطرة وكيس تجميع البول يجب أن يكونان معزولان عن الوسط الخارجي. | 8. شرب كمية وفيرة من السوائل. |
| 5. الاحترام الشديد لهذا العزل: عدم فتح منطقة | 9. تغيير القثطرة أو الكيس المجمع إذا كان هناك تسرب للبول نحو الخارج، أو إذا تكدس وجود إلتان بولي، وأخيراً في حال تخرب الكيس المجمع. |

الإلتانات البولية النوزوكوميالية تبدأ باستعمار الجرثوم لجهاز القثطرة، الذي بدوره يجرثم البول عن الطريق الراجع انطلاقاً من 3 مراكز:

- المنطقة حول فوهة دخول القثطرة (أهمية غسل هذه المنطقة مع تجفيفها الجيد).
- منطقة الوصل ما بين القثطرة وكيس تجميع البول. ما يؤهب للتوضع الجرثومي هنا هو الفتح المتكرر لجهاز التفريغ الغير معزول عن الوسط الخارجي.
- كيس تجميع البول، بواسطة القلس (أهمية التفريغ المتكرر لهذا الكيس، مع وضع جهاز مضاد للقلس).

5. المعالجة الشافية للإنتانات البولية النوزوكوميالية:

1. تجرثم البول الغير عرضي:

- عند المريض الحامل لقطرة بولية - عدم المعالجة.
- عند المريض الذي سحبت منه القطرة للحال، يجب إعادة زرع البول بعد 48 - 72 ساعة: في حال كونه إيجابياً، المعالجة واجبة.
- عند المريض الغير حامل لقطرة: (أنظر فصل معالجة تجرثم البول غير العرضي - الفصل - 12 - الجزء الأول "الإنتانات البولية").

2. تجرثم البول النوزوكوميالي العرضي:

معالجة بصاد حيوي وحيد حسب نتائج اختبار التحسس الجرثومي للصاد الحيوي:

- الفلوروكينولون مفضل في الإنتانات البسيطة، وذلك لطرحه الجيد عن طريق البول، ولانتشاره البروستاتي.
- المدة = 10 أيام عند المرأة (وذلك لتجنب الاصطفاء الجرثومي).
- المدة = 21 يوماً عند الرجل وذلك لترافق هذا الالتهاب غالباً بالتهاب بروستات.

استعمال أكثر من صاد حيوي وحيد [سيفالوسبورين جيل 3 أو فلوروكينولون] + أمينوزيد.

- في حال وجود علامات سريرية خطيرة.
 - في حال كون الإنتان عائد للأسينوباكثير، بسودوموناس أو جراثيم معوية، من أجل تجنب اصطفاء جراثيم مقاومة.
- معالجة بصادات حيوية خاصة:

- في حال كون الإصابة عائدة للمكورات المعوية: أموكسيسيلين، مع العلم أنه لا يدخل البروستات إلا في مرحلة الالتهاب الحادة، مما يعرض لحدوث نكس، ولكن هذه هي طريقة المعالجة الوحيدة.
- في حال كون الإصابة عائدة إلى المكورات العنقودية المقاومة للميتيسيلين: معالجة بالصادات الحيوية موجهة بفحص التحسس الجرثومي للصاد

الحيوي، مع العلم أن الفوسفوميسين ينتشر بشكل جيد داخل البروستات، ولكن يجب أن يرفق بصاد حيوي آخر لتجنب اصطفاء جراثيم مقاومة.

2. ذوات الرئة النوزوكوميالية

1. التشخيص والتصنيف:

الخصائص التشخيصية لذوات الرئة ملخصة في جدول 2.

جدول 2 - الخصائص التشخيصية

جرثوم/مل (مع غياب معالجة قريبة بالصادات الحيوية).	على صورة الصدر الشعاعية، أو على التصوير الطبقي المحوري؛ وجود واحد أو عدة كتافات بارانشيمية، حديثة في حالة تطور بالإضافة إلى:
- بزل خراج رئوي أو بزل الجنب.	● عزل جرثوم من أحد العينات التالية والتعرف عليه؛
- ذات رئة أو خراج شخصاً بواسطة فحص تشريحي مرضي.	- القشع في حال كون الإصابة عائدة للجيونيللا بنوموفيليا، الأسبيرجيلوس فوميغاتوس، الجراثيم الفطرية، ...
● أو فحص مصلي إذا كان عيار الجسم الضدي وصفيًا.	- الفصل المنخحي - القصبي مع وجود 5% على الأقل من الخلايا الحاوية على جراثيم بالفحص المباشر بعد التثقيب أو أكثر من 10 ⁴ UFC/مل.
● أو وجود مولد ضد في البول في حالة الليجيونيللا (ليجيونيللا رئوية).	- رشف كمي داخل قصبي عند مريض منيب (<10 ⁵ UFC/مل).
● أو وجود أحد العلامات التالية على الأقل:	- عينة بواسطة فرثاة متلفزة محمية، أو عينة قصبية محيطية محمية مع 10 ³
- قشع القشع (مفرزات قصبية عند المرضى تحت التنفس الاصطناعي).	
- حمى >39° حادثة الظهور.	
- زرع دم إيجابي بالنسبة لجرثوم ممرض مع غياب وجود بؤرة إنتانية أخرى، وغياب إنتان فوق القفطرة.	

2. تصنيف ذوات الرئة النوزوكوميالية عند مريض تحت جهاز التنفس

الاصطناعي جدول 3:

يمكن أن تصنف ذوات الرئة النوزوكوميالية بحسب المدة الفاصلة ما بين حدوثها ويوم الدخول إلى المشفى، وبحسب غياب أو وجود معالجة - خلال الـ 15 يوماً السابقة - بالصادات الحيوية.

- نوات رئة مبكرة (أقل من 5 أيام من يوم الدخول إلى المشفى) من دون معالجة مسبقة بالصادات الحيوية: الجراثيم المسببة تشكل جزءاً من النبيت المتعايش الداخلي للمريض (مكورات عقدية رئوية، هيوفيلوس أنفلونزا، مكورات عنقودية مقاومة للميتيسيلين، إيشيريشياكولي)، هذه الجراثيم غير مقاومة عادة للصادات الحيوية.
- نوات رئة مع وجود معالجة سابقة بالصادات الحيوية: الجراثيم المسببة في أغليبتها تكون من أصل داخلي endogène، وهي تنتج عن المعالجة بالصادات الحيوية التي تؤدي إلى انتقاء زمر جرثومية مقاومة (مكورات عقدية رئوية، هيوفيلوس أنفلونزا، وإيضاً البسودوموناس سببسيا، مكورات عنقودية مقاومة للميتيسيلين، كليبيسيلا سببسيا، جراثيم معوية سببسيا، سيراسيا سببسيا).

جدول 3 - تصنيف نوات الرئة النوزوكوميلية المكتسبة

عند مريض تحت جهاز التنفس الاصطناعي

تنفس اصطناعي	تنفس اصطناعي	تنفس اصطناعي	تنفس اصطناعي	
< 5 أيام مع وجود معالجة سابقة	< 5 أيام مع وجود معالجة سابقة	< 5 أيام مع وجود معالجة سابقة	< 5 أيام مع وجود معالجة سابقة	
بالصادات الحيوية	بالصادات الحيوية	بالصادات الحيوية	بالصادات الحيوية	
+++	+++	+++	+	مكورات عقدية
+++	+++	+++	+	منضمة المكورات
+++	+++	+++	+	العقدية الرئوية
+++	+++	++	+	هيوفيلوس سببسيا
++	+++	+	+	م. عنقودية مذهبية
+++	+++	+++	+	حساسة على
+++	+++	+++	+	الميتيسيلين
+++	+++	+++	++	جراثيم معوية
0	+	+	+++	م. عنقودية
0	+	+++	+++	مذهبية مقاومة
0	+	+++	+++	الميتيسيلين
0	+	+++	+++	بسودوموناس
0	+	+++	+++	ليروجينوزا

• نوات رئة متأخرة (اعتباراً من اليوم الخامس للدخول إلى المشفى) من دون معالجة سابقة بالصادات الحيوية: هذه الحالة تكون أكثر ندرة. الجراثيم المسببة تشكل هنا أيضاً جزءاً من النبيت المتعايش الداخلي للمريض (مكورات عقدية رئوية، هيموفيلوس أنفلونزا، مكورات عنقودية مقاومة للميتيسيلين، جراثيم معوية)، ومقاومتها للصادات الحيوية لا تشكل مشكلة هامة.

• نوات رئة متأخرة مع وجود معالجة سابقة بالصادات الحيوية: الجراثيم المسببة تكون آتية من المشفى وهي متعددة المقاومة (بسودومonas سيبيا، أسينيتوباكتر سيبيا، مكورات عنقودية مقاومة للميتيسيلين، كليسيلا سيبيا، جراثيم معوية سيبيا، سراسيا سيبيا).

2. عزل الجرثوم ومعرفته:

يجب معرفة العوامل المسببة من أجل اقتراح معالجة مناسبة بالصادات الحيوية، خاصة عند مرضى العناية المشددة. أخذ العينة بواسطة سحب قسبي محمي (عتبة الإيجابية $\leq 10^4$ UFC/مل) يبقى الفحص المرجعي من أجل تشخيص نوات الرئة النوزوكوميالية. هذا وإن تحقيق غسل قسبي - سنخي في نفس الوقت (عتبة الإيجابية $\leq 10^4$ UFC/مل) يعطي حساسية وخصوصية قريبتان من 95%. الرشف داخل القسبي مع زرع كمي (عتبة الإيجابية ≤ 60 UFC/مل) يشكل بديلاً جيداً. في حالة الشك بالإصابة بالليجيونيللا النوزوكوميالية، البحث عن مولد ضد قابل للانحلال لليجيونيللا في البول يجب إجراءه.

3. الوقاية:

كثرة حدوث هذا المرض وخطورته، زيادة مدة التهوية الاصطناعية ومدة الإقامة في العناية المشددة وزيادة الكلفة المادية بالتالي، كلها تؤكد ضرورة تطبيق إجراءات وقائية.

1. طريقة حدوث الإنتان والعوامل المؤهبة:

العدوى والإنتان يحدثان بشكل أساسي عن الطريق الهوائي. العدوى البدئية تحدث انطلاقاً من المنطقة الأنفية البلعومية، وهناك عوامل مرتبطة بالمريض تؤهب لها: مرض رئوي مزمن، معالجة بالصادات الحيوية، سكري، أنبوب تهوية، نقص تغذية.

الجراثيم المستعمرة للمنطقة الأنفية البلعومية غالباً ما تكون من أصل هضمي (المعدة بشكل أساسي)، ومما يسهل هذا الاستعمار، وجود قنطرة أنفية معدية، وعدم إمكانية الشرب، استعمال الأدوية المورفينية أو الكورار المثبطة لحركية الجهاز الهضمي، وأخيراً إعطاء الصادات الحيوية التي تساعد على اصطفاء الجراثيم الممرضة. هذا ويجب عدم إهمال دور الوسط المحيط بالمريض (أيدي فريق العناية).

الاستعمار الجرثومي للجهاز القصي، انطلاقاً من المنطقة الأنفية البلعومية، يعود إلى استنشاقات متكررة لعضويات مجهرية (بالون قنطرة التنبيب غير ملتصق تماماً بجدار القصبة الهوائية) وإلى رضوض صغيرة لمخاطية القصبة الهوائية (عدم فعالية التفجير الهدي المخاطي). وهكذا فإن ذات الرئة تحدث نتيجة اضطراب في آليات الدفاع الطبيعية للرئتين.

هذا ويوجد أيضاً طرق أخرى للعدوى: عدوى مباشرة بواسطة أدوات التهوية الاصطناعية، إنتانات حاصلة في المناطق المجاورة (إنتانات القسم العلوي للبطن) وأخيراً إنتانات عن طريق الدم (نادرة).

2. الوقاية (جدول 4):

4. المعالجة:

1. معالجة موثوقة بالصادات الحيوية:

المعالجة بالصادات الحيوية تكون مكيفة حسب الجرثوم أو الجراثيم المعزولة. إعطاء صادين حيويين ضروري في حالة البسودوموناس سببسيا، وأسينيتوباكثير سببسيا.

جدول 4 - الوقاية من ذوات الرنة النوزوكوميالية

المريض في قسم العناية المشددة وخطر الإصابة كامن في الوسط المحيط Exogène:

1. غسل منتظم للأيدي بعد كل تماس مع المريض.
2. وضع قفازات للعناية بالمريض المنصب، خاصة عند شطف المفرزات القصبية أو الأنفية البلعومية.
3. استعمال ماء معقم (للمعالجة بالأكسجين، المعالجة الضبابية Aérosols...) .
4. تعقيم لأدوات التهوية المستعملة عند مريضين الواحد تلو الآخر، أو استعمال أدوات ذات استعمال لمرة واحدة.

المريض في قسم العناية المشددة وخطر الإصابة آت من المريض ذاته Endogène:

الوقاية من استنشاق المفرزات الهضمية.

1. مريض في وضعية نصف جلوس (للوقاية من القلس المعدي - للمريئي).
 2. تجنب التهذنة العميقة التي تؤدي إلى الركونة الصفراوية.
 3. استعمال قناطر هضمية ذات قطر صغير .
- الوقاية من استنشاق المفرزات الأنفية البلعومية.
1. تطهير جيد للمنطقة الأنفية البلعومية قبل التنبيب (إذا أمكن ذلك).
 2. غسل بمعقمات أوبسيريوم ملحي للمنطقة الأنفية البلعومية وللأنف مع شطف (كل 3 - 4 ساعات).
- الوقاية من التوضع الجرثومي (الاستعمار الجرثومي) في الطرق الهوائية السفلية:
1. المحافظة على منعكس السعال وذلك بالتهذنة الأقل قوة ممكنة للمريض.
 2. شطف للمفرزات القصبية حالما يكون ذلك متطلباً، وذلك حسب تراكم هذه المفرزات في القصبات:
- غسل للأيدي ولبس قفازات، قنطار أنفي معقم، تقنية عدم التمس «no touch»، شطف ناعم أكثر ما يمكن.

3. تغيير قناة خزع الحنجرة مع اتباع تعقيم صارم.

إجراءات عامة:

1. تغذية عن طريق الجهاز الهضمي ما إن أمكن ذلك (تقوية لدفاع العضوية).
2. استعمال حكيماً للصادات الحيوية (الصادات الحيوية ذات الطيف الواسع تؤدي إلى اصطفاة جرثومي، وتكاثر للجراثيم المقاومة).

مريض جراحي:

1. قبل العمل الجراحي: معالجة تنفسية - فيزيائية للمريض الحامل لقصور تنفسي مزمن ساد + إيقاف التدخين.
2. بعد العمل الجراحي: معالجة تنفسية فيزيائية من أجل تجنب تراكم المفرزات القصبية، النهوض من السرير ما إن أمكن ذلك (مما يؤمن تنفساً ذاتياً أفضل).

2. معالجة احتمالية بالصادات الحيوية:

اختيار الصاد الحيوي يتعلق بصورة أساسية هنا بفترة الظهور (ذات رئة مبكرة أو متأخرة) وبوجود معالجة مسبقة بالصادات الحيوية. ويجب أن يؤخذ

بالحسبان حالة المريض العامة (قصور تنفسي مزمن، داء اللزوجة المخاطية، تثبط المناعة، نقص الكريات البيض)، وبيئة الشعبة التي انتقل منها المريض. هذا وإن معرفة بعض العوامل المؤهبة للإصابة بجرثوم معين يسمح بتكييف أفضل للمعالجة الاحتمالية بالصادات الحيوية: سبات (م. عنقودية مذهب، لاهوائيات)، مناعة مثبطة أو معالجة بالستيروئيدات (ليجيونيللا بنوموفيليا)، مرض رئوي قصبي ساد مزمن، أو تهوية اصطناعية < 8 أيام، أو معالجة مسبقة بالصادات الحيوية واسعة اللطيف (بسودوموناس أيروجينوزا، أسينيتوباكثير سبيسيا). جراحة عصبية، رض للجمجمة، استئشق رئوي للسوائل.

- في حالة ذات رئة مبكرة من دون معالجة مسبقة بالصادات الحيوية، فإنه من الضروري اقتراح معالجة بصاد حيوي وحيد من عائلة البيتالاكتامين (سيفالوسبورين جيل 3، أو أموكسيسيللين + حمض الكلافولينيك).
- في حال حدوث ذات رئة متأخرة من دون معالجة مسبقة بالصادات الحيوية، أو في حال معالجة مسبقة بالصادات الحيوية مع حدوث ذات رئة متأخرة أو مبكرة، فإن معالجة ثنائية بالصادات الحيوية تفرض نفسها وذلك للحد من ظهور طفرات جرثومية مقاومة:
- في حال الشك بوجود عصيات غرام سلبية [سيفيبيم أو بيبيراسيللين - تازوباكتام أو سيفتازيدين أو إيميبينيم] + [(أمينوزيد: أميكاسين أو إيسياميسين أو سيبروفلوكساسين).
- في حال الشك بمكورات غرام إيجابية: غليكوببتيد (+ جنتاميسين إذا كانت للزمر الجرثومية حساسة عليه داخل الزجاج)، الدالفوبريستين - كينبريستين أو اللينيزوليد ممكن أن يشكل معالجة بديلة للغليكوببتيد. معالجة ثلاثية بالصادات الحيوية لا تفرض نفسها إلا في حالة كون ذات الرئة شديدة لدرجة تهدد الحياة، هذه المعالجة يجب أن تكون فعالة على عصيات غرام السلبية وعلى المكورات العنقودية: بيتالاكتامين (أنظر سابقاً) + أمينوزيد (أنظر سابقاً) + غليكوببتيد.

- في كل الحالات يجب إعادة تقويم المعالجة بالصادات الحيوية حال الحصول على نتائج الفحص الجرثومي مع - إذا أمكن ذلك - تبسيط المعالجة بجعلها ثنائية بدل ثلاثية أو باستعمال صادات حيوية ذات طيف أقل وسعاً.
- مدة المعالجة المنصوح بها عادة هي 10 أيام. في حال وجود إصابة لعدة فصوص رئوية، أو إصابة نخرية بالسودوموناس أيروجينوزا أو الأسينيتوباكثير سببسيا، فإن مدة المعالجة تكون من 2 - 3 أسابيع. المرافقة البدئية مع أمينوزيد يمكن أن توقف بعد 4 - 5 أيام، وتتابع المعالجة بالصاد الحيوي المرافق منفرداً حتى نهاية مدة المعالجة.

3. الإبتاتات الحادثة في مكان اقتداخل الجراحي

1. تعاريف:

1. الإبتاتات السطحية الحادثة على مكان الخزع:

تحدث خلال الثلاثين يوماً التالية للعمل الجراحي. تصيب الجلد والنسج ما تحت الجلدية أو المتوضعة فوق الصفاق. وتعرف بوجود سيلان قيحي في مكان الخزع أو من المفجر، أو بعزل جرثوم من زراعة السيلان لجرح مغلق أو حالماً وضع التشخيص من قبل الطبيب أو الجراح.

2. الإبتاتات العميقة لمكان الخزع:

تحدث خلال الثلاثين يوماً التالية للعمل الجراحي، أو خلال العام التالي لهذا العمل إذا كان هناك وضع لأجهزة طبية. وهي تصيب الأنسجة المتوضعة تحت الصفاق. وهي تعرف بوجود:

- سيلان قيحي متأ من مفجر موضوع تحت الصفاق.
- أو علامات: انفتاح عفوي للجرح أو فتح للجرح من قبل الجراح وذلك لوجود ترفع حروري $> 38^{\circ}$ ، ألم موضعي، حساسية على الجس.
- أو خراج أو علامات إنتانية أخرى لوحظت عند تداخل جراحي أو بواسطة

فحص تشريحي مرضي.

- أو حال وضع تشخيص إنتان من قبل الجراح.

3. إنتان العضو أو المكان المتداخل عليه جراحياً:

تحدث خلال الثلاثين يوماً التالية للعمل الجراحي، أو خلال العام التالي لهذا العمل، إذا كان هناك وضع لأجهزة طبية.

إنه يصيب الأعضاء أو الأماكن التي فتحت أو التي حُرِّكت خلال العمل الجراحي (باستثناء النسيج المخروعة). ويعرف هذا الإنتان بوجود قيح أو جرثوم أو علامات التهابية واضحة للعضو أو المكان المذكور سابقاً.

2. الوبائية:

تحدث هذه الإنتانات غالباً نتيجة تلوث خلال العمل الجراحي، عائد إلى جراثيم آتية من المريض نفسه (مريض حامل لجراثيم ممرضة أو غير محضر بشكل جيد للعمل الجراحي) أو من الوسط المحيط بالمريض أو الفريق الطبي، كما يمكن أن تحدث بعد العمل الجراحي ولكن بشكل نادر.

المكورات غرام ⊕ (مكورات عنقودية مذهبية أو أدمية epidermidis، مكورات عقدية) تكون مسؤولة عن 75% من هذه الإنتانات، مع العلم أن هذه الإنتانات تكون مسببة من عدة جراثيم في أغلب الأحوال.

3. الوقاية والمعالجة:

1. الوقاية:

ما قبل العمل الجراحي:

يجب تقليل فترة الإقامة في المشفى قبل العمل الجراحي قدر الإمكان، كما يجب اقتراح القيام بالفحوص الخاصة قبل العمل الجراحي من دون إقامة في المشفى.

يجب البحث عن وجود إنتانات قبل العمل الجراحي ومعالجتها. تحضير الجلد للعمل الجراحي يجب أن يتبع بروتوكولاً صارماً يتضمن دوشاً جيداً في

اليوم السابق للعمل الجراحي ودوشاً آخر في يوم العمل الجراحي. كما يجب حلاقة جلد منطقة العملية الجراحية، هذا ويجب كتابة بروتوكول التحضير هذا بشكل واضح وتعليقه.
في غرفة العمليات:

- المريض: فرك بصابون معقم لمنطقة العمل الجراحي ومن ثم غسلها لإزالة الصابون، بعد ذلك يجب دهنها بمعقم من قبل الجراح.
- الجراح والمساعدون: طريقة غسل الأيدي، واستعمال السوائل المائية الكحولية، ولبس الألبسة المعقمة، كلها يجب أن تكتب بشكل واضح وتعلق على الحائط.
- غرفة العمل الجراحي والأجهزة: بروتوكولات صيانة غرفة العمل الجراحي والأجهزة يجب أن تتضمن تنظيفاً جيداً. هذا وإن مراقبة منتظمة لمستوى تلوث الهواء والدارات يجب أن تحقق. كما يجب التقليل من التواجد غير المفيد في غرفة العمليات، التنقل الكثير فيها من دون هدف، والثرثرة أيضاً.
- المعالجة الوقائية بالصادات الحيوية: لا تطبق إلا بالنسبة للمداخلات الجراحية المصنفة I أو II في تصنيف ألتمير Altemeier. البروتوكولات يجب أن تعلق على الحائط.

ما بعد العمل الجراحي:

يجب المحافظة على تعقيم صارم عند تحريك المفجرات أو عند وضع الضمادات، كما يجب تجنب حقن مواد مختلفة أو أدوية في جهاز التفجير، ومن المفضل استعمال أجهزة الشفط المغلقة (الغير متصلة مع الوسط الخارجي).

2. المعالجة:

جراحية بصورة خاصة (تفجير وتنظيف الخراج). المعالجة بالصادات الحيوية تكون مكملة فقط. وهي توصف بعد عزل جرثومي، أو في حالة إنتان نسيجي أو انتشار للإنتان (أنظر فصل الترفع الحروري والجراحة).

3. حالات خاصة:

إنتانات جدارية عميقة بعد جراحة على البطن.
عبارة عن إنتانات خلوية، معزولة أو مترافقة مع نخر عضلي، أو إنتانات داخل البريتوان تعود غالباً إلى ترافق لجراثيم لاهوائية وهوائية مصطفاة نتيجة معالجة سابقة بالصادات الحيوية: مكورات معوية، بسودوموناس سيبسيا، مكورات عنقودية مقاومة للميتيسيلين.
المعالجة طبية جراحية في كل الحالات (جدول 5).

جدول 5 - معالجة إنتان جداري عميق بعد جراحة على البطن

معالجة مبكرة بالصادات الحيوية بعد أخذ العينات:
الخيار الأول: فعالية على الجراثيم المعوية واللاهوائيات
[إيبيراسيلين - تازوباكتام + أمينوزيد] أو [تيكارسيلين - حمض الكلافولينيك + أمينوزيد] أو
[سيفالوسبورين جيل 3 + إيميدازول + أمينوزيد] أو [إيميبينيم أو ميروبيينيم] + أمينوزيد
جراحة إسعافية
البحث عن أماكن الإصابة ودرجتها خزع، تفجير، غسل، ضمادات موضعية
معالجة بالأوكسجين ذو الضغط المرتفع
إنتانات لاهوائية مع نخر عضلي.
* بروتوكول غير فعال ضد المكورات المعوية.

المكورات المعوية تكون مقاومة للسيفالوسبورينات، وأحياناً للأمينوبنيسيلينات وللأورويديونيسيلينات، مع مستوى مقاومة عال للأمينوزيدات. الغليكوبيبتيدات تشكل ملجأ، بمرافقتها مع الريفاميسين، مقاومة الجراثيم الممرضة للإيميدازول ولل سيفاميسين وجدت في 5 - 20% من الحالات. البنيسيلينات الواسعة الطيف مرافقة مع مثبطات البيبتاكتاماز أو الكاربابينيم ما زالت فعالة (مقاومة >20%). هذا ويجب ألا تتجاوز فترة المعالجة بالصادات الحيوية الـ 10 أيام، مع العلم أنه يجب أن تكيف أحياناً مع العلامات الموضعية.

إنتانات ما بعد العمل الجراحي والمتوضعة على الأجهزة الطبية:

تنتج هذه الإنتانات غالباً عن تلوث خلال العمل الجراحي. وتكون مبكرة أو متأخرة وذلك حسب أهمية الإلحاق الجرثومي، الزمرة الجرثومية المسببة،

وفوعتها. الجرثوم المسبب هو المكورات العنقودية في أغلب الحالات: مكورات عنقودية مذهب في حالة الإبتانات المبكرة، ومكورات عنقودية أدمية epidermidis في حالة الإبتانات المتأخرة.

كما أنه من الممكن حدوث هذه الإبتانات في حال حصول جرح دم: يكون الإبتان عندها متأخراً وبصورة مفاجئة. مع العلم أن الأجهزة الطبية الموضوعة لم تسبب أية مشكلة سابقاً (فترة فاصلة ما بين العمل الجراحي وبدء المرض خالية من الأعراض).

التشخيص المبكر وعزل الجرثوم، قبل البدء بالمعالجة بالصادات الحيوية، إلزاميان (جدول 6).

جدول 6 - طرق التشخيص الجرثومي للإبتان المتوضع على الأجهزة الطبية

العينات	التقنية	الاستطباب
موضعية	● بزل مفصلي ● أثناء العمل الجراحي متعدد هوائي ولاهوائي، تشريحي مرضي	طعم عظمي أو مفصلي كل أنواع الطعوم
زرع الدم	● هوائي/لاهوائي إعادة زرع روتيني ● أوساط زرع خاصة من أجل جراثيم صعبة العزل أو في حالة الفطور	روتيني
بزل قطني أو بطيني فحوص مصلبة	جسم ضدي مضاد للكوكسيلا بروتيني مرحلة I	إبتان مفاغرة بطينية التهاب شغاف القلب الإبتاني أو إبتان بالريكتسيا متوضع على طعم شرياني

الإبتانات المتوضعة على طعوم دسامية أو على تحويلة Shunt للسائل الدماغي الشوكي كانت قد بحثت في فصول سابقة.

الإبتانات على طعوم رأس الفخذ هي الأكثر مصادفة، وهي تنتج في أغلب الحالات عن "استيقاظ" جرثوم كان قد دخل إلى العضوية أثناء العمل الجراحي. إنها تتطور بشكل خدري، مع حدوث آلام مغبئية قليلة الشدة ولكن بشكل مستمر.

هذا ويختلف نوع الجرثوم المسبب باختلاف فترة ظهوره (جدول 7).
الفلووروكينولونات تكون فعالة على المكورات العنقودية الحساسة على الميتيسيلين كما أنها تنتشر بشكل جيد داخل العظم، ولها ميزة هامة وهي إمكان إعطاؤها عن طريق الفم لفترة طويلة. على العكس من ذلك فإن حساسية المكورات العنقودية المقاومة للميتيسيلين والجراثيم غرام السلبية، على الكينولونات مختلفة وذلك حسب الشعبة. الكينولونات غير فعالة على الجراثيم اللاهوائية وقليلة الفعالية على المكورات العقدية. هذه الحساسية المختلفة تفرض البحث عن الجرثوم المسبب بواسطة البزل لمكان الإنتان. في كل الأحوال، فإن خطر حدوث طفرات يفرض، على الأقل خلال الفترة الحادة، إجراء ترافق دوائي مع الريفامبيسين، حمض الفوسيديك، أو الفوسفوميسين بالنسبة للمكورات العنقودية، ومع البيتالكتامين أو الأمينوزيد بالنسبة للجراثيم غرام السلبية. مدة المرافقة هذه مع الكينولون لم تحدد بعد.

هذه المعالجة البدئية المفردة، والمرتكزة على مرافقة الفلووروكينولون مع الريفامبيسين، سمحت بالشفاء من دون مداخلة جراحية لبعض الإنتانات المتوضعة على طعم غير منزوع. إذن من الممكن اللجوء إليها في حالة استحالة إمكانية التداخل الجراحي. على العكس من ذلك فإنه من غير المنطقي معالجة الإنتان على طعم عظمي مع آفات التهاب عظم متقدمة دوائياً فقط.

جدول 7 - احتمال الجرثوم المسبب (نسبة مئوية) للإنتانات المتوضعة

على طعم رأس الفخذ			
الجراثيم	إنتان مبكر	إنتان حادث نتيجة تجرثم دم	إنتان متأخر بعد العزل الجراحي
مكورات عنقودية مذهبية	50	25	15
مكورات أدمية	10	15	30
مكورات عقدية	10	30	15
جراثيم معوية	15	15	10
بسمودوموناس	>5	>10	>10
لاهوائيات	10	0	10
غير معروفة	0	>10	0

جدول 8 - أسس المعالجة للإنتانات المتوضعة

على طعم رأس الفخذ

الصورة السريرية	أسس المعالجة
إنتان بعد العمل الجراحي مبكر \geq شهر واحد	معالجة بالصادات الحيوية لمدة 3 أشهر، استقصاء جراحي مع الحفاظ على الطعم.
إنتان بعد العمل الجراحي متأخر	معالجة بالصادات الحيوية من 6 أسابيع إلى 3 أشهر، تغيير للطعم على مرحلة أو مرحلتين.
	معالجة بالصادات الحيوية إذا كان المريض غير قابل للعمل الجراحي

التهابات المنصف الحادثة بعد العمل الجراحي:

تكون تالية لتلوث الجرح الجراحي أثناء العملية، وهي تحدث في اليوم 10 - 20 بعد التداخل الجراحي. زراعات الدم إلزامية هنا، ولكنها لا تكون إيجابية دائماً. أخذ عينة موضعية يمكن أن يفيد إذا كانت سطحية، وهذه العينة تكون أكثر موافقة إذا أخذت من مكان الإنتان وذلك إذا أعيد التداخل الجراحي (في حالة ضرورته). التصوير الطبقي المحوري يفيد لتوجيه التشخيص، ولكن علاماته تظهر متأخرة غالباً (صورة خراج منصفي أو ارتشاحات منتشرة).

المعالجة تتضمن معالجة بالصادات الحيوية التي يجب أن تدوم لفترة 6 أسابيع، هذا ويجب إعطاء عدة صادات حيوية مترافقة (جدول 9) مع تداخل جراحي مبكر، وذلك لتفجير التفقيح أفضل ما يمكن.

الغليكوبيبتيدات تشكل المعالجة المفضلة للمكورات العنقودية المقاومة للميتيسيلين مرافقة مع الأمينوزيدات، أو الفلوروكينولونات أو الريفامبيسين أو حمض الفوسيديك أو أخيراً الفوسفوميسين وذلك حسب نتائج اختبار التحسس الجرثومي للصاد الحيوي.

جدول 9 - التهاب المنصف: استراتيجية المعالجة بالصادات الحيوية

الجراثيم المسببة	المعالجة ذات الخيار	المعالجة البديلة	المتابعة للمعالجة عن طريق الفم
المكورات العنقودية	[[بنيسيلين M أو سيفالو (غليكوبيبتيد + أمينوزيد) فلووروكينولون أو سترپتوغرامين أو كوتريموكسازول		
سببها الحساسية على الميتيسيلين	جيل 3 + (جنتاميسين أو نيتيلميسين)]		
مكورات عنقودية سببها مقاومة للميتيسيلين	[[غليكوبيبتيد + فوسفوميسين]		حسب نتيجة اختبار التحسس الجرثومي للصاد الحيوي
جراثيم معوية	[[سيفالوسبورين جيل 3 أو سيفيديم أو سيفيريوم أو بيبيراسيلين - تازوباكتام أو إيميبينيم + (أميكاسين أو إيزياميسين)]		فلووروكينولون أو سيفالوسبورين جيل 3 أو جيل 2
بسودوموناس أيروجينوزا	[[سيفتازديم أو سيفيديم أو بيبيراسيلين - تازوباكتام أو إيميبينيم أو سيبروفلوكساسين + أميكاسين أو إيزياميسين)]		سيبروفلوكساسين
مكورات عنقية سببها	[[أمينوبنيسيلين + (جنتا أو نيتيلميسين)]	غليكوبيبتيد + (أمينوزيد أو ريفاميسين)]	أموكسيسيلين أو سيكترومييسين أو ماكروليد
بانتظار نتائج الفحوص الجرثومية	غليكوبيبتيد + [[سيفالو جيل 3 أو سيفيديم أو سيفيريوم أو بيبيراسيلين - تازوباكتام فلووروكينولون + (أميكاسين أو إيزياميسين)]		
جراثيم متعددة	بحسب نتيجة اختبار التحسس الجرثومي للصاد الحيوي		
خامائر	[[مفوتريسين ± فلوستوزين]		

4. الإختانات الحادثة على قناطر وريدية

1. تعاريف:

1. تلوث القنطرة:

زراعة غير وصفية non significative لنهاية القنطرة ($ufc \leq 15$) بواسطة تقنية نصف كمية، 10^3 بواسطة تقنية كمية)، وذلك في حال غياب علامات موضعية أو عامة لوجود إنتان.

2. توضع مستعمرات جرثومية على القنطرة Colonisation:

زراعة إيجابية لنهاية القنطرة ($= ufc \leq 15$ بواسطة تقنية نصف كمية، $10^3 ufc/ml$ بواسطة تقنية كمية)، وذلك في حال غياب علامات موضعية أو عامة لإنتان مسبب من القنطرة.

3. إنتان - ذو تظاهر سريري - حادث على القنطرة:

وجود علامات إنتان عامة، وزراعة إيجابية لنهاية القنطرة ($= ufc \leq 15$ بواسطة تقنية نصف كمية، $= 10^3/ml$ بواسطة تقنية كمية)، مع تراجع على الأقل نسبي للأعراض عند سحب القنطرة.

وجود علامات إنتان موضعية (سيلان قيحي، أو شبه قيحي، التهاب وريد خثري، التهاب خلوي) على مستوى القنطرة ولو كانت زراعة نهايتها عقيمة أو غير وصفية.

علامات سريرية عامة لإنتان مقاوم للصادات الحيوية، في حال اختفائها بـ 48 ساعة بعد سحب القنطرة.

ظهور علامات سريرية عامة لإنتان عند استعمال القنطرة.

4. تجرثم الدم العائد إلى القنطرة:

زراعة إيجابية لنهاية القنطرة ($\leq ufc \leq 15$ بواسطة تقنية نصف كمية، $10^3 ufc/ml$ بواسطة قنطرة كمية) وزرع دم إيجابي على الجرثوم نفسه، في حال غياب بؤر إنتانية أخرى. إنتان موضعي مع عزل نفس العضوية الممرضة المجهرية في القيح أو زراعة الدم المحيطة.

نسبة تركيز للعضوية الممرضة المجهرية (ufc/ml) لزراعة الدم المسحوبة من القثطرة على تركيز العضوية الممرضة المجهرية (ufc/ml) لزراعات الدم المحيطية ≤ 5 .

2. الوبائية:

المكورات العنقودية تكون مسؤولة في 30 - 50% من الحالات، وغالباً المكورات العنقودية الذهبية (أكثر من الأدمية (epidermidis)، متلوة بالجراثيم غرام سلبية والفطور. عضويات ممرضة أخرى يمكن مصادفتها عند مثبطي المناعة: أسينيتوباكتر سيبسيا، مكورات مجهرية سيبسيا، عصيات سيبسيا، كورينباكتيريا JK.

3. الوقاية:

1. التعرف على عوامل الخطر:

المضيف: عمر متقدم، نقص الكريات البيض، معالجة كيميائية لفترة طويلة، معالجة مثبطة للمناعة، آفات جلدية. المحيط: تغيرات في النبيت الجلدي، عدم احترام القواعد الصحية، اللمس المتكرر واستعمال أنابيب الحقن، تغذية عن طريق الوريد. القثطرة: وضعها في شروط غير جيدة، قناطر متعددة للمعة، مكان القثطرة (خطورة: فحذي < وداجي < تحت الترقوة).

2. آلية الاستعمار الجرثومي للقثطرة:

تأتي الجراثيم:

- من اللحف الجلدية حيث تنتقل الجراثيم على طول السطح الخارجي للقثطرة، حتى نهايتها الداخلية.
- من أيدي الممرضين عند استعمالهم للقثطرة وللأنابيب المتصلة بها.

3. الوقاية (جدول 10):

جدول 10 - الوقاية من الإنتانات النوزوكوميالية المتوضعة على القنطرة الوريدية

القناطر الوريدية المحيطة:

1. بروتوكول مكتوب لطريقة وضع القنطرة وصيانتها.
 2. تفضيل المواد المعدنية والتفلون.
 3. تعقيم صارم لحظة وضع القنطرة.
 4. رباط ضاغط معقم.
 5. تغيير روتيني للقنطرة كل 72 ساعة.
- القنطرة الوريدية المركزية:
1. الحد من الاستطابات.
 2. بروتوكول مكتوب لطريقة وضع القنطرة وصيانتها.
 3. وضع القنطرة يجب أن يكون مبرمجاً، ويتم من قبل طبيب خبير. في حال وضع القنطرة إسعافياً، فإن تبديلها يجب أن يتم إلزامياً حالما تسمح حالة المريض بذلك.
 4. تعقيم مماثل للتعقيم المتبع في الجراحة (للوضع، الصيانة، الاستعمال): غسل الأيدي كما هو متبع في الجراحة أو بواسطة محلول مائي - كحولي، قفازات معقمة، قناع وقبعة، شادات معقمة.
 5. الطريق تحت الترقوة مفضل على الطريق الوداجي.
 6. تنظيف بواسطة صابون معقم.
 7. تعقيم بواسطة بوليبيديون يودي 10%، أو كلورهيكزدين 2% (نفس المعقم المستعمل من أجل التنظيف).
 8. تثبيت جيد للقنطرة.
 9. ضماد ضاغط. الضمادات الغير ضاغطة والشفافة يجب ألا تستعمل إلا بعد 24 ساعة من الوضع وذلك عند اختفاء النز. ويجب أن تغير كل 48 - 72 ساعة.
 10. تحضير سوائل الحقن بطريقة معقمة.
 11. تغيير أنابيب الحقن كل 48 - 72 ساعة وكل يوم في حالة التغذية الوريدية.
- هناك إجراءات غير هامة: مرهم صاد حيوي، شبكات مضادة للجراثيم، وضع هيبارين، وضع قبة وقناع وقفازات عند استعمال الأنابيب الخاصة بالقنطرة.

4. المعالجة:

سحب القنطرة أو إبقاؤها:

- كل قنطرة وريدية محيطية، مشكوك بوجود إنتان عائد إليها، سواء كان لسبب موضعي أو عام، يجب أن تسحب أبكر ما يمكن ولو لم يمض على وضعها 72 ساعة.
- يجب سحب القنطرة فوراً في حالة: إنتان شديد، إنتان ممتد للطريق تحت الجلدي للقنطرة، سيلان قيحي عند نقطة دخول القنطرة، التهاب وريد

خثري قيجي أو التهاب خلایا، إنتان عائد للمكورات العنقودية الذهبية، أو للمبيضات سببیا.

● يمكن تبديل القنطرة بقنطرة أخرى باستعمال سلك، في حال غياب أحد هذه العلامات، ولكن في حال اختفاء الإنتان، وضرورة المحافظة على الطريق الوريدي، فإنه يجب البدء بالمعالجة بالصادات الحيوية التي يجب حقنها عبر القنطرة.

هذه القنطرة يجب أن تسحب فيما بعد وذلك في حال عزل فطور أو مكورات عنقودية مذهبية أو جراثيم غرام سلبية، بزرع القنطرة السابقة، إذا استمر وجود العلامات الإنتانية من دون وجود مسبب آخر لها.

هذا ويحافظ على هذه القنطرة (المبدلة على سلك) في حال عزل مكورات عنقودية ذات كواغولاز Coagulase سلبي. المعالجة بالصادات الحيوية تكيف حسب فحص التحسس الجرثومي للصاد الحيوي. وبالطبع يجب سحب هذه القنطرة في حال زيادة خطورة الإنتان تحت المعالجة. المعالجة بالصادات الحيوية:

- اختيار الصاد الحيوي يتعلق بالجرثوم المسبب وحساسيته:
- المكورات العنقودية الحساسة على الميتيسيلين: أوكساسيلين + جنتاميسين.
- المكورات العنقودية المقاومة للميتيسيلين: غليكوبيبتيد + [جنتاميسين أو فلوروكينولون أو حمض الفوسيديك أو ريفامبيسين أو فوسفوميسين].
- الصاد الحيوي المرافق يختار حسب معطيات اختبار التحسس الجرثومي للصاد الحيوي.
- مكورات عقدية أو مكورات معوية: [ينيسيلين G أو أموكسيسيلين أو غليكوبيبتيد] + جنتاميسين.
- كورينباكتيريا أو عصيات: غليكوبيبتيد فقط.
- بسودوموناس أيروجينوزا: [بيبيراسيلين أو تيكارسيلين أو بيبيراسيلين - تازوباكتام أو سيفيبيم أو سيفتازيديم أو إيميبينيم] + [ألمكاسين أو إيزياميسين أو سيبروفلوكساسين]، حسب معطيات اختبار التحسس الجرثومي للصاد الحيوي.

- خمائر: أمفوتيريسين B، مركبات شحمية للأمفوتيسيرين B أو فلوكونازول.

• مدة المعالجة بالصادات الحيوية:

- إذا كانت القتطرة قد سحبت، مع تراجع الأعراض خلال 48 ساعة، فإنه يجب متابعة المعالجة بالصادات الحيوية لمدة أسبوعين بالنسبة للمكورات العنقودية المذهبة أو المبيضات البيض، 48 - 72 ساعة بالنسبة للمكورات العنقودية ذات خميرة التخثر (كواغولاز) السلبية، 7 أيام من أجل الجراثيم الأخرى.

- إذا تركت القتطرة في مكانها أو في حال استمرار وجود الأعراض 48 ساعة بعد سحبها، فإنه يجب متابعة المعالجة بالصادات الحيوية لمدة 4 أسابيع بالنسبة للمكورات العنقودية المذهبة، 1 - 2 أسبوع بالنسبة للجراثيم الأخرى.

هناك طريقة معالجة موضعية تسمح بالاحتفاظ بالقتطرة المصابة بالإنتان في مكانها. المعالجة المقترحة هي: فانكوميسين أو أمينوزيد، 2 - 5 مغ/مل هيبارين، وتبدل كل 12 ساعة، خلال 15 يوماً إلى 3 أسابيع، هذا ويجب عدم استعمال هذه القتطرة من أجل حقن أخرى.

الفعالية جيدة في حالة الإنتان العائد إلى المكورات العنقودية ذات الكواغولاز السلبي، متوسطة في حالة الإنتان العائد إلى العصيات غرام السلبية، وضعيفة في حالة الإنتان العائد إلى المكورات العنقودية المذهبة.

5. الإجراءات الوقائية العامة

1. تعاريف:

تهدف إجراءات الوقاية إلى حماية المرضى والمعتن بهم من خطر احتمال انتقال عنصر أو عناصر إنتانية إليهم وذلك خلال سير عمليات المعالجة والعناية في المشفى.

يجب تطبيق احتياطات صحية لكل المرضى مهما كان وضعهم الإنذاني (حماية روتينية) هذه الاحتياطات "العامة" هي نفسها الاحتياطات الدولية المطبقة على المنتجات البيولوجية الإنسانية المنشأ ووسائل الاحتياطات المطبقة "العزل". يضاف إليها بحسب الوضع الإنذاني لبعض المرضى احتياطات خاصة متناسبة مع الحالة الإنذانية للمريض، ومع خطر طريق انتقال العنصر المجهرى، احتياطات "تماس"، "هواء"، و"ذرات". وهكذا لم يعد هناك عزل للمريض، إلا العزل الهادف إلى حماية هذا الأخير (حماية مثبتي المناعة من المحيط).

2. الإجراءات:

1. الاحتياطات العامة:

- الاحتياطات الأساسية التي يجب احترامها عند العناية بكل مريض، سواء كان حاملاً لجراثيم متعددة المقاومة أو لا هي:
- غسل أو تعقيم الأيدي، بعد خلع القفازات، عند انتقال العناية من مريض إلى آخر، أو الانتقال من عمل إلى آخر.
- وضع قفازات إذا كان هناك خطر للتماس مع الدم أو أي عنصر بيولوجي آخر، أو بشكل دائم عندما تكون أيدي المعتمني الصحي حاملة لسحجات أو آفات معينة.
- وضع صداري، نظارات، أقنعة وذلك عندما يكون هناك خطر للتعرض إلى الإصابة بمواد بيولوجية مقذوفة من قبل المريض.
- الاحتياطات تطال أيضاً أدوات العناية الملوثة التي يجب تعقيمها.
- تنظيف وتعقيم السطوح الملوثة.
- تطبيق شروط نقل خاصة للعناية البيولوجية، للغسيل والأدوات الملوثة، والتي هي بتماس مع الدم أو السوائل البيولوجية.

2. الاحتياطات الخاصة:

نميز عادة 3 فئات من الاحتياطات الخاصة.

احتياطات التماس (Contact ويرمز لها بالحرف C):

وهي موجهة لخطورة الانتقال عن طريق التماس. وتتضمن:

- العزل في غرفة مفردة.
- وضع قفازات حال الدخول إلى هذه الغرفة.
- غسل الأيدي بعد نزع القفازات وقبل الخروج من الغرفة بواسطة صابون معقم أو استعمال سائل مائي كحولي.
- وضع صدرية فوق لباس المشفى في حال التماس مع المريض أو مع سطوح أو أدوات من الممكن أن تكون ملوثة.
- الحد من التنقل.
- الاستعمال بقدر الإمكان لأدوات ذات استعمال وحيد، أو لأدوات مخصصة للمريض وحده.

احتياطات القطيرات (gouttelettes يرمز إليها بالحرف G):

وهي موجهة للوقاية من خطر الانتقال عبر قطيرات <5 ميكرون (لعاب، مفرزات الطرق الهوائية العليا).

إنها تتضمن:

- العزل في غرفة مفردة.
- وضع قناع (للأشخاص المعتمدين بالمريض والقريبين منه).
- الحد من التنقل. وضع قناع للمريض عندما يخرج من غرفته.

احتياطات الهواء (air يرمز لها بالحرف A):

وهي موجهة للوقاية من خطر الانتقال عبر قطيرات كثيرة الصغر >5 ميكرون (السل مثلاً). وتتضمن:

- العزل في غرفة مفردة، تحت ضغط سلبي، مع تجديد الهواء بقدر 6 حجوم/ساعة، والحفاظ على الأبواب مغلقة.
- وضع قناع إلزامي حال الدخول إلى الغرفة.
- الحد من تنقل المريض.

إن تقويم فعالية هذه الإجراءات الوقائية أصبح كثير الصعوبة، وهذا

عائد إلى تعددية عوامل انتقال العناصر الممرضة المجهريّة المتضمنة الجراثيم متعددة المقاومة: عوامل بيئية، عوامل متعلقة بالمريض، متعلقة بطرق الوقاية المطبقة، تلاؤم الأشخاص المعنيين بالمريض مع هذه الطرق الوقائية إلخ... إذا كانت الإجراءات الوقائية ضرورية من أجل احتواء انتقال الجرثوم، فإن الاحتياطات المسماة حواجز مستعملة وحدها (غسل الأيدي، وضع قفازات، وصداري) تكون غير فعالة في حال غياب مطاوعة جيدة من الفريق الطبي. وأحياناً فإن المعرفة الروتينية حال الدخول إلى المشفى للمرضى الحاملين للجرثوم، وتحديد استعمال الصادات الحيوية يدعمان فعالية الإجراءات السابقة.

6. الإبلاغ

الإبلاغ عن الإنتانات النوزوكوميالية والذي أصبح إجبارياً في فرنسا منذ صدور مرسوم (تموز 2001)، له هدف خاص وهو قرع جرس الإنذار. إنه يتضمن مستويين: الإبلاغ "الداخلي" في المشفى، والإبلاغ "الخارجي" للجهات المختصة. أهمية الإبلاغ الخارجي هو السماح بمتابعة وبائية على مستوى الدولة من الجهات المختصة للكشف عن حوادث نادرة وغير طبيعية، وللتأكد من أن المشفى قد اتخذ إجراءات مناسبة لتجنب حصول إنتانات أخرى، لحث المشافي على تطوير إجراءاتها الصحية، وحث الفريق الطبي على تنقيف المريض وعائلته فيما يتعلق بالإجراءات الصحية الوقائية.

30. الأسلحة البيولوجية الإرهابية

1. تعريف

تعرف الأسلحة البيولوجية الإرهابية باستعمال عناصر بيولوجية (جراثيم، فيروسات، طفيليات، فطور، أو ذيفانات) لأهداف إرهابية.

2. تصنيف العناصر البيولوجية

صنفت العناصر البيولوجية القابلة للاستعمال في الأسلحة البيولوجية الإرهابية في ثلاث مجموعات A، B، C (جدول 1)، هذا التصنيف يستند إلى احتمال الاستعمال، ونتائجه (الإمراضية، الوفاة والاضطراب في صفوف الشعب). هذا ويمكن أن توجد هذه العناصر بشكل ضبوب (Aérosols) مكون من ذرات حجمها ما بين 1 - 5 ميكرون والتي بإمكانها في حال استنشاقها أن تصل حتى الأنساخ الرئوية، طرق الإصابة الأخرى ممكن أن تكون هضمية (ماء أو أطعمة) أو عبر الجلد. يمكن أن نميز بشكل عام، عناصر مهلكة (عصيات الجمرة الخبيثة، اليرزينيا الجذامية، الجدري) وعناصر مُحَدِّثَة لعاهات (كوكسيلا بورنيتي، بروسيللا، الذيفان المعوي B للمكورات العنقودية) عناصر مُعْدِيَة (اليرزينيا الجذامية، الجدري، الحمى النازفة الفيروسية) أو غير مُعْدِيَة (عصيات الجمرة الخبيثة، فرانسيسيللا تولارينسيس، السموم) (جدول 2).

جدول 1 - تصنيف العناصر البيولوجية

اللقنة A	اللقنة B
عصيات الجمرة الخبيثة	- ذيفان إيسيلون للكلوستريديام بيرفرينجيس
اليرزينا الجذامية	الذيفان المعوي B للمكورات العنقودية،
فرانسيسيللا تولارينسيس	أمراض منتقلة عن طريق الماء أو الأغذية،
فيروس الجدري	سالمونيلا سيبسيا،
فلوفيروس (إيبولا، ماربورغ)	شيفيلا الزحيرية،
أرينا فيروس (لأشأ، جونين)	العصيات الكولونية O157: H ₇
ذيفان الكلوستريديام البوتيلية	ضمات الكوليرا
اللقنة B	كريبتو سبوريدوم بارثوم
- كوكسيللا بورنيتي	اللقنة C
- بروسيللا سيبسيا	- فيروس نيفا
- بوركولديريا ماليي	- نانثافيروس
- ألفافيروس (التهاب الدماغ الفنزولي، التهاب	- فيروس الحمات النزفية العائدة للقراد
الدماغ الخيلي الشرقي والغربي)	- فيروس التهاب الدماغ العائد للقراد
- الخروج	- فيروس أماريل
	- عصيات السل المتعددة المقاومة

جدول 2 - خصائص العناصر البيولوجية الأساسية

العنصر الممرض	الجرعة الممرضة	الحضانة	القدرة القاتلة	القدرة المعدية
عصية الجمرة الخبيثة	2500 - 5000 ضبوب	1 - 5 أيام لا تتعدى 60 يوماً	+++	-
اليرزينا الجذامية	100 - 5000	1 - 6 أيام	+++	+++
فرانسيسيللا	10 - 50 عضوية	1 - 14 يوماً	+	-
تولارينسيس	10 - 100 جزيء	7 - 17 يوماً	++	+++
الجدري	0.01 مكغ/كغ	12 س - 4 أيام	+++	-
الذيفان البوتيلي	1 مكغ/كغ فموي	2 س إلى 8 أيام للمنموذج الفموي	+++	-
كوكسيللا بورنيتي	10 - 10 عضويات	10 - 40 يوماً	-/+	-
بروسيللا	10 - 100 عضوية	5 - 60 يوماً	-/+	-
بوركولديريا ماليي	ضعيفة	10 - 14 يوماً	++	-/+
التهاب الدماغ الفيروسي	10 - 100 جزيء	2 - 6 أيام	+	-
الخروج	3 - 5 مكغ/كغ	18 - 24 س	+++	-
الذيفان المعوي B	0.03 مكغ/شخص	3 - 12 س	-/+	-
للمكورات العنقودية	مفعول شال 1.7 مكغ/شخص مفعول مميت			

3. التظاهرات السريرية

التظاهرات السريرية الناتجة عن هذه العناصر الممرضة المختلفة يمكن أن تجمع في عدة زمر (جدول 3، 4، 5، 6).

جدول 3 - العناصر البيولوجية المسؤولة عن تظاهرات تنفسية

عصية الجمرة
اليرزينيا الجذامية
فرانسيشيلا تولارنيس
كوكسيلا بورنيتي
بروسيللا
برونكوليريا ماليي وماليي الكاذبة
الخروج
السم المعوي B للمكورات العنقودية
المسموم الفطرية

جدول 4 - العناصر البيولوجية المسؤولة عن التظاهرات الجلدية

طفح حطاطي بقعي
- الجدري في مرحلة مبكرة
- حمى نزفية فيروسية
- ريكتسيا
- تولاريميا
طفح حويصلي
- جدري
- برونكوليريا ماليي وماليي الكاذبة
فرقية
حمى نزفية فيروسية
فاريول نزفية
تخثر داخل وعائي منتشر عائد لإنتانات متعددة
(اليرزينيا الجذامية)
تقرحات
عصيات الجمرة
فرانسيشيلا تولارنيس
ريكتسيا

جدول 5 - عناصر بيولوجية مسؤولة عن مظاهر عصبية

من دون ترفع حروري
السم البوتيتلي
مع ترفع حروري سحالي دماغي
فيروسي
بروسيللا
كوكسيلا بورنيتي
اليرزينيا الجذامية
عصيات الجمرة

جدول 6 - عناصر بيولوجية مسؤولة عن أعراض هضمية

• إسهالات غثيان - إقياءات	- ضمات الكوليرا
مع صورة سريرية لإنتان شديد وإصابة تنفسية	• إسهالات مع ترفع حروري، تناثر زحيري
- عصبيات الجمرة	- عصبيات كولونية، سالمونيلا، شيغيلا
- الليزرينيا الجذامية	• نزف هضمي مع ترفع حروري
- السم المعوي B للمكورات العنقودية	حمى نزفية فيروسية
- السموم الفطرية	الخرور
• إسهالات مائية شديدة	سموم فطرية
مع غواب للترفع الحروري	

4. التشخيص

صعوبة التشخيص تعود إلى عدة عوامل. الطريق التنفسي هو الطريق المفضل، كمية الجرثوم المحقونة تكون أكبر بكثير من كميتها في حالة الإنتان الطبيعي. ومن هذا المنطلق فإن المظاهر السريرية تكون مختلفة هنا عن المظاهر السريرية المصادفة في حالات الإنتانات الطبيعية، والمظاهر التنفسية تكون مسيطرة، فترة الحضانة قصيرة، وتطور المرض سريع مع ارتفاع في نسبة الوفيات. يستند تأكيد التشخيص على تحليل العينات البيولوجية المأخوذة من (الدم، القشع، السائل الجنبي، البراز، السائل الدماغي الشوكي، الجلد...).

هذا ويجب تطبيق قواعد أمان بيولوجية، وذلك لوجود خطورة إصابة الأشخاص وتلوث المحيط. ولذلك يجب تطبيق شروط نقل العينات الإنتانية المتبعة عادة. كما يجب إبلاغ الجهات المختصة عن تحقيق نقل العينات إلى المخابر المختصة.

5. الإبلاغ عن الوباء

بعض الأمراض الحاملة لخطر بيولوجي يجب الإبلاغ عنها بشكل إجباري (الجمرة الخبيثة، الجذام، التسمم البوتيلي، البروسيلا، الكوليرا، سالمونيلا، الحمى النزفية الفيروسية، الجدري)، وبعضها الآخر كالتولاريميا

من غير الضروري الإبلاغ عنها. إن أدنى شك بأحد هذه الأمراض، أو بتناذر إبتنائي أو سمي حاد وخطير، أو بأمراض غير طبيعية، ذات منشأ صعب التحديد متظاهر عند شخص وحيد أو عند جماعة، يجب أن يبلغ عنها بشكل فوري للجهات الصحية المختصة، ومن ثم جرى تحقيق صحي.

6. المعالجة

1. العزل:

بحقق العزل في حالتين:

- عند العناية بشخص تعرض لضبوب معد، في هذه الحالة الأشخاص المعتنين يجب أن يلبسوا ألبسة واقية، قفازات وأقنعة.
- المريض الحامل لإنتان معد مشخص يجب أن يعزل في حالة:
 - الجذري (حال ظهور الحمى، عزل تنفسي وجلدي).
 - الجذام الرئوي (عزل تنفسي).
 - الحمى النزفية الفيروسية (عزل تنفسي وجلدي).

2. التعقيم:

يجب القيام به بعد التعرض لضبوب (Aérosols) ويتضمن خلع الألبسة، أخذ حمام مع استعمال صابون عادي. في حال تعرض جلدي مباشر ومرئي على الجلد، فإنه يجب غسل المنطقة المصابة باستعمال ماء جافيل ممدد 0.5% (محلول ليتر واحد من ماء جافيل ممدد 5/1) أو محلول داكين Dakin، هذا ويجب ترك هذه المحاليل مكان تطبيقها على الجلد على الأقل 5 دقائق ومن ثم يغسل المكان لإزالتها.

3. الوقاية بعد التعرض:

يجب أن يقام بها بشكل سريع، بعد تعرض مؤكد ولكن ما زال كامناً، وذلك قبل معرفة العنصر الممرض. كلما كانت الوقاية باكراً كان نجاحها

أفضل. إنها موجهة للعناصر الجرثومية ويستعمل من أجل ذلك الفلوروكينولونات والسيكلينات أما بعد عزل الجرثوم الممرض فالمعالجة تكيف حسب الجرثوم، وحساسيته للصاد الحيوي وطبيعة الشخص المصاب. طرق الوقاية هذه موجودة على مركز إنترنت (www.afssaps.sante.fr) . اللقاح ضد الجدري، عندما يحقق خلال الأيام الأربعة التالية للتعرض للفيروس له فعالية واقية.

4. المعالجة:

الخيار العلاجي الفوري يوجه بحسب طبيعة العنصر المسبب (جرثوم، فيروس أو ذيفان)، وبحسب الإمكانية العلاجية المتوفرة ضد هذه العناصر. هذا وإننا لا نملك حالياً أية معالجة خاصة للسموم (خاصة للسم البوتيلي)، والأدوية المضادة للفيروسات قليلة: ريبافيرين لبعض الفيروسات (أرينافيروس، كريمة - كونغو)، سيدوفير للبوكسفيروس (فعالية داخل الزجاج). بينما بالنسبة للعناصر المسببة الجرثومية فإن إمكانيات معالجتها متوفرة: أغلبية الجراثيم هنا تكون حساسة على الفلوروكينولونات. هذه الأدوية (سيبروفلوكساسين، لوميفلوكساسين) يجب أن تقترح كخيار أول للمعالجة وذلك قبل عزل الجرثوم الممرض. طريق الإعطاء (فموي أو داخل الوريد) كيف بحسب خطورة المرض وعدد الضحايا.

هذا وإن ضرورة الحصول على فعالية سريعة للمعالجة تبرر مرافقة - منذ البدء - (الفلوروكينولون مع الأمينوزيد مثلاً)، وبالطبع يكيف الصاد الحيوي المعطى بعد عزل الجرثوم. بالنسبة لعصيات الجمرة فإن الخبرة الحديثة أظهرت فعالية المرافقات الدوائية، هذا وإن طرق المعالجة المختلفة لهذه العناصر متوفرة في مركز الإنترنت (www.afssaps.sante.fr).

5. الوقاية:

في حالة الضرورة، فإن اللقاح الوحيد المتوفر في فرنسا هو اللقاح المضاد للجدري.

31. حوادث التعرض للدم والسوائل البيولوجية

سنعرض هنا الأخطار المرتبطة بالـ VIH وفيروس التهابات الكبد. إن عدوى جرثومية أو طفيلية أو فطرية ممكنة الحصول، عند اللوخر العرضي بإبرة ملوثة بدم مريض مصاب بإنتان دم (بروسيللا، يرزينا، تولاريميا، ملاريا، كريبتوكوك).

إن حصول العدوى الفيروسية لأحد أفراد الفريق الطبي المتعرض للدم تتعلق بنسبة حصول الإنتان عند عامة الشعب (فيروس التهاب الكبد)، أكثر بـ 6 - 10 مرات من الـ (VIH)، وعند المرضى المعنيين بهم في المشفى احتمال العدوى يقدر بـ 100/30 ممرضة/سنة. تحدث الإصابة غالباً عن طريق اللوخر.

جدول 1 - خطر انتقال الـ VIH، التهاب الكبد B والتهاب الكبد C

حسب طريقة العدوى		حسب طبيعة السائل البيولوجي	
الجلد	المخاطية أو آفة مؤكدة	ممكنة	معدومة
التهاب الكبد B			
VIH	0.32%	0.04%	جدلية
		دم أو سوائل	نطاف إفرازات لعاب
		حاوية للدم	تناسلية، سائل بول
			دماغي شوكي، براز
			سائل الجنب
			والسائل
			الأمينوسي
التهاب الكبد B 2 - 10% إذا لم تقوم بعد			
Ag Hbe سلبى (احتمال وجود			
10 - 40% إذا خطورة مرتفعة)			
Ag Hbe إيجابي			
التهاب الكبد C 1.2%			
		دم أو سوائل	نطاف، إفرازات بول
		حاوية للدم	تناسلية، لعاب براز

* مصدر عدوى كامن ولكن لا يسبب إطلاقاً عدوى عائدة إلى طبيعة العمل.

1 - التوقية من حوادث التعرض للدم (وغيره من)

تستند عادة إلى اتخاذ الاحتياطات العامة الأساسية. هذا ويجب إعطاء اللقاح المضاد لالتهاب الكبد B لكل الفريق الطبي.

جدول 2 - الاحتياطات الصحية العامة أو الاحتياطات الأساسية

الواجب تطبيقها عند العناية بالمريض

في حال تماس مع الدم أو سائل بيولوجي	- بعد وخزة أو جرح: غسل مع وضع معقم مكان الجرح. يجب عدم العمل على إجراء سيلان الدم.
	- بعد إصابة المخاطية بمفرزات مقذوفة (الملتحمة): غسل غزير.
غسل الأيدي أو غسلها وتعقيمها	- بعد خلع القفازات، في حال العناية بين مريضين، أو في حال القيام بعملين مختلفين للمريض نفسه.
لبس القفازات	- في حال التماس مع الدم أو أي مادة إنسانية أخرى، مع المخاطيات أو الجلد المصاب للمريض، خاصة عند القيام بعمليات معرصة للوخز (زرع الدم، وضع أو نزع طريق وردي، أخذ عينة دموية...) وعند استعمال أنابيب العينات البيولوجية، الثياب أو الأدوات الملوثة.
القفازات يجب أن تغير بين مريضين، وعند القيام بعملين مختلفين للمريض نفسه	- أدوات وإخزة أو قاطعة ذات استعمال لمرة واحدة: عدم وضع غمد الإبرة من جديد، ووضعها الفوري بعد استعمالها في وعاء خاص، موضوع قرب مكان العناية، كما يجب التحقق من كمية المواد الموضوعة في هذا الوعاء.
الأدوات الملوثة	- أدوات قابلة للاستعمال من جديد: يجب الحذر عند استعمال هذه الأدوات الملوثة بالدم أو بأي مواد إنسانية أخرى. التحقق من أن هذه الأدوات خضعت لإجراءات تعقيم خاصة قبل إعادة استعمالها.
للسطوح الملوثة	- تنظيف ومن ثم تطهير بماء جافيل ممدد بماء عادي بنسبة 1/10% (أو بأي مطهر آخر مناسب) للسطوح الملوثة بمفرزات مقذوفة أو بالدم أو بأي مادة ذات أصل إنساني.
نقل العينات البيولوجية للفسيل، والأدوات الملوثة	- العينات البيولوجية، الفسيل أو الأدوات الملوثة بالدم أو أي مادة أخرى ذات أصل إنساني يجب أن تنقل من الشعبة وذلك بوضعها في أكياس محكمة الإغلاق.

2. التصرف في حالة حادث التعرض للدم

1. عناية فورية: تنظيف الجرح:

إذا كان هناك تلوث للمخاطية ناتج عن قذف للمفرزات: تنظيف غزير لمدة 5 دقائق بالماء أو بالسيروم الملحي، ومن ثم - في حالة تلوث العين - استعمال قطرة عينية مطهرة.

2. الإعلان عن حصول حادث عمل:

يجب إجراؤه خلال الـ 24 ساعة التالية للتعرض (في أوقات العمل)

1. لطبيب العمل.

2. لإدارة المشفى.

3. تقويم الخطورة الإثنائية:


تعني تقويم خطورة انتقال الـ VIH، أو التهاب الكبد B والتهاب الكبد C. هذه الإجراءات تعتبر إجراءات إسعافية بالنسبة للفريق الطبي المعنتي بالمريض المصاب بهذه الأمراض.

1. حسب شدة التعرض: العوامل المؤهبة: وخز عميق أو نازف، وجود دم على الأداة المسببة للجرح، إبرة مثقوبة كانت قد استعملت داخل الوريد أو داخل الشريان بصورة مباشرة، مريض مصاب بمرض شديد التطور (في مرحلته النهائية)، حمل جرثومي مرتفع.

2. حسب طبيعة السائل البيولوجي المسؤول عن الإثنان، (جدول 1) يجب تحديد حالة المريض الناقل للإثنان. فحوص مصلية لفيروس التهاب الكبد C، Ag Hbe، Ag Hbs، فحوص مصلية لفيروس VIH، مرحلة الإصابة السريرية، المعالجة السابقة والحالية، CD₄، الحمل الفيروسي.

في حال عدم معرفة الفحوص المصلية: فإنه يجب وصف إذا أمكن بعد موافقة المريض المصدر، الفحوص المصلية لالتهاب الكبد C، للـ VIH والفحوص المصلية لالتهاب الكبد B. في حال كون الشخص المعرض غير ملقح ضد التهاب الكبد B.

صورة: خطة العمل في حالة التعرض للدم أثناء العمل



4. إعلام الفريق الطبي القائم بالعناية:

على خطورة الأمراض الإنتانية المحتمل الإصابة بها، وطرق الوقاية بعد التعرض، وعلى عدم فعالية الوقاية بشكل مطلق والآثار الجانبية.

5. طرق الوقاية بواسطة الأدوية المضادة للفيروس القهقري Antiretrovirale:

إذا كان المريض ذو تفاعل مصلي VIH إيجابي واحتمال إصابة الفرد المعتني به كبير: يجب وصف أدوية مضادة للفيروس القهقري وأخذها فوراً (خلال الساعات الأربعة الأولى التالية للتعرض، ولكن يمكن أيضاً اقتراح استعمال هذه الأدوية حتى الـ 48 ساعة التالية للتعرض)، وذلك لمدة 4 أسابيع. أنظر جدول 3 في حال عدم معرفة إذا كان المريض ذو VIH سلبي أو إيجابي أو أن نتيجة فحص الـ VIH لم تعرف بعد: فإن تطبيق الوقاية يستند على المعطيات السريرية للمريض، على شدة التعرض والمعطيات الوبائية. في حالة الشك فإن تطبيق الوقاية يجب أن يكون فوراً (جدول 3) مع إعادة التقويم 48 ساعة من قبل أخصائي. العلب الحاوية على الأقل 5 أدوية مضادة للفيروس القهقري مع طريقة الاستعمال (أنظر الصورة) يجب أن تكون جاهزة دائماً 24 ساعة/24.

6. المتابعة:

تجرى إعادة التقويم بعد 48 ساعة: استطببات الوقاية وطرقها، تحملها. كما يجب إجراء فحوص بيولوجية (تعداد وصيغة، ترانس أميناز) وسريرية بعد أسبوعين ومن ثم 4 أسابيع.

7. المتابعة من قبل طبيب العمل:

- في حالة الـ VIH: فحوص مصلية قبل اليوم 8، في الشهر 1، 3، 6 وشهر 4 و7 في حال الوقاية بالأدوية المضادة للفيروس القهقري.

جدول 3 - توصيات من أجل المعالجة الكيميائية الوقائية بواسطة الأدوية المضادة

للفيروس القهقري بعد التعرض للإصابة بدم مريض VIH إيجابي

نمط الإصابة	المادة البيولوجية	الوقاية المضادة	الأدوية المضادة
جلدي	دم	للفيروس القهقري	للفيروس المستعملة
	● خطورة شديدة الارتفاع* منصوح بها	دوائين من عائلة المثبطات	الغيرنوكليوزيدية
	أو مرتفعة**	● خطورة منخفضة***	مقترحة
	سائل بيولوجي	● محتو على دم مرئي أو	للترانسكريبتاز المعقولة
	سائل ذو خطورة إنتانية	● سائل بيولوجي آخر	ودواء من عائلة مثبطات
	● سائل بيولوجي آخر	غير مقترحة	البروتيناز
مخاطية أو جلدية	دم	مقترحة	مماثلة للسابقة
مع خطورة مرتفعة****	سائل بيولوجي	مقترحة	
	● محتو على دم مرئي أو		
	سائل ذو خطورة إنتانية		
	● سائل بيولوجي آخر	غير مقترحة	
* خطورة شديدة الارتفاع: التعرض لكمية دم كبيرة (وخزة عميقة بواسطة إبرة ذات قطر كبير كانت قد استعملت من أجل بزل وريدي أو شرياني للمريض) مع كون المريض مصاب بإنتان أولي أو سيدا في مرحلتها النهائية، مع حمل فيروسي بلا سمي مرتفع).			
** خطورة مرتفعة: وجود واحدة من الحالتين السابقتين.			
*** خطورة منخفضة: عدم وجود الحالتين السابقتين.			
**** في حال كون المريض VIH إيجابي، فإنه يجب تكييف الوقاية حسب الحمل الفيروسي وحسب المعالجة المطبقة على المريض المصدر. في كل الأحوال فإنه يجب تجنب الأدوية ذات السمية المرتفعة (إيفا فيرنيز) أو المحسنة (نيفيرابين، أبلكافير).			

- في حال التهاب الكبد الإنتاني B: في حال كون المصاب ملقحاً: يجب التأكد من أن اللقاح متابع بشكل جيد، كما يجب معايرة الأجسام الضدية المضادة للـ HBs، في حال عدم أخذ اللقاح أو عند مصاب غير ممنوع: معايرة الترانس أميناز + الأجسام الضدية المضادة لـ HBs ومولدات الضد Hbs في اليوم 10، الشهر 3 و6.

- في حالة التهاب الكبد الإنتاني C: في حال كون المريض حامل للفيروس أو غير معروف إذا كان مصاباً أولاً: معايرة الـ ALAT يوم 10، شهر 1

و3، فحوص مصلية يوم 0، أشهر 1، 3، 6.
الـ PCR بالنسبة لفيروس التهاب الكبد C، مستطبة في حال كون الـ
ALAT مرتفعة وفي حال كون الفحوص المصلية إيجابية.

32. المعالجة الوقائية بالصادات الحيوية للحالات الجراحية

هدفها إنقاص عدد الإنتانات الحادثة على مكان التداخل الجراحي، سواء كان سطحياً أو عميقاً، وليس الإنتانات الحاصلة بعد فترة من العمل الجراحي. المعالجة بالصادات الحيوية يجب أن تكون مرتبطة مع إجراءات التعقيم الأخرى ذات الهدف المشترك (أنظر فصل 29)، وهي تعطى قبل حصول العدوى الجرثومية الكامنة المرتبطة بالعمل الجراحي.

1. على أي جراحة تطبق؟ وعلى أي مريض

المعالجة الوقائية بالصادات الحيوية يجب أن يحتفظ بها للتدخلات الجراحية المترافقة باحتمال مرتفع لحصول إنتان ما بعد العمل الجراحي وللتدخلات التي اختلاطاتها الإنتانية - بالرغم من ندرتها - شديدة الخطورة بشكل يهدد الحياة أو يترك آثاراً وظيفية خطيرة.

إنها مستطبّة فقط للعمليات الجراحية المصنفة في المستوى I (نظيفة) أو مستوى II (نظيفة معدية) وذلك حسب تصنيف ألتمير Altemeier (جدول 3). التدخلات الجراحية مستوى III (معدية) أو مستوى IV (وسخة) تتطلب معالجة شافية بالصادات الحيوية، مكيفة حسب نوع الإنتان، حيث أن هذا الأخير يكون موجوداً قبل العمل الجراحي.

إن حصول إنتان ما بعد العمل الجراحي يتعلق بعوامل عدة، من الواجب السيطرة عليها قدر الإمكان (جدول 1).

وهكذا فإن الصاد الحيوي ليس إلا واحداً من العوامل المنقصة للإنتان من أجل نفس العمل الجراحي، الخطورة الإنتانية تختلف حسب الحالة الصحية السابقة للمريض مقومة بحسب محصلة ASA (رابطة المخدرين الأميركية American Society of Anestésiologie) (جدول 2) حسب تصنيف العمل الجراحي في تصنيف ألتمير Altemeier (جدول 3)، ومدة العمل الجراحي (جدول 4). هذه المعطيات المتعددة تسمح بحساب محصلة NNIS (البرنامج

الوطني الأميركي لمراقبة الإنتانات النوزوكوميالية) (جدول 2). بالنسبة للمرضى المعرضين لخطورة الإصابة بالتهاب شغاف القلب الإنتاني، فإن المعالجة الوقائية بالصادات الحيوية يجب أن تهدف إلى تغطية مزدوجة الأولى للوقاية من التهاب شغاف القلب الإنتاني والثانية للوقاية من إنتان مكان التدخل الجراحي. لذلك يجب تكييفها حسب التوصيات المتعلقة بالوقاية من التهاب شغاف القلب الإنتاني (أنظر الفصل 4، الجزء الأول)، ولكن مهما كانت الحالة، فإن المدة يجب ألا تتغير.

2. أسس المعالجة الوقائية بالصادات الحيوية

البروتوكولات المكتوبة للمعالجة الوقائية بالصادات الحيوية يجب أن توضع محلياً من قبل الأطباء. ويجب أن تأخذ بالحسبان توصيات الهيئات المختصة والبيئة الجرثومية المحلية، كما يجب أن تصدق من قبل لجنة الصادات الحيوية وهيئة المقاومة ضد الإنتانات النوزوكوميالية. كما يجب تقويم هذه البروتوكولات بشكل روتيني وذلك بمراقبة نسبة إنتانات مكان العمل الجراحي والعضويات المجهريّة المسؤولة عن هذا الإنتان. هذا ويجدر الإشارة إلى أن الخطورة الإنتانية للعمليات الجراحية التنظيرية (باستثناء المرضى الحاملين لمرض قلبي مؤهب للإصابة بالتهاب شغاف القلب الإنتاني) لم تقوّم بشكل كاف يسمح بوضع بروتوكول خاص بها.

1. اختيار الصاد الحيوي:

- يجب أن يكون فعالاً على الجراثيم الأكثر مصادفة في مكان التدخل الجراحي، وذلك حسب طبيعة هذا التدخل: في حال الجراحة النظيفة، مكورات غرام \oplus هي الأكثر شيوعاً، في حين أنه في حالة الجراحة النظيفة الملوثة فإن العصيات غرام \ominus (الجراثيم المعوية) وفي بعض الأحيان الجراثيم اللاهوائية (خصوصاً الجراثيم الهشة *fragilis*، لبعض التداخلات الجراحية ولا سيما المستقيم الشرجية) تكون أكثر شيوعاً.

جدول 1 - عوامل تزيد من احتمال حدوث إنتان مكان التدخل الجراحي

التحضير ما قبل العمل الجراحي: حمام مع	حالة المريض السابقة: العمر، السمنة،
استعمال مطهر، تقنية نزع الشعر، مدة ما بين	حالته الغذائية، وجود أمراض سابقة،
الحلاقة وبداية العمل الجراحي أقصر ما يمكن.	إنتانات سابقة.
التدخل الجراحي: طبيعة الشاغات المستعملة، خبرة	فترة الإقامة ما قبل العمل الجراحي.
الفريق الجراحي، تخثير الدم، ورم دموي، مدة	
العمل الجراحي، تقجير الجروح الجراحية.	

جدول 2 - حساب محصلة NNISS

(National nosocomial infections surveillance système)

3 عوامل مستقلة أخذت في عين الاعتبار:

- فئة ASA 3، 4 أو 5: نقطة واحدة.
- فئة التمييز Atteimer (جنول 3 أو 4): نقطة واحدة.
- مدة العمل الجراحي أطول من زمن "ز" جدول 3: نقطة واحدة.

احتمال حصول الإنتان (لكل الجراحات)

احتمال حصول الإنتان (%)	محصلة NNISS (نقط)
1.5	0
2.6	1
6.8	2
13	3

• تصنيف الـ ASA (American Society of anesthesiologists)

- ASA₁: مريض ليس عندهم أي مرض، باستثناء المرضى المتطلب للتدخل الجراحي.
- ASA₂: مريض عندهم اضطرابات معتدلة لوظيفة كبرى.
- ASA₃: مريض عندهم اضطرابات شديدة لوظيفة كبرى.
- ASA₄: مريض عندهم خطورة حالية على حياتهم.
- ASA₅: مريض مشرف على الموت.

- يجب اختيار الصاد الحيوي الفعال والذي يؤدي إلى اصطفاء أقل للجراثيم المقاومة.
- تركيز الصاد الحيوي المختار في مكان التدخل الجراحي يجب أن يكون أكبر من الـ CMI للعضوية المجهرية المسببة للإنتان.
- آثاره الجانبية يجب أن تكون أقل ما يمكن.
- كلفته أقل مع فعالية مكافئة للصادات الحيوية الأخرى.

- يجب ألا يستعمل الفانكوميسين إلا في الحالات المشتبه بالمكورات العنقودية كمسبب لها، أو في حالة وجود تحسس على البيتا لاكتامين أو في حالة مريض أت من أقسام ذات خطورة إنتانية مرتفعة.

2. البداية - طريق الإعطاء - مدة المعالجة:

الطريق الوريدي هو الطريق الأفضل من أجل الحصول على تراكيزات فعالة للصاد الحيوي أثناء التداخل الجراحي. جراحة الأمعاء الغليظة والشرح، والتي الطريق الفموي يمكن أن يكون فعالاً لها، تشكل حالة خاصة. إعطاء الصاد الحيوي - في كل الحالات - يجب أن يسبق للتدخل الجراحي: هذا وإن لحظة بداية التخدير تشكل الوقت الأنسب لإعطاء الصاد الحيوي الواقى، كما يمكن إعطاء هذا الصاد الحيوي خلال الساعة السابقة لبداية الخزع. مدة المعالجة الوقائية بالصادات الحيوية يجب أن تكون قصيرة، محصورة في حالة الإمكان خلال مدة العمل الجراحي فقط، أحياناً 24 ساعة، ويجب ألا تتجاوز إطلاقاً الـ 48 ساعة، حتى ولو بقي هناك مفجرات وقناطر في مواضعها (حيث أنه لم يثبت فائدة إعطاء المعالجة الوقائية بالصادات الحيوية لفترة أطول، ولا لإعادة حقنها عند نزع هذه الأدوات).

3. الجرعة:

يجب أن تكون الجرعة المعطاة مرتفعة، معادلة للجرعة العلاجية الأقوى. في حالة التداخل الجراحي الطويل المدة وفي حال كون الصاد الحيوي نو فترة نصف حياة قصيرة، فالمبدأ العام هو عودة إعطاء الصاد الحيوي كل مدة فترتي نصف حياة (نصف جرعة كل مرة إذا كانت الجرعة الأولى مرتفعة).

3. اقتراحات المعالجة الوقائية بالصادات الحيوية

أخذت هذه الاقتراحات من مؤتمرات وتوصيات الهيئة الفرنسية للتحذير والإنعاش عام 1992 (جدول 5 حتى جدول 15)، وأعيد تقويمها عام 1998 بواسطة فريق من الخبراء لنفس الهيئة.

جدول 3 - خطورة إثنان مكان العمل الجراحي بحسب نوع

التدخل الجراحي (Altemeier)

1. جراحة نظيفة: احتمال حصول إثنان	3. جراحة ملوثة:
من دون صاد حيوي 1 - 2%،	من دون صاد حيوي 20 - 35%،
مع صاد حيوي >1%	مع الصاد الحيوي 10 - 15%
لا يوجد رض، لا يوجد التهاب، لا يوجد فتح لأحد الأعضاء المجوفة، لا يوجد انقطاع في التعقيم.	رض مفتوح منذ مدة أقل من 4 ساعات، جراحة على مكان فيه بول أو سائل صفرلوي مجرئين.
2. جراحة نظيفة ملوثة:	تلوث هام بالمحتوى الهضمي.
من دون صاد حيوي 10 - 20%،	4. جراحة وسخة:
مع صاد حيوي 7%.	إثنان جرثومي مع أو بدون قيح، رض مفتوح منذ مدة <4 ساعات، أو وجود جسم أجنبي، وجود نسج متموتة، تلوث غائطي.
فتح لأحد الأعضاء المجوفة مع تلوث بسيط جداً (قم حجرة، الأنبوب الهضمي العلوي، الطرق التنفسية، الجهاز البولي والتناسلي، الطرق الصفراوية).	
انقطاع بسيط جداً في التعقيم.	

جدول 4 - مدة العمل الجراحي التي تجاوزهها يزيد من احتمال

حصول إثنان ما بعد العمل الجراحي

نوعية العمل الجراحي	المدة بالساعة	جرح مفتوح (4419)	2
مفاغرة إكليلية (7553)	5	طعم مفصلي (5696)	3
جراحة قلبية (1042)	5	جراحات عظمية أخرى (5552)	2
جراحة أوعية (4982)	3	قيصرية (7171)	1
جراحة قلبية وعائية غير السابقة (1032)	2	استئصال الرحم عن طريق البطن (4002)	2
جراحة صدرية (1191)	3	استئصال الرحم عن طريق المهبل (747)	2
استئصال الزائدة (1569)	1	جراحات توليد أخرى (27)	1
جراحة صفراوية كبدية أو بنكرياسية (210)	4	استئصال الكلية (321)	3
استئصال الحويصل الصفراوي (4508)	2	استئصال البروستات (402)	4
استئصال الأمعاء الغليظة (2285)	3	جراحات بولية أخرى (4549)	2
جراحة هضمية (802)	3	الحنجرة، البلعوم (935)	4
جراحة الأمعاء الدقيقة (533)	3	أنف، أنف (1061)	3
فتح البطن (2630)	2	خزخز الجمجمة (1247)	4
فتق (2630)	2	تحويل بطينية نماغية (725)	2
استئصال الطحال (172)	2	جراحات عصبية أخرى (521)	2
جراحات هضمية أخرى (638)	3	استئصال الثدي (1779)	2
البتر (1962)	1	جراحة عدد صم (335)	2
جراحة العمود الفقري (5657)	1	جراحة عينية (941)	2

* الأرقام بجانب التدخل الجراحي تشير إلى عدد التداخلات التي سمحت بالقيام بحساب الزمن المسجل.

جدول 5 - الجراحة النسائية وجراحة التوليد

التدخل الجراحي	الصاد الحيوي	الجرعة	المدة
استئصال الرحم عن طريق المهبل، استئصال الرحم عن طريق خزع البطن، الجراحة التنظيرية	سيفازولين تحسن: كلينداميسين + جنتاميسين	4 غ قبل التدخل الجراحي 600 مع 2 - 3 مغ/كغ	جرعة وحيدة (إعطاء حقنة ثانية 1 غ إذا كانت مدة العمل الجراحي < 4 سا) جرعة وحيدة
عملية قيصرية	سيفازولين تحسن: كلينداميسين	2 غ بعد التقاط الحبل السري 600 مغ بعد التقاط الحبل السري	جرعة وحيدة
إنهاء الحمل الاختياري	دوكسيسيكليين	200 غ عن طريق الفم	قبل الشفط بساعة واحدة
الجراحة الثديية - ورم الثدي: باتي Patey - جراحة إعادة تشكيل الصدر (طعم ± قطعة من الصدرية الكبيرة أو قطعة حرة أو متصلة بالعضلة المستقيمة الكبيرة) - جراحة تجميلية للصدر	سيفازولين تحسن: كلينداميسين + جنتاميسين	2 غ قبل التدخل 600 مغ 2 - 3 مغ/كغ	جرعة وحيدة (إعادة الحقن إذا مدة التدخل < 4 سا) جرعة وحيدة (إعادة حقن 600 مغ بعد 4 ساعات بالنسبة للكلينداميسين)
ملاحظة: استئصال ورم بسيط، جراحة الحلمة: لا يوجد استطباب لإعطاء الصادات الحيوية. لولب داخل الرحم: لا يوجد استطباب لإعطاء الصاد الحيوي.			

جدول 6 - الجراحة الصدرية

التدخل الجراحي	الصاد الحيوي	الجرعة	المدة
استئصال رئوي	سيفازولين سيفاماندول سيفوروكسين	2 غ قبل التدخل ومن ثم 8/غ 1.5 غ قبل التدخل ومن ثم 0.75 غ/6 1.5 غ قبل التدخل ومن ثم 0.75 غ/6	24 سا 24 - 48 سا 24 سا
جراحة المنصف	أنظر جراحة الاستئصال الرئوي		
جراحة الصدر	أنظر جراحة الاستئصال الرئوي		
التفجير الصدري	لا يوجد استطباب للصادات الحيوية		
تنظير المنصف	لا يوجد استطباب للصادات الحيوية		

جدول 7 - جراحة الأنف، حنجرة، الجراحة الفكية والرقبية الوجهية

التدخل الجراحي	الصاد الحيوي	الجرعة	المدة
جراحة أنفية مع وضع سيفازولين	2 غ قبل التدخل	جرعة وحيدة	
جراحة رقبية وجهية عن بنسيلين A +	2 غ قبل التدخل ومن ثم 1 غ/6 سا	24 - 48 سا	
الطريق الفموي البلعومي مثبتات البيتالاكتاماز كبديل:			
كلينداميسين	600 مغ/12 سا	48 سا	
	2 - 3 مغ/كغ، جرعة وحيدة/24	48 سا	

جراحة الأنف الوسطى، الجراحة السنخية، جراحة القند اللعابية، استئصال غدد لمفاوية، جراحة شراع الحنك، استئصال اللوزات: لا يوجد استطباق للصادات الحيوية.
استئصال اللوزات، استئصال غدد لمفاوية، تنبيب أنفي قصبي: الوقاية من التهاب شغاف القلب الإنتاني (انظر فصل 4، التهاب شغاف القلب الإنتاني).

جدول 8 - الجراحة البولية (بول عقيم)

التدخل الجراحي	الصاد الحيوي	الجرعة	المدة
استئصال المثانة والأورام سيفوروكسيم	1.5 غ قبل التدخل	جرعة وحيدة	
داخل المثانة عن طريق سيفاماندول	1.5 غ قبل التدخل	جرعة وحيدة	
التنظير أو عن طريق كبديل: [جنتاميسين أو	4 مغ/كغ	جرعة وحيدة	
فتح البطن (إعطاء توبراميسين أو		جرعة وحيدة	
الصادات الحيوية مختلف نيترومييسين] أو			
عليه هنا).	فلوروكينولون		
خزعة بروسات عن	فلوروكينولون عن		جرعة وحيدة
طريق الشرج	طريق الفم		
معالجة حصيات الكلية	أنظر الاستئصال بالتنظير		جرعة وحيدة
بالتنظير			

استئصال المثانة أنظر الجراحة البولية (الخطة العامة)
التدخل بالألوان على الحالب والحويضة، خزعة البروستات أو الطرق البولية، ثلثيت الحصة، الوقاية من التهاب شغاف القلب الإنتاني (أنظر فصل 4، التهاب شغاف القلب).
جراحة العجان والسلس البولي: لا يوجد استطباق للصادات الحيوية.

جدول 9 - الجراحة الهضمية

التدخل الجراحي	الصاد الحيوي	الجرعة	المدة
● جراحة هضمية من نون فتح الأنبوب الهضمي	سيفازولين	2 غ قبل التدخل	جرعة وحيدة (إعادة الحقن 1 غ إذا كانت مدة التدخل < 4 سا)
● جراحة معدية معوية (بما فيها استئصال المعدة بالتنظير)	تحسس: كلينداميسين	600 مغ	جرعة وحيدة (إعادة الحقن 600 مغ إذا كانت المدة < 4 سا بالنسبة للكلينداميسين)
● الجراحة الصفراوية			
● جراحة المعكولة من نون مغاغة هضمية			
● جراحة كبديّة			
● جراحة المريء			
فتق غير مختلط	لا يوجد استطباق للصادات الحيوية		
فتق أو انثقاق مع وضع صفحة اصطناعية	سيفازولين	2 غ قبل التدخل	جرعة وحيدة (إعادة الحقن 1 غ إذا كانت مدة التدخل < 4 سا).
	تحسس: كلينداميسين	600 مغ	جرعة وحيدة (إعادة حقن 600 مغ إذا مدة < 4 سا بالنسبة للكلينداميسين)
جراحة مستقيمية شرجية الزائدة وجراحة الأمعاء الدقيقة	سيفوتيتان	2 غ قبل التدخل	جرعة وحيدة (إعادة الحقن 1 غ إذا مدة < 3 سا)
(بما فيها التفاغر الهضمي)	سيفوكسيتين	2 غ قبل التدخل	جرعة وحيدة (إعادة الحقن 1 غ إذا مدة < 2 سا)
	بنيسيللين A + مبيطات البيتا لاكتاماز	2 غ قبل التدخل	جرعة وحيدة (إعادة للحقن 1 غ إذا مدة < 2 سا)
	تحسس: إيميدازول + جنتاميسين	1 غ قبل التدخل 2 - 3 مغ/كغ	جرعة وحيدة
جراحة مستقيمية	إيميدازول	0.5 غ قبل التدخل	جرعة وحيدة
جروح البطن	أنظر الجراحة المستقيمية الشرجية		
جراحة هضمية على عضو ذو احتمال عال لتوليد إثنان (استئصال الحويصل الصفراوي، استئصال الكولون). وقاية من التهاب شغاف القلب الإثنائي (أنظر فصل 4، الجزء الأول، التهاب شغاف القلب الإثنائي).			

* زائدة غير ملتصقة أو ملتصقة مع غياب خراج أو انتفاخ أو تنخر.

جدول 10 - الجراحة العصبية

التدخل الجراحي	الصاد الحيوي	الجرعة	المدة
مقاغة تحويلة داخلية	أوكسا أو كلوكساسيلين كيديل	100 مغ/كغ/24 سا 4 جرع	24 ساعة
	كوتريموكسازول	حقتين قبل التدخل ومن ثم حقنة/8 سا	24 ساعة
	أو فانكوميسين*	1 غ قبل التدخل	جرعة وحيدة
خزع الجمجمة	سيفازولين كيديل	2 غ قبل التدخل	جرعة وحيدة
	فانكوميسين	1 غ قبل التدخل	جرعة وحيدة
جراحة عصبية عبر التيه	سيفازولين كيديل	2 غ قبل التدخل	جرعة وحيدة
أو عبر الوتدية	فانكوميسين*	1 غ قبل التدخل	جرعة وحيدة
جراحة العمود الفقري مع	سيفازولين كيديل	2 غ قبل التدخل	جرعة وحيدة
وضع أدوات فيه	فانكوميسين*	1 غ قبل التدخل	جرعة وحيدة
جرح جمجمي دماغي	بنيسيللين A + مثبطات البيبتالاكتاماز 6 سا كيديل	2 غ قبل التدخل ومن ثم 1 غ/48 سا	
	فانكوميسين	1 غ/8 سا	48 سا

جرح قاعدة الجمجمة مع ثر أنفي: لا يوجد استطباب للصادات الحيوية
جراحة العمود الفقري من دون وضع أدوات فيه: لا يوجد استطباب للصادات الحيوية.

* استطبابات الفانكوميسين:

- تحسس على البيتالاكتامين.
- الشك بوجود استعمار جرثومي بالمكورات العنقودية المقاومة للميتيسيللين.

جدول 11 - الجراحة القلبية - الصدرية والوعائية

للجراحة القلبية الصدرية والوعائية للأقنات الغير إنتانية (سرطان) أو الإنتانية (خراج) تختلط غالبا بإنتانات (10 - 25% من التداخلات).			
التدخل الجراحي	الصاد الحيوي	الجرعة	المدة
الجراحة القلبية	سيفازولين	2 غ قبل التداخل	إعادة الحقن مرة واحدة 1 غ بعد 4 ساعات
	سيفاماندول	1.5 غ قبل التداخل ومن ثم إعادة حقن مرة واحدة 0.75 غ/6 سا	
	سيفوروكسيم	1.5 غ قبل التداخل ومن ثم 0.75 غ كل ساعتين قبل التداخل 0.75 غ/6 سا	
	كيديل فانكوميسين *	1 غ قبل التداخل 10 مغ/كغ قبل وضع جهاز الدوران خارج الجسم. ومن ثم كل 8 سا	24 - 48 سا
جراحة الأوعية البطنية أووعية الأطراف السفلية والأوعية الصدرية	أنظر الجراحة القلبية	أنظر الجراحة القلبية (عدم إعطاء جرعة قبل وضع جهاز الدوران خارج الجسم)	24 سا جرعة وحيدة إذا مدة > 2 سا
وضع أو تغيير ناظم الخطى	أنظر الجراحة القلبية	أنظر الجراحة القلبية	جرعة وحيدة
قطع طرف	بنيسيللين A + مثبطات البيبتاكتاماز بنيسيللين G + إيميدازول كيديل كلينداميسين + جنتاميسين	2 غ قبل التداخل ومن ثم 1 غ/6 سا	48 سا
		600 مغ/12 سا 2 - 3 مغ/كغ/24 سا	48 سا

جراحة وريدية: لا يوجد استطباب لإعطاء صاد حيوي

* استطبابت إعطاء الفانكوميسين: تحسن على البيتاكتامين، شك بوجود استعمار جرثومي عائد للمكورات العنقودية المقاومة للميتيسيللين.

جدول 12 - الجراحة العينية

التدخل الجراحي	الصاد الحيوي	الجرعة	المدة
زراعة عينية وجراحة الصاد عند مريض السكري	فلوروكينولون	عن طريق الفم	جرعة وحيدة
جرح العين	فلوروكينولون داخل الوريد + فوسفوميسين		24 سا
الجراحات الأخرى المبرمجة: لا يوجد استطباب للصاد الحيوي			

جدول 13 - الجراحة العظمية والرضية

المتدخل الجراحي	الصاد الحيوي	الجرعة	المدة
طعم مفصلي	سيفازولين	2 غ قبل التدخل (إعادة حقن 48 سا 1 غ في حال مدة < 4 سا) ومن ثم 1 غ/8 سا	48 سا
	سيفاماندول	1.5 غ قبل التدخل (إعادة حقن 0.75 غ إذا مدة < 2 سا) ومن ثم 0.75 غ/6 سا	48 سا
	سيفوروكسيم	1.5 غ قبل التدخل (إعادة حقن 1 غ إذا مدة > 2 سا) ومن ثم 0.75 غ/6 سا	48 سا
	تحسن: فانكوميسين	1 مغ/كغ قبل التدخل. ومن ثم 10 مغ/كغ/8 سا	
جراحة عظمية مع وضع أدوات أو طعم عظمي مكان التدخل	سيفازولين	2 غ قبل التدخل	جرعة وحيدة (إعادة حقن 1 غ إذا مدة < 4 سا)
تدخل على وتر، كسر مطلق	تحسن: فانكوميسين	15 مغ/كغ قبل التدخل ومن ثم 10 مغ/كغ/8 سا	جرعة وحيدة
جراحات عظمية أخرى: لا يوجد استئطاب لإعطاء صادات حيوية.			
جراحة العمود الفقري	أنظر الجراحة العصبية		
كسر مفتوح (درجة I أو II من تصنيف جوستيلو وأندرسن Gustilo & Anderson)	سيفازولين	2 غ قبل التدخل (إعادة حقن 1 غ في الساعة الرابعة) ومن ثم 1 غ/8 سا	48 سا
نفس النمط الكسر مع جرح ملوث	بنيسيلين A + + جنتاميسين	2 غ قبل التدخل (إعادة حقن 1 غ إذا مدة < 2 سا ومن ثم 1 غ/8 سا)	48 سا
	تحسن: كلينداميسين + جنتاميسين	600 مغ/12 سا 2 - 3 مغ/كغ/24 سا	48 سا
رضوض متعددة مع صدمة نزفية	بنيسيلين A + مضبطات البيتا لاكتاماز	2 غ قبل التدخل	جرعة وحيدة (إعادة حقن 1 غ إذا مدة < 2 سا)
	تحسن: كلينداميسين + جنتاميسين	600 مغ/12 سا 3 مغ/كغ	24 سا جرعة وحيدة

* استئطابات الفانكوميسين:

- تحسن على البيتا لاكتامين.

- لشك باستعمار جرثومي عائد للمكورات العنقودية المقاومة للميتيسيلين.

جدول 14 - الجراحة التجميلية وإعادة التكوين

التدخل الجراحي	الصاد الحيوي	الجرعة	المدة
جراحة تجميلية وإعادة تكوين درجة I لتصنيف Altmeier	سيفازولين تحسن: كلينداميسين	2 غ قبل التدخل	جرعة وحيدة (إعادة حقن 1 غ إذا مدة < 4 سا)
جراحة تجميلية وإعادة تكوين درجة II لتصنيف Altmeier	بنيسيللين A + مبسطات البيتا لاكتاماز تحسن: كلينداميسين	2 غ قبل التدخل	جرعة وحيدة (إعادة حقن 1 غ إذا مدة < 2 سا)
		600 مغ	جرعة وحيدة (إعادة حقن 600 مغ إذا مدة < 6 سا)

جدول 15 - التنظير والتصوير الشعاعي الاختراقي

التدخل الجراحي	الصاد الحيوي	الجرعة	المدة
● تنظير الطرق الصفراوية مع وجود عائق	سيفازولين تحسن:	2 غ قبل التدخل	جرعة وحيدة (إعادة الحقن 1 غ إذا مدة < 4 سا)
● تصليب دوالي المريء	كلينداميسين	600 مغ قبل التدخل	جرعة وحيدة
● ربط دوالي المريء في جنتاميسين		2 - 3 مغ/كغ	
● فترة النزف			
● استئصال المعدة عن طريق التنظير			

التدخلات التي من أجلها الوقاية من التهاب شغاف القلب الإثنائي تكون أهم من الوقاية من إثنان مكان التدخل الجراحي (أنظر فصل 4، الجزء الأول، الجدول 10).

- تنظير الطرق الصفراوية بوجود عائق، تصوير الطرق الصفراوية بالطريق الراجع.
- تصليب دوالي المريء.
- توسيع المريء.
- تنظير الكولون والمستقيم.

33. الإنتانات الشائعة عند المدمن على المخدرات

البيروجينات للمواد المختلفة المحقونة يمكن أن تعطي ترفعات حرارية انعكاسية غير مترافقة بالضرورة مع إبتان. في هذه الحالة الترفع الحروري يكون ذو فترة قصيرة (>24 ساعة).

في حالة الإبتان، العلامات السريرية توجه نحو التشخيص، ولكن البحث عن العنصر المسبب يكون ضروري جداً هنا، وذلك لتعدد هذه العناصر المسببة وتعدد احتمالات الإصابة بها.

مهما كانت العلامات السريرية، فإن زرع الدم، الصورة الشعاعية للصدر وللجيوب، فحص قعر العين، وعيار الترانس أميناز، كلها ضرورية عند المدمن على المخدرات الذي يشكو من ترفع حروري.

هذا ويجب ألا ننسى احتمال الإصابة بإبتان بدئي بالـ VIH، مع المتطلبات العلاجية التي يفرضها (أنظر الفصل 27، الإبتان بالـ VIH). هذا وهناك بعض الإنتانات التي يمكن أن تكون أكثر شيوعاً من غيرها.

1. التهابات الأجربة الشعرية:

غالباً ما تكون عائدة إلى المبيضات سببياً، هذا ويمكن أن تترافق هذه الالتهابات بأفات عميقة (عينية، عظمية، مفصلية)، وبآفات عقدية جلدية.

2. التهاب جلدي وما تحت جلدي وخراجات في مكان الحقن (أنظر فصل 14، الجزء الأول):

الصفائح الاحمرارية الناتجة عن حقن منتن، تكون كثيرة المصادفة، ويمكن أن تتطور نحو خراجات تحت جلدية ومخاطية، كما يمكن أن تختلط بالتهاب ضفيرة نخري، التهاب عضلي، أو خثرة إنتانية، الجراثيم المسببة هي المكورات العنقودية الذهبية والمكورات العقدية المقيحة، التفاعل الالتهابي الناتج عن المحلول المحقون وعن الأجسام الأجنبية يلعب دوراً مسهلاً للإبتان كما أنه يزيد من خطورته.

3. تجرثم الدم والتهاب شغاف القلب الإنتاني (أنظر فصل 2 وفصل 4، الجزء الأول):

انطلاقاً من التهاب وريد خثري إنتاني لنقطة الوخز، فإن تجرثمات الدم يمكن أن تؤدي إلى حدوث التهاب شغاف قلب إنتاني متوضع في نصف الحالات على الدسام ثلاثي الشرف. ومن اختلاطاته الشائعة حدوث صمامات رئوية إنتانية متعددة معطية صورة صدر شعاعية على شكل كثافات محيطية دائرية ذات حدود غير واضحة ومتوضعة على محيط الرئة، هذه الكثافات يمكن أن تتحول فيما بعد إلى خراجات. وهكذا فمن الضروري القيام بالإصغاء الرئوي بشكل روتيني عند هؤلاء المرضى، وعدم التردد في طلب إيكوقلبي عبر المريء حوالى اليوم العاشر بعد تشخيص تجرثم الدم.

الجراثيم المسببة تكون المكورات العنقودية المذهبة في 60% من الحالات. المكورات المعوية سببياً والمكورات العقدية المخضرة، الخمائر، البسودوموناس والجراثيم المعوية تكون مسؤولة في 10 - 15% من الحالات. المعالجة احتمالية في البداية وذلك بانتظار نتيجة زراعات الدم (غليكوبيتيد + أمينوزيد). حالما يتم تكييف المعالجة حسب نتائج فحص التحسس الجرثومي للصاد الحيوي فإن مدة المعالجة تكون:

- في حالة تجرثم الدم من دون توضع جرثومي ثانوي: 10 - 15 يوماً.
- في حالة التهاب شغاف القلب الإنتاني: 4 - 6 أسابيع.
- في حالة توضع عظمي مفصلي: 6 - 8 أسابيع.

4. الإنتانات القصبية الرئوية، إنتانات الأذن، أنف، حنجرة (أنظر فصل 7 و18):

أخذ المخدرات يمكن أن يؤدي إلى حدوث اضطرابات في الوعي، مسؤول بدوره عن حدوث التهابات رئوية ناتجة عن مرور الطعام خطأ في المجاري الهوائية. التهابات الجيوب المزمنة الكثيرة المصادفة عند المدمنين الذين يشمون المخدرات، تعتبر عاملاً مؤهباً للإنتانات القصبية الرئوية، وبشكل

خاص العائدة للمكورات الرئوية. معالجة هذه الأمراض الرئوية تكون مماثلة لتلك المصادفة عند الأشخاص الغير مدمنين. أما معالجة التهابات الجيوب فهي مخيبة للآمال، وذلك مهما كانت الطريقة المتبعة: صادات حيوية طويلة الأمد، خزع الجيب...

5. التهابات الجهاز العصبي (أنظر الفصل 6، الجزء الأول):

اضطرابات في الوعي واختلاجات ناتجة عن ترفع حروري يمكن أن تكون عائدة إلى سم محقون في الوريد. ومع ذلك فإنه يجب البحث عن علامات توضع، عن تناذر سحائي مما يشير إلى حصول إصابة إنتانية. الأسباب الأكثر شيوعاً هي: التهاب سحاي، خراج دماغي، دبيلة تحت الجافية. بالنسبة للمرضى المصابين بالـ VIH فإنه يوجد عناصر ممرضة خاصة بهم: التوكسوبلاسماز الدماغي، الكريبتوكوك.

6. التهابات الكبد (أنظر فصل 25، الجزء الأول):

إن أغلب المدمنين على المخدرات عندهم زيادة في الخمائر الكبدية، عائدة إلى إصابة فيروسية (فيروس التهاب الكبد B ولا سيما فيروس التهاب الكبد C). العنصر دلتا المسبب لإنتان إضافي على التهاب الكبد يمكن أن يكون مسؤولاً عن حصول التهاب كبد صاعق. فيروسات أخرى يمكن أن تكون السبب: فيروس التهاب الكبد A، فيروس إيبشتاين بار، فيروس الاندخال الخلوي العرطل، فيروس الحلا. عناصر أخرى وذلك خلال الإصابة بالـ VIH، تسبب ركودة صفراوية (كريبتوسبورديس، ميكروسبورديس، فيروس الاندخال الخلوي العرطل والجراثيم الفطرية أفيوم داخل الخلية). هذه الإصابات المختلفة يمكن أن تكون أكثر خطورة نتيجة الآفات السمية العائدة إلى المخدرات، الكحول، والأدوية. الخزعة الكبدية المأخوذة عن طريق البزل تسمح بتشخيص السبب وخطورة الإصابة الكبدية ومرحلة تطورها سواء كان بالنسبة لالتهاب الكبد B أو C وذلك لوضع خطة العناية المناسبة.

34. الإنتانات عند الأشخاص ناقصي الكريات البيض

نقص الكريات البيض (المتعددة النوى المعتدلة >500/مم³) تنتج غالباً عن معالجة كيميائية سامة للخلايا: هذا النقص يكون متوقعاً ومبرمجاً كما أنه عابر (بضعة أيام أو أسابيع). في حالة زرع نخاع الشوكي فإن عدم وجود الكريات البيض يكون ذو فترة طويلة. هذا وإن مدة نقص الكريات البيض نقصت مع حقن خلايا أصلية محيطية.

خطر الإنتان يكون مرتفعاً عند الأشخاص ناقصي الكريات البيض، وهو يتناسب طردياً مع شدة ومدة النقص. الإنتانات غالباً ما تكون ذات تطور سريع ومهدد لحياة المريض: التظاهرات الالتهابية الموضعية تكون غير كاملة، والأعراض العامة تكون مبكرة. المسببات الممرضة تتأني غالباً من جسم المريض (ذات منشأ داخلي endogène) (جراثيم معوية، مكورات عقدية). جراثيم أخرى كالمكورات العنقودية تتوضع على القشاطر الوعائية، والبعض الآخر كاليسودوموناس والأسبيرجيلوس تتظاهر بصورة متأخرة. المكورات العنقودية والمكورات العقدية هي الأكثر مصادفة.

1. الوقاية من الإنتانات

1. المبيضات الفموية:

مخمضة الفم بالأمفونيريسين B على شكل محلول معد للاستعمال الفموي فعاليته ليست مطلقة.

2. إنتانات جرثومية من أصل هضمي:

التطهير هضمي انتقائي قبل المعالجة الكيميائية، بواسطة صادرات حيوية غير قابلة للامتصاص (كوليستين، نيوميسين، جنتاميسين، توبراميسين، باسيتراسين، فانكوميسين، غالباً مترافقة) أو صادرات حيوية عن طريق الفم وقابلة للامتصاص (إيريتروميسين، كوتريموكسازول) لم يثبت فائدته. بعض المراكز تستعمل صاد حيوي قابل للامتصاص (الفلووروكينولونات)، هذه الطريقة غير منصوح بها.

3. الوقاية من إنتانات القتاطر (أنظر الفصل 29)

4. إجراءات صحية عامة (أنظر الفصل 29):

العناية بنظافة الفم، بنظافة المؤخرة، الجلد، مراقبة الأطعمة ونظافة الأماكن تلعب دوراً هاماً معادلاً للتطهير.

5. عوامل النمو المحببة الخلوية:

تلعب دوراً وقائياً بإنقاصها لمدة نقص الخلايا البيض.

2. معالجة الإنتانات المتوسطة (محمول 1)

جدول 1 - المعالجة بالصادات الحيوية للإنتانات المتوسطة

مكان الإصابة	شكل الإصابة	العنصر الممرض	المعالجة بالصادات الحيوية
الفم	قلاع	مبيضات	أمفو B (محمول)
	إصابات حويصلية أو قلاعية	فيروس الحلا	أسيكوفير (حبوب أو داخل الوريد)
	آفات قرحية - نخرية	لاهوائيات - مكورات عقدية	بنيسيلين أو مكارونيد أو بريستيناميسين
الجلد	آفات حلقية أو داء المنطقة	فيروس الحلا أو داء المنطقة	سيفتازديم أو سيفيفيم أو إيميبيم أو بيبيراسيلين - تازوباكتام
قطرة	آفات نخرية	يسودوموناس أيروجينوزا	غلوكوبتيد
العانة	تقيح	مكورات عقدية	بنيسيلين - تازوباكتام
الرئة	تقيح	مكورات معوية	بنيسيلين - تازوباكتام
	نخر	يسودوموناس أيروجينوزا	أو إيميبيم

مكورات رئوية، يسودوموناس أيروجينوزا، مكورات معوية،
مكورات عقدية،
أسبيرجيلوس

[[بيبيراسيلين - تازوباكتام
أو إيميبيم أو سيفيفيم) +
غلوكوبتيد + أمفوزيد]
- فوريكونازول
- أمفوتيريسين B
ليبوزمال (قصور كلوي)
- كاسوفونجين (كخيار
درجة 2)

المتكيسات الرئوية - كوتريموكسازول

فيروس الانتخال الخلوي العرطل جانتيكوفير

3. معالجة الارتفاعات المعنوية المسبوبة

الحرارة هي التظاهر السريري الوحيد للإبتان، المعالجة الاحتمالية بالصادات الحيوية مستطبة هنا، بعد أخذ العينات.

1. المعالجة ذات الخيار الأول (جدول 2، 3، 4):

2. إعادة تقويم المعالجة:

يجب إعادة تقويم الحالة بعد 72 ساء، وذلك بمراقبة علامات الإصابة الموضوعية، المعطيات البيولوجية، وخاصة النتائج البيولوجية.

جدول 2 - عدم وجود قنطرة أو تطهير هضمي مع/أو انعدام كريات بيض مزمن

بيتا لاكتامين مضادة للبسيبوموناس	+ أمينوزيد
أرتريونام 75 مغ/كغ/يوم	أميكاسين 15 مغ/كغ/يوم
سيفييم 75 مغ/كغ/يوم	أو مينولون
سيفتازديم 100 مغ/كغ/يوم	سيروفلوكساسين 400 مغ - 2 - 3 مرات/يوم
ليمبييتيم 50 مغ/كغ/يوم	
بييراسيلين - تازوليكلام (25/200) مغ/كغ/يوم	
تكلراسيلين - حمض كلانولينيك (10/250) مغ/كغ/يوم	

جدول 3 - عدم وجود قنطرة أو تطهير هضمي مسبق مع/أو عدم تصنع aplasie حديث أو ذو فترة متوقع أن تكون قصيرة

سيفالوسبورين جيل 3	+ أمينوزيد
سيفوتاكسيم 100 مغ/كغ/يوم	أميكاسين 15 مغ/كغ/يوم
سيفترياكسون 40 مغ/كغ/يوم	جنتاميسين 3 - 4.5 مغ/كغ/يوم
سيفييم 60 مغ/كغ/يوم	نيتيلميسين 6 - 7.5 مغ/كغ/يوم

جدول 4 - مريض حامل للقنطرة وريدية مركزية

إضافة مضاد للمكورات العنقوبية إلى واحد من الصادات الحيوية السابقة

فانكوميسين 25 مغ/كغ/يوم، أو نيكوبلاتين 6 مغ/كغ/يوم 12 ساء بالنسبة للحقن الخمسة الأولى ومن ثم مرة واحدة/يوم

3. متابعة المعالجة المضادة للإنتان:

للتحسن السريري يسمح بالمحافظة على المعالجة البدئية بالصادات الحيوية، ولكن خلال فترة نقص الكريات البيض، يكون المريض معرضاً لإعادة الإصابة بالمكورات المعوية أو البسودوموناس أيروجينوزا. استمرار إعطاء دواء من فصيلة البيتالاكتامين لمعالجة هذه الجراثيم يجب أن يستمر حتى حصول ارتفاع في عدد الكريات البيض $>500/\text{مم}^3$.

إذا كانت القنطرة هي نقطة انطلاق الإنتان، فإنه من المفضل نزع هذه الأخيرة منذ البداية. إذا كان العنصر الممرض هو المكورات العنقودية المذهبة أو المبيضات. بينما في الحالات الأخرى فإن النكس بعد إيقاف المعالجة بالصادات الحيوية، يفرض نزع القنطرة.

استمرار الترفع الحروري بالرغم من المعالجة بالصادات الحيوية، يفرض إضافة صاد حيوي آخر أو إبدال المعالجة:

- مضاد لفيروس الحلا: أسيكوفير 10 مغ/كغ/8 سا.
 - مضاد فطري: أمفوتيريسين B، بجرعة 1.5 مغ/كغ/يوم، أمفوتيريسين ليبوزومال (3 مغ/كغ/يوم).
- أحياناً:

- جانسيكلوفير عند المريض ناقص الكريات اللمفاوية أو عند المريض المزروع له عضو ما.
- كوتريموكسازول في حال وجود ذات رئة خالوية.

35. الإنتانات والأعضاء المزروعة

أغلب الإنتانات الشديدة التالية لزرع النخاع الشوكي، أو لنقل الأعضاء، تحدث خلال الستة أشهر التالية للنقل أو للزرع. هذا ويوجد نوعين من الإنتانات التي تهدد كل مريض مزروع له أو منقول له عضو ما:

- الإنتانات الحادة التي غالباً ما تكون شائعة Communautaires، وهي أكثر خطورة عند هؤلاء المرضى.
- عودة تظاهر إنتان كامل، موجود قبل الزرع، ويتظاهر بعد هذا الأخير (السل، فيروس الاندخال الخلوي العرطل، داء المنطقة، الحلا، الفطور).

1. بعد زرع النخاع الشوكي

- خلال الشهر الأول، الإنتانات الجرثومية المقيحة والإنتانات الفطرية (مبيضات، أسبيرجيلوس)، هي الأكثر مصادفة وذلك لوجود نقص في الكريات البيض عائد إلى المعالجة الكيميائية وأحياناً إلى المعالجة الشعاعية، هذا ويكون المريض معرضاً أيضاً للإصابة بإنتانات فيروس الحلا البسيط، هذه الإنتانات الأخيرة يوقى منها بالاستعمال الروتيني للأسيكلوفير.
- خلال الشهرين الثاني والثالث تحدث الإصابة:
 - بذوات رئة خلالية فيروسية (فيروس الاندخال الخلوي العرطل)، فطرية أو مجهولة السبب عند 35% من المرضى.

2. بعد نقل الأعضاء

- عند أكثر من ثلثي المرضى يحدث إنتان خطير.
- خلال الشهر الأول، الإنتانات غالباً ما تكون جرثومية وفطرية، نوزوكوميالية وذات علاقة بالعضو المنقول. هذا ومن الممكن حدوث عودة تظاهر إنتان بفيروس الحلا البسيط.

- بعد الشهر الأول، فيروس الاندخال الخلوي العرطل هو الأكثر مصادفة إذا كان المريض ذو تفاعل مصلي إيجابي. بالنسبة لهذا الفيروس قبل الزرع أو إذا كان الشخص المعطي ذو تفاعل مصلي إيجابي للفيروس نفسه. المسببات الأخرى هي المتكيسات الرئوية كارييني، الأسبيرجيللوس، النوكارديا والليستيريا، مع معالجة هؤلاء المرضى يجب القيام:
- بمراقبة سريرية وإجراء تعداد وصيغة، من أجل الكشف عن وجود نقص الكريات المحببة.
- ومراقبة الآثار الجانبية للأدوية المثبطة للمناعة.

3. الإنتانات العلاجية

وحدها الإنتانات الشائعة، من دون وجود علامات خطيرة، ومثبتة سريرياً مع/أو بيولوجياً يمكن أن تعالج في المنزل، مع إعادة تقويم سريري بعد 24 إلى 48 ساعة.

المعالجة الاحتمالية بالبيتا لاكتامين هدفها معالجة الإنتان التنفسي العائد إلى المكورات العقدية الرئوية أو الهيموفيلوس أنفلونزا: سيفترياكسون داخل الوريد 1 - 2 غ/يوم.

داء المنطقة يجب أن يعالج بالزوفيراكس داخل الوريد (10 مغ/كغ 3 مرات باليوم خلال 7 - 10 أيام) إذا كان منتشرأ أو مصيبأ للعين.

الزيليتريكس عن طريق الفم 500 مغ، حبتين 3 مرات/يوم خلال 7 أيام، يعطى في الأشكال الأخرى لداء المنطقة.

لتداخلات في المفعول الدوائي ما بين المضادات الإنتانية والسيكلوسبورين

الأدوية التي تزيد من تركيز السيكلوسبورين في الدم: الماكروليدات والأدوية الأزولية.

الأدوية التي تنقص من تركيز السيكلوسبورين في الدم: الريفامبين، الريفابوتين.

سمية كلوية مضافة إلى سمية السيكلوسبورين: أمفوتيريسين B، أمينوزيد، تريمتوبريم، فوسكارنيه.

36. الإنتانات عند مثبطي المناعة

(باستثناء الإنتان بالـ VIH)

1. شوائب خلطية للمناعة الخلطية (humorale)

يعرض هذا النقص للإصابة بإنتانات متكررة عائدة لجراثيم ذات تطور خارج الخلوي (المكورات الرئوية هي الأكثر مصادفة)، معالجة هذه الإنتانات تكون مماثلة لمعالجتها عند الأشخاص السليمين.

إذا كان نقص المناعة كبيراً، فإنه من الممكن أن يؤدي إلى غياب تشكل الأجسام الضدية بعد اللقاحات مما يفرض مشاكل وقائية:

- إعطاء الغلوبولينات المناعية الإنسانية الأساسية، للحفاظ على مستوى الـ IgG الباقي ما بين 4 - 6 غ/ل، كل 3 - 4 أسابيع عن طريق الوريد (0.3 - 0.4 غ/كغ)، تسمح بتجنب الإنتانات المتعممة الخطيرة، وبإنقاص عدد الإنتانات التنفسية التي تؤدي فيما بعد إلى توسع القصبات أو خراجات الرئة.

- المعالجة بالصادات الحيوية بشكل مستمر أو متقطع (في فصل الشتاء) ضرورية في حالة كثرة تكرر الإنتانات (كوتريموكسازول، أموكسيسيللين وحيد أو مترافق مع حمض الكلافولينيك، أو ماکروليد).

الحالة النموذجية لهذا الشكل من نقص المناعة هي عدم وجود الغلوبولينات المناعية الدموية ذات النموذج بروتون Bruton، يوجد هنا نقص كامل تقريباً للغلوبولين المناعي (Ig)، هذا المرض يصيب الذكور (تشوه صاغر مرتبط بالصبغي X). هذا ويمكن اكتشاف هذا المرض منذ عمر الـ 8 - 10 أشهر بعيار الـ Ig الدموي. هناك أشكال أخرى لا تكتشف إلا عند البالغين، وهي تتضمن نقصاً بواحد أو عدة أصناف للـ Ig (نقص في المناعة الخلطية ذو تظاهر مختلف...).

2. شواذات مكتسبة للمناعة الخطئية

غالباً ما تكون عبارة عن أمراض دموية تصيب الخلايا اللمفاوية B، أو الخلايا البلازمية Plasmocytes (ورم نقوي myélome) التي تعرض لخطورة الإصابة بإنتانات خطيرة بالمكورات الرئوية ذات تواضع غير عادي (التهاب البريتوان، التهاب عظم ومفصل...). كما أن نقص المناعة هذا يمكن أن يعود إلى الذئبة الحمامية المنتشرة أو إلى معالجة طويلة بالكورتيزونات. هذا وإن حصول هذه الإنتانات بشكل معزول يجب أن يدفعنا للبحث عن شواذات مناعية.

3. عدم وجود الطحال

عدم وجود الطحال (استئصال الطحال، أو انعدام فعاليته) يعرض لخطورة الإصابة بإنتانات خطيرة. تجرثم الدم مع صدمة إنتانية مع خطورة وفاة خلال بضعة ساعات. المكورات العقدية الرئوية، الهيموفيلوس أنفلونزا، النيسيريا السحائية، الجراثيم المعوية تكون مسؤولة عن هذه الإنتانات. خطورة الإنتان تكون أكبر عند الطفل أو إذا كان استئصال الطحال قد أجري لمعالجة آفة مناعية أو دموية (مرض هودجكين). يكون الخطر الإنتاني أعظماً خلال السنة الأولى التالية لاستئصال الطحال، ولكنه يستمر بعد ذلك طوال الوقت.

• الوقاية تكون بـ:

- إعطاء لقاح مضاد للمكورات الرئوية بشكل روتيني، لقاحات مضادة للهيموفيلوس أنفلونزا B إذا لم تكن قد أعطيت عند الولادة ومضادة للمكورات السحائية.
- ضرورة إعلام المريض بالخطورة المعرض لها، ونصحها بحمل وثيقة تبين استئصال الطحال عنده.
- ضرورة مطلقة أن يحمل المريض معه بنيسيلين أو سيفالوسبورين جيل 3 في حال كونه بعيداً عن مركز طبي.

- حقن بنيسيللين أو سيفالوسبورين جيل 3 بشكل فوري، في المكان الموجود فيه المريض أمام أي ترفع حروري حتى قبل إجراء الزرع الدموي.
- معالجة وقائية بالنيسيللين V عند الطفل حتى بلوغه سن العشر سنوات؛ بعد سن العشر سنوات يعطى البنيسيللين لمدة سنة واحدة بعد استئصال الطحال.
- اللابيزيوز Labésiose (أنظر الفصل 16، الجزء الأول): يصيب بشكل خاص المرضى المصابين بعدم وجود الطحال. التشخيص يتم بالكشف عن الطفيلي في الكريات الحمر وذلك بفحص لطاخة دموية. المعالجة ترافق إعطاء بلازما، الكلينداميسين والكينين.

4. نقص ولاءي في المتممة (Complement تصغيراً C)

تأثير النقص في الـ C_1 ، C_2 ، C_4 يكون ضعيفاً بالنسبة للإصابة بالإنتان، النقص في الـ C_5 وخاصة الـ C_6 و C_7 يكون مسؤولاً عن إنتانات بالنيسيريا: التهابات سحايا متكررة عائدة للنيسيريا السحائية مع تفرث دم، بشكل أكثر ندرة إنتانات منتشرة عائدة للنيسيريا البنية gonorrhoeae. في حال تشخيص هذا النقص فإنه يجب إعطاء لقاحات مضادة للمكورات السحائية، على الرغم من عدم حمايتها ضد الأشكال A و C.

5. شذوذة إنت خلفية في وظائف الكريات البيضاء البيضاء

يبحث عنها أمام حدوث إنتانات متكررة وخطيرة بجراثيم مقيحة.

1. الداء الحبيبي العائلي المزمن Granulomatose chronique familiale:

(الوفيات 50% حتى الـ 15 سنة)، مرض وراثي صاغر مرتبط بالجنس المذكور. إنها تسهل حدوث إنتانات في الكبد، الغدد للمفاوية، الجلد والرئة، هذه الإنتانات تعود للمكورات العنقودية المذهبة، للجراثيم المعوية التي تضم السالمونيلا التيفية، واللفطور (مبيضات سيبسيا، أسبيرجيلوس سيبسيا). هؤلاء المرضى عندهم شواذات وظيفية للتخطين داخل الخلايا البالعة وللاستقلاب المؤكسد للخلايا متعددة النوى.

معالجة الإنتانات الحادة تكون بواسطة الصادات الحيوية المكيفة حسب العنصر المسبب للإنتان في حال عزله؛ في الحالة الأخرى (عدم عزل الجرثوم) يعطى صادات حيوية ذات انتشار جيد داخل الخلوي (ريفامبيسين، فلوروكينولون، كوتريموكسازول). هذا ويعطى الأنترفرون غاما - 1b (إيموكين Imukin).

الوقاية تكون بإعطاء الكوتريموكسازول (حبة واحدة/يوم) وغالباً ما يعطى الإيتراكونازول.

2. شواذات أخرى:

تظاهراتها مختلفة جداً:

- النقص بالميلوبيروكسيداز myélopéroxydase: لا يوجد خطورة إنتانية.
- مرض شدياق - هيجاشي Chédiak-Higashi: يعطي إنتانات متكررة.
- نقص في الـ G₆PD: من الممكن أن يسبب حدوث إنتانات متكررة في حال كون هذا النقص كاملاً.

6. تثبيط مناعي ذو نموذج خلوي مختسب

يضم:

- الأمراض الدموية الخبيثة (المفوما، مرض هودجكين، ابيضاض الدم اللمفاوي المزمن).
 - نقل الأعضاء، زرع النخاع العظمي.
 - المعالجة المثبطة للمناعة.
 - حالات سوء التغذية.
- هذه الإصابات تسهل حدوث إنتانات داخل الخلوية مشابهة للإنتانات الحادثة عند المصابين بالـ VIH (أنظر فصل السيدا).

37. الحمى والحمل

بعض الإنتانات يجب أن ن فكر بها بشكل روتيني، وذلك لكثرة مصادفتها خلال الحمل و/أو لخطورة انتقالها من الأم إلى الجنين وبالتالي آثارها على هذا الأخير أو على الطفل حديث الولادة (إجهاض عفوي، تشوهات خلقية، إنتانات ولادية...).

1. الإنتانات الجرثومية

1. الإنتانات البولية:

تحدث بنسبة 3 - 8% عند الحمل. البحث عنها يجب أن يتم بشكل روتيني بواسطة شريط خاص وذلك عند كل استشارة. هذا وإن معالجة تجرثم البول الغير عرضي خلال الثلاثة أشهر الأولى للحمل، ينقص من حدوث التهاب الحويضة والكلية في الثلاثة أشهر الأخيرة للحمل، ومن نسبة حدوث الولادات المبكرة. إن خطورة حدوث التهاب الحويضة والكلية (1 - 2%) يزداد مع اقتراب موعد الولادة، ومع وجود سوابق إنتان بولي خلال الحمل. وأخيراً فإن حدوث التهاب الحويضة والكلية خلال الحمل يتطلب دخول الحامل إلى المشفى للبدء بمعالجة بواسطة السيفالوسبورين جيل 3 عن طريق الحقن.

2. الليستيريا:

كل ترفع حروري غير مفسر، مع تظاهرات كاذبة لنزلة وافدة في نهاية الحمل ومترافق مع اضطرابات هضمية، يجب أن يدفعنا للتفكير بتشخيص الليستيريا، ولتحقيق زرع دم بشكل روتيني وإعطاء معالجة بالصادات الحيوية. الخطورة هنا تكمن بانتقال الإنتان إلى الجنين الذي، وذلك حسب مدة الحمل، يمكن أن يؤدي إلى إجهاض (2%)، موت الجنين داخل الرحم، أو إلى ولادة مبكرة مع إنتان ولادي خطر. المعالجة، خلال مرحلة الإصابة للأم

الحامل، تكون بالأمينوبنيسيللين 4 غ/يوم عن طريق الفم لمدة أسبوعين على الأقل وذلك في الحالات السريرية المتظاهرة بترفع حروري منعزل، أو 200 مغ/كغ/يوم داخل الوريد في حالات تجرثم الدم. هذه المعالجة تقي من الاختلاطات الجنينية.

الوقاية تكون باتخاذ احتياطات بسيطة متعلقة بالنظافة والتغذية، مما ينقص من نسبة الإصابة بالليستيريا.

الوقاية من الليستيريا عند المرأة الحامل

الأغذية التي يجب تجنبها

● الأجبان الرخوة الغير مبسترة، الأسماك الغير مطبوخة، الصدف النيئ.

القواعد الصحية التي يجب اتباعها

● طهي جيد للأطعمة النيئة من أصل حيواني (اللحوم، الأسماك).

● غسل جيد للخضار النيئة وللأعشاب المعطرة.

● وضع للأطعمة النيئة (اللحوم، الخضار إلخ...) بمعزل عن الأطعمة المطهورة أو الجاهزة للأكل.

● بعد لمس الأطعمة غير المطهورة، يجب تنظيف الأيدي وأدوات المطبخ التي استعملت لتحضير هذه الأطعمة.

● تنظيف متكرر (كل 15 يوماً) للبراد، وتطهير فيما بعد بماء جافيل للثلاجة، والتأكد من أن الحرارة منخفضة بشكل كاف (4 درجات).

● في حال استهلاك الباقي من الوجبات، فإنه يجب تسخينها بعناية قبل أكلها.

3. السيفيليس (الداء الزهري):

خطر الإصابة بالإنتان عند الجنين (انتقالها من الأم إلى الجنين)، من الممكن أن يؤدي إلى الإجهاض، موت الجنين أو السيفيليس الولادي، يكون أعظمياً خلال النصف الثاني من الحمل. المعالجة الوقائية تستند على إجراء فحص روتيني للكشف عن هذا المرض قبل الحمل وخلال الاستشارة النسائية في أول 3 أشهر للحمل، وأخيراً معالجة الإنتان عند الأم.

البنيسيللين G هو الصاد المرجعي: بنزائين بنيسيللين G 24 مليون وحدة داخل العضل، في بعض الأحيان يمكن إعادة هذه الجرعة بعد أسبوع (سيفيليس أولي أو ثانوي أو كامن منذ فترة طويلة). في حالة التحسس على البنيسيللين فإن هذا الدواء يبقى الصاد المرجعي ويجب في هذه الحالة القضاء على

التحسس لهذا الدواء، ولكن من الممكن اقتراح إعطاء الأزيتروميسين أو السيفترياكسون.

4. إنتان المشيمة والسائل الأمينوسي:

ناتجة عن آثار جانبية أو كاختلاط لتداخل طبي، عن طريق الدم عبر المشيمة، أو عن طريق عنق الرحم، تترافق هذه الإنتانات مع تمزق مبكر للغشاء، هذا التمزق يحصل بصورة أبكر كلما كانت هذه الإنتانات أبكر (تمزق 40% في حال حدوث الإنتانات قبل الأسبوع 24 من انقطاع الطمث، و 5% في حال حدوث الإنتانات في الشهر الأخير للحمل). وأخيراً فإن إنتانات المشيمة والسائل الأمينوسي تكون مسؤولة عن حدوث إنتانات عند الجنين وأحياناً عند الأم. مما يبرر معالجتها الروتينية بالصادات الحيوية.

5. وصف الصادات الحيوية:

جدول 1

جدول 1 - استعمال الصادات الحيوية حسب مرحلة الحمل

الصادات الحيوية	الثالث الأول من الحمل	الثالث الثاني من الحمل	الثالث الثالث من الحمل
البنيسيلينات	نعم	نعم	نعم
السيفالوسبورينات	نعم	نعم	نعم
المكاروليدات	نعم	نعم	نعم
الستربتوغرامينات	نعم	نعم	نعم
الفوسفوميسين	نعم	نعم	نعم
التيتراسيكلين	لا	لا	لا
الأمينوزيدات	لا	لا	لا
الريفاميسين	لا	نعم	نعم
الكوتريموكسازول	لا	لا	لا
الكلينولونات	لا	لا	لا
النيتروفوران	لا	نعم	لا
الإيميدازول	لا	نعم	نعم
الغليكوبيبتيد	لا	لا	لا

2. الإنتانات الفيروسية

1. الوردية الوافدة:

الإصابة بالوردية الوافدة الولادية، المسؤولة عن تشوهات متعددة، تكون أكثر ارتفاعاً كلما كان الإنتان البدني للأم باكراً أثناء الحمل؛ وأعظمية في حال حصول الإنتان البدني خلال الثلث الأول للحمل. التشخيص عند الأم يكون بالفحوص المصلية (انقلاب التفاعل المصلي، ووجود الـ IgM). الوقاية تستند على إعطاء اللقاح بشكل واسع (للأطفال نكوراً وإناً)، ومراقبة النساء الحوامل اللواتي عندهن الفحص المصلي سلبياً بصورة منتظمة عند بداية الحمل.

في حالة إصابة الأم بالوردية الوافدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى للحمل، فإن الإجهاض الإرادي يمكن أن يقترح حتى ولو لم تثبت إصابة الجنين. بينما خلال الأسبوع 12 - 20، فإن تأكيد إصابة الجنين بواسطة أخذ عينة دم من الحبل السري تكون ضرورية. الإجهاض العلاجي يمكن أن يناقش عندها. في حال حدوث الإنتان بعد الأسبوع العشرين، فإن متابعة الحمل تكون عادية. في حال كون الفحوص المصلية ما حول الولادة سلبية، فإن إعطاء اللقاح للأم يجرى فوراً بعد الولادة قبل الخروج من المشفى.

التشوهات	أسابيع الحمل
85%	0 - 8
52%	12 - 9
16%	20 - 13
0%	+ 20

2. التهاب الكبد الإنتاني B:

خطورة انتقال العدوى من الأم إلى الجنين، تحدث بشكل أساسي في الفترة ما حول الولادة (الولادة، الإرضاع)، وهي أعظمية في حالة وجود إعادة تفعيل فيروسي (إيجابية الـ AgHbe والـ AND المصلي لفيروس التهاب الكبد B) وفي حال وجود التهاب كبد مزمن فعال.

هذا وقد نقصت هذه الخطورة بشكل كبير منذ إجراء فحوص الكشف عن هذا المرض في الشهر السادس للحمل، ومنذ إعطاء اللقاحات المصلية خلال الـ 48 ساعة الأولى للحياة، لحديثي الولادة من أم ذات AgHbe إيجابي: غلوبولينات مناعية خاصة (100 وحدة عالمية داخل العضل) وأول حقنة من اللقاح، متبوعة ببرنامج التلقيح العادي.

3. الإنتان بفيروس الاندخال الخلوي العرطل:

الإنتان البدئي العائد لفيروس الاندخال الخلوي العرطل يكون نادراً، غالباً من دون أعراض، ولكنه مسؤول عن حصول عدوى من الأم إلى الجنين في 30 - 50% من الحالات، خلال فترة الحمل بأكملها، هذه العدوى تكون مسؤولة بشكل كامن عن أمراض جنينية، معطية أعراضاً عند الولادة بنسبة ضئيلة (5 - 10%) ولكن شديدة الخطورة (إنتانات متعددة الأحشاء) أو قد تترك عقابيل (تأخر عقلي حركي، صمم، التهاب شبكية). يشك بالتشخيص عند الأم سريرياً وبوجود تناذر وحيد النوى، ويؤكد بانقلاب التفاعل المصلي، ووجود الـ IgM، وعند الطفل بواسطة الكشف عن الفيروس في السائل الأمنيوسي وذلك بأخذ عينة من هذا الأخير بواسطة البزل (زرع، AND فيروسي، مولدات ضد فيروسية). تكون الوقاية بتجنب التعرض للإصابة (تجنب العمل في أماكن تجمع الأطفال، شعب الأطفال في المستشفيات، اتباع القواعد الصحية: غسل الأيدي المتكرر، تجنب التماس مع أطفال مشكوك بإصابتهم بهذا المرض).

4. الإنتان بفيروس الحماق - داء المنطقة:

أ. الحماق Varicelle:

أكثر خطورة خلال فترة الحمل. إصابة الجنين تكون ضعيفة (1.8%) في حال إصابة الأم خلال الثلث الأول للحمل. في حال إصابة الأم خلال الأيام الخمسة السابقة للولادة أو خلال اليومين التاليين لها، فإن خطورة داء الحماق الولادي مع إصابة متعددة الأحشاء مهددة بذلك الحياة تكون أعظمية. هذه

الحالة تبرر وضع الأم في المشفى من أجل إعطائها معالجة بالآسكلوفير داخل الوريد، واتخاذ إجراءات هادفة لتأخير الولادة.

في حال حصول عدوى عند المرأة الحامل، منتقلة من شخص مصاب بالحمى، فإنه لا يوجد إمكانية لإعطاء غلوبولينات مناعية خاصة، حالياً غير متوفرة، بالإضافة إلى أن فائدتها بالنسبة للجنين غير معروفة بعد.

ب. داء المنطقة Zona:

في حال كونه متوضعا، فإن عودة الإصابة بهذا المرض يجب أن تعتبر خالية من الخطورة بالنسبة للجنين.

5. الإصابة بفيروس الحلا Herpes:

خطورته الأساسية عند حديث الولادة هي الإنتان الولادي، هذا وإن خطورة انتقال المرض من الأم إلى الجنين تكون أكثر بـ 10 مرات في حال أول إنتان عند الأم منه في حالة إنتان متكرر. آثار المرض الأخرى تكون أكثر ندرة بكثير: موت جنيني، ولادة مبكرة، نقص في النمو داخل الرحم، وبصورة استثنائية تشوه ولادي، مضافة الحلا الولادي هي 100000/3 ولادة.

المعالجة في حالة الإصابة خلال فترة الحمل، هدفها - حسب الحالة - معالجة الأم، تحديد طريقة الولادة، واحتمال معالجة الطفل حديث الولادة (جدول 2، 3).

جدول 2 - معالجة الحلا التناسلي أثناء الحمل

حالة الإصابة	المعالجة	مدة المعالجة
أول إصابة خلال الحمل	أسكلوفير 200 مغ × 5/يوم فالاسكلوفير 500 مغ × 2/يوم	حتى الولادة
قبل الشهر الأخير	أسكلوفير أو فالاسكلوفير	10 أيام، ومن ثم متابعة المعالجة اعتباراً من الأسبوع 36 قبل الولادة
خلال الحمل إصابة معاودة	زوفيراكس 200 مغ × 5/يوم زيليتريكس 500 مغ × 2/يوم	5 أيام
سوابق حلا تناسلي	لا يوجد استطب للمعالجة	

جدول 3 - طريقة الولادة في حال وجود إصابة بالحمل التناسلي خلال الحمل			
المخاض	طريقة الولادة	الإجراءات الواجب اتخاذها	أوقات حلتية خلال فترة
إصابة أولية	موجودة	غير موجودة	غير موجودة
غير موجودة	غير موجودة	غير موجودة	غير موجودة
إصابة أولية < شهر	طريق طبيعي	● أخذ عينات بعمومية وعينية بشكل روتيني	● لا يوجد استطباب
إصابة أولية > شهر (معالجة)	طريق طبيعي	● لا يوجد استطباب	● لا يوجد استطباب
إصابة أولية > شهر (غير معالجة)	مناقشة قيصرية	● لا يوجد استطباب	● لا يوجد استطباب
إصابة معاودة	موجودة	غير موجودة	غير موجودة
غير موجودة	غير موجودة	غير موجودة	غير موجودة
إصابة معاودة < 7 أيام	طريق طبيعي	● لا يوجد استطباب	● لا يوجد استطباب
إصابة معاودة > 7 أيام	مناقشة قيصرية	● لا يوجد استطباب	● لا يوجد استطباب

6. الإنتان بالـ VIH:

مرحلة متقدمة من الإنتان عند الأم، عدد الخلايا اللمفاوية $CD_4 < 200/\text{مم}^3$ ، وحمل فيروسي VIH-1 مرتفع كلها عوامل تزيد من احتمال انتقال الإصابة من الأم إلى الجنين. هذا الانتقال يقدر بـ 24% في حالة الإصابة بالـ VIH₁ في حال غياب المعالجة ومن 5 - 3% في حال الإصابة بـ VIH₂. هذا الانتقال يحدث خلال فترة ما حول الولادة.

الوقاية من انتقال العدوى من الأم إلى الجنين تتركز على: (1) معالجة الأم بالأدوية المضادة للفيروس القهقري على الأقل خلال الثلث الأخير للحمل وعند الولادة، وللطفل لمدة 6 أسابيع. (2) العملية القيصرية إذا كان الحمل الفيروسي VIH البلازمي قابلاً للتعبير قبل الولادة. (3) الإرضاع الاصطناعي. هذه الإجراءات تسمح بإنقاص خطورة المرض إلى 1%. كل حمل عند امرأة ذات تفاعل مصلي إيجابي يتطلب متابعة من قبل أخصائي. انتقال العدوى بالإرضاع الطبيعي مثبتة. إنها تزيد نسبة الانتقال في أفريقيا بالنسبة للـ VIH₁ لتصل إلى 16% حتى الشهر 24 للإرضاع.

80% من الأطفال المصابين يكونون غير عرضيين في البداية.

الـ 20% من الأطفال الباقين تتظاهر عندهم أعراض لإنتانات انتهازية أو لاعتلال دماغي منذ الأسابيع الأولى للحياة؛ الوفاة تحصل خلال الـ 18 شهراً التالية للولادة.

3. الإنتانات الطفيلية

1. التوكسوبلاسموز:

نسبة وجود تفاعل مصلي إيجابي عند المرأة في عمر الإنجاب تقدر بحوالي 42.8% ما بين عمر الـ 14 - 19 عاماً، و60.6% ما بين عمر الـ 35 - 39 عاماً.

إصابة الجنين تتلو اجتياح الطفيلي للدم بعد إنتان أولي، هذا وتقدر نسبة التوكسوبلاسموز الولادي بـ 1.6 من أجل 1000 ولادة. ومع ذلك فإن نسبة انتقال العدوى من الأم إلى الجنين تتعلق بفترة الحمل، إنها 17% في الثلث الأول، 50% في الثلث الثاني و65% في الثلث الثالث للحمل.

تكون التظاهرات السريرية أكثر خطورة كلما كان انتقال العدوى باكراً: موت داخل الرحم، إجهاض، مرض جنيني (استسقاء الدماغ، تكلسات داخل الجمجمة، التهاب الشبكية)، عند حدوث الإنتان خلال النصف الأول للحمل، بينما في حال حدوث العدوى متأخرة فإن المرض يكون غير عرضي أو قليل الأعراض. في حال تغير التفاعل المصلي خلال الحمل، فإن التشخيص ما قبل الولادة للتوكسوبلاسموز يكون بالبحث في الـ AND للطفيلي في السائل الأمنيوسي بعد بزل هذا الأخير الذي يجب أن يتم اعتباراً من الأسبوع 16 - 18 بعد انقطاع الطمث، على الأقل 4 أسابيع بعد إصابة الأم. التشخيص بعد الولادة يكون بإجراء الفحوص المصلية على الدم المأخوذ من الحبل السري أو مصل الطفل حديث الولادة.

الإجراءات الواجب اتباعها، في حال تغير الفحص المصلي عند الأم لخصت في الجدول 4.

جدول 4 - الإجراءات الواجب اتباعها في حال تغير التفاعل المصلي بالنسبة
للتوكسوبلاسموز عند المرأة الحامل

الحالة	المعالجة	مدة المعالجة
انقلاب الفحص المصلي	سبيراميسين 3 ملايين وحدة × 3/يوم	حتى الولادة
DAN		
سليمي	سبيراميسين 3 ملايين وحدة × 3/يوم	حتى الولادة
إيجابي	سلفاديازين 1 غ × 3/يوم + بيريميثامين 50 مغ/يوم + حمض الفوليك 50 مغ/أسبوع	حتى الولادة
عند الولادة		
توكسوبلاسموز كامن	سلفاديازين 1 غ × 3/يوم + بيريميثامين 50 مغ/يوم + حمض الفوليك 50 مغ/أسبوع	سنة واحدة

2. الملاريا Paludisme:

خطورتها أعظمية عند المرأة الحامل: إجهاض، ولادة مبكرة، ضالة في حجم الجنين. الكينين، الكلوروكين (Nivaquine)، البروغوانيل (Paludrine) والميفلوكين (Lariam) يمكن أن تستعمل عند المرأة الحامل. وحده الهالوفانترين (Halfan) مضاد استطبابه.

معالجة الهجمة الملارية عبارة عن حالة إسعافية. الحمل يعتبر كعامل خطر يزيد من شدة الهجمات الملارية العائدة للمتصورات المنجلية (P. falciparum)، هذه الهجمات تتطلب وضع المريضة في المشفى وإعطاء الكينين كخيار أول. الوقاية تفرض نفسها عند النساء الحوامل اللواتي لا تستطعن تجنب الإقامة في منطقة موبوءة، وذلك بإعطاء الكلوروكين أو البروغوانيل.

التهديدات الفطرية

أنظر الفصلين 11 و12 الجزء الأول.

الإصابة التناسلية بالمبيضات تعد الإلتان الفطري الأكثر مصادفة عند المرأة الحامل.

هذا ومن الممكن أن يصاب الطفل عند ولادته مع خطورة حصول الإصابة الهضمية بالمبيضات.

معالجة الأم تكون موضعية: أدوية آزولية على شكل بيوض، أو حبوب نسائية (Gyno-Pevaryl ،Gynodaktarin)، نيساتين (Mycostatine حبوب مهبلية).

38. الحمى الحادثة عند العودة من سفر إلى بلاد ذات

مستوى صحي منخفض

الحمى الحادثة عند العودة من سفر إلى بلاد ذات مستوى صحي منخفض، تكون تالية للإقامة في هذا البلد، وشروط مناخية مؤهبة لانتقال العامل الممرض، خاصة في هذه المناطق.

انتقال العدوى يكون بشكل خاص شرجي - فموي (المناخ الحار والرطب يؤهب لذلك)، كما يمكن أن تنتقل العدوى عن طريق التنفس والجنس. أخذ اللطخة الدموية يجب أن يجرى بشكل روتيني في حال وجود الترفع الحروري وذلك لوجود نسبة مرتفعة للإصابة بالبرداء Paludisme، ولخطورة هذا المرض. الشك بالإصابة بالحمى النزفية الأفريقية يبرر العزل الفوري للمريض. هذا وإن الحمى غير مرتبطة في كل الحالات بالسفر: إنتان أصيب به في البلد الأصلي، إنتان مرتبط بحالة المريض ومؤهب له بشروط السفر الخاصة (إنتان بولي)، حمى من أصل غير إنتاني، في حوالي 30% من الحالات الحمى تبقى مجهولة السبب.

أ. الإجراءات الشخصية العامة

الاستجاب يكون مركزاً على عوامل الخطر، مدة الحضانة، الوقاية المتبعة، والبلد الذي زاره المريض.

- عوامل الخطر: تجوال في مناطق ريفية، مستوى اقتصادي اجتماعي منخفض للبلد المضيف (إسهالات)، غياب المعالجة الوقائية أو عدم تلاؤمها أو إيقافها حال العودة (البرداء)، غياب اللقاحات (التهاب الكبد، الحمى التيفية، الحمة الصفراء، الدفتيريا، شلل الأطفال، التهاب السحايا)، أو الوقاية ضد الناقل (ناموسيات) التعرض للقراد، الفصل الماطر (البرداء، فيروس أربو arbovirus) وباء في البلد المضيف (التهاب سحايا، الحمة

النزفية الأفريقية، مرض الدنغ (dengue)، سوابق مرضية ووجود أمراض مزمنة.

في حال تجاوز فترة الحضانة لـ 3 أسابيع من الممكن استبعاد الإصابة بالسالمونيلا، الشيغيللا، الريكتسيا، البوريليا، فيروس الأربو arbovirus، الحمى النزفية الفيروسية وداء البريميات Leptospirose.

فترة حضانة أطول من شهرين تثير الشبهة بإنتان ذو تظاهر متأخر: المتحول أو الأميب الكبدي، داء الخيطيات (filarirose) اللفاوية، التهاب الكبد الفيروسي B أو C، نادراً اللشمانيا الحشوية، داء المتقيبات Trypanosomose، السل، الكلب. الفترة الفاصلة ما بين التعرض للإصابة والتظاهر السريري بالنسبة للبرداء تختلف حسب نوع هذه الأخيرة: من 7 أيام إلى 3 أشهر بالنسبة للمتصورة المنجلية (P. falciparum) وحتى 3 سنوات بالنسبة للمتصورة النشيطة (Plasmodium vivax) أو المتصورة الببسية (Plasmodium ovale)، و 10 سنوات بالنسبة للمتصورة الوبائية (P. malariae).

هذا وإن سفرأ قصيراً لبضع ساعات يمكن أن يكون مسؤولاً عن الإصابة بهذه الأمراض مثله مثل سفر لمدة طويلة.

- من المهم معرفة اللقاحات المأخوذة من قبل المريض، الوقاية الكيميائية التي اتبعها، ومقارنتها مع المستجدات للمقاومة الكيميائية المتعلقة بالبرداء [التنقل ما بين الدول والصحة] منشور سنوي من قبل منظمة الصحة العالمية [جدول 2 و 3]. يجب إجراء فحص فيزيائي كامل ولا سيما مراقبة الخط البياني للحرارة والبحث عن علامات صدمة، علامات عصبية، نفسية، وسحائية، إسهال، يرقان، ضخامة عقد لمفاوية، ضخامة طحال، ضخامة كبد، علامات جلدية أو نزوف (جدول 1).

جدول 1 - الأعراض الأساسية

علامات عصبية نفسية أو سحائية: برداء خطيرة، فيروس الأربو Arbovirus، التهاب السحايا، الحمى التيفية، داء المتقيبات الأفريقي (Trypanosoma africana) أو مرض النوم، الإنتان بالـ VIH، الكلب. الإسهال: البرداء، أمراض السالمونيللا، أمراض الشيغيللا، فيروس روتا Rotavirus، داء المشعرات (Trichinose).

اليرقان: البرداء، التهاب الكبد الفيروسي، داء اليريميات (Leptospirose) اليرقاني - النزفي، الحمى الصفراء، الأمراض الكبدية الناتجة عن المتورقات (Distomatoses).

اعتلال العقد اللمفاوية: إنتان بالـ VIH، داء الخيطيات (Filariase) اللمفاوي، الليشمانيا الحشوية، مرض النوم، الجذام.

ضخامة الطحال: البرداء، داء البوريليا، الحمى التيفية، الليشمانيا الحشوية، داء البروسيللا.

ضخامة الكبد: التهاب الكبد الفيروسي، خراج كبدي أميبي.

علامات جلدية: فيروس الأربو (Arbovirus) (طفح)، داء اليريكسيا (طفح، تقرحات)، مرض النوم (قرحة الدخول، حكة، وذمة)، داء الخيطيات اللمفاوية في مرحلة الإجتياح (التهاب الأوعية اللمفاوية)، البلهارسيا (حكة، تحسس)، داء الفطور الشعروية (Trichinose) (وذمة الوجه).

اللزوف: فيروس الأربو arbovirus، الحمى النزفية الأفريقية، داء اليريميات (Leptospirose) اليرقاني النزفي، التهاب الكبد الصاعق.

2. المبرداء Paludisme

1. التشخيص:

يعتمد على وجود حرارة مهما كان شكلها، مع آلام مختلفة وأحياناً اضطرابات هضمية، اضطرابات عصبية نفسية، شحوب، يرقان، ضخامة طحال. كل ترفع حروري بعد إقامة في منطقة موبوءة يتطلب البحث عن المتصورات Plasmodium.

اللطاخة الدموية هي الفحص الإسعافي (النتيجة تعطى خلال ساعة). تطفل الدم Parasitémie يعبر عنه بالنسبة المئوية لعدد الكريات الحمر المصابة بالطفيلي، أو بعدد الطفيليات في 1 مم³ من الدم؛ في حالة الشك الكبير بالإصابة فإنه يجب إعادة الفحص بعد عدة ساعات كما يجب البدء بالمعالجة الاحتمالية. المتصورة المنجلية (P. falciparum) هي الأكثر مصادفة (أكثر من 80% من الحالات). فحص القطرة السميكة يجب القيام به في حال كون تطفل الدم ضعيفاً. في هذه الحالة أو في حالة كون المسافر قد أخذ سابقاً أدوية

مضادة للبرداء، فإن نقص الصفائح الدموية، فقر دم معتدل، فرط بيليروبين الدم، فحص مصلي أو اختبار سريع إيجابي للإصابة بالبرداء تكون موجهة للتشخيص. الفحوص السريعة (النقاط الـ LDH، أو مولد الضد HRP₂ الطفيلي) مهمة في حالة غياب طبيب مخبر خبير بالبرداء.

2. علامات الخطورة الخاصة بالبرداء:

يجب البحث عنها دائماً.

العلامات السريرية:

- علامات عصبية نفسية: اضطرابات في معرفة الزمن والمكان، تهيج، نعس، اختلاجات، سبات.
- ضغط دموي انقباضي < 80 مم زئبقي.
- حرارة $< 40^{\circ}$ مئوية.
- نزف عائد لتخثر داخل وعائي منتشر.
- وذمة رئة.
- يرقان.
- شح بول > 400 مل/24 سا أو > 20 مل/سا.
- بيلة دموية.
- إنتانات مرافقة.
- حالة المريض السابقة: حمل، استئصال طحال، تثبيط مناعة.

العلامات البيولوجية:

- تقطر الدم $< 5\%$.
- حماض استقلابي: $\text{PH} > 7.25$.
- بيكرونات بلاسمية > 15 ميلي مول/ل.
- كرياتينين الدم < 265 مل مول/ل (25 مغ/ل).
- سكر الدم > 2.2 مل مول/ل (> 0.40 غ/ل).
- بيليروبين الدم الكلي < 50 مل/ل (< 30 مغ/ل).
- هيموغلوبين ≥ 7 غ/100 مل.

نقص صفيحات الدم، تكون عائدة لظاهرة مناعية، ولذلك لا تعتبر كعلامة خطيرة إذا كانت منفردة.

في حالة وجود علامة خطيرة، الدخول إلى المشفى لا بد منه، وذلك للبدء بالمعالجة عن طريق الحقن ولمراقبة الحالة السريرية، تطفل الدم، والمعطيات البيولوجية. في حالة غياب علامات الخطورة، فإن الدخول إلى المشفى غير ضروري وذلك إذا كان باستطاعة المريض المراجعة بعد 48 - 72 ساعة.

3. المعالجة:

في حال عدم وجود إقياءات: اختيار دواء مضاد للملاريا (البرداء)، يتعلق بمعرفة المتصورة (Plasmodium) المسببة، بمقاومتها للعلاج المتعلق بالبلد المضيف (جدول 2). من الناحية العملية، في حال كون المتصورة: م. نشيطة (P. Vivax)، أو م. بيضوية (P. Ovale) أو م. وبائية (P. malariae)، فإن المعالجة تكون بالكوروكين (Nivaquine) عن طريق الفم (أنظر فصل 43) في الحالات الأخرى نظراً لوجود عدد كبير من المتصورات المنجلية المقاومة للكوروكين فالمعالجة تكون عن طريق الفم:

- الأتوفاكون + بروغوانيل (Malarone): 4 حبات/يوم، مع الوجبة الغذائية، لمدة 3 أيام عند البالغ والطفل < 12 سنة.
 - الكينين، الدواء المرجعي المضاد للبرداء، ولكن نظراً لسوء تحمله، ولمدة المعالجة (7 أيام)، فإن استعماله أصبح محدوداً (أنظر فصل 43).
 - أو الميفلوكين (Lariam)، بعد إجراء E.C.G للمريض (أنظر فصل 43).
 - أو الهالوفانتيرين (Halfan)، (بعد إجراء E.C.G)، على أن يستعمل بحذر خاصة عند البالغ، وذلك نظراً لأعراضه الجانبية القلبية؛ هذا ويوجد مستحضرات منه على شكل شراب للأطفال الصغار (أنظر فصل 43).
- في حال وجود إقياءات: كينين حقناً داخل الوريد (أنظر فصل 13)، ومن ثم متابعة المعالجة عن طريق الفم بواسطة الكينين أو الأتوفاكون + بروغوانيل أو ميفلوكين حال توقف الإقياءات.

جدول 2 - البلاد التي يجب أخذ معالجة وقائية مضادة للبرداء عند زيارتها، وتوزع المناطق التي يوجد فيها متصورات منجلية مقاومة.

بلاد الفئة I: لا يوجد مقاومة للكلوروكين.
أفريقيا: الجزائر، مصر (الفيوم)، جزر موريس، ليبيا (نادره)، المغرب.
أمريكا: الأرجنتين (في الشمال)، برازيل (ما عدا الأمازون)، كوستاريكا، السلفادور، الإكوادور (الغرب)، غواتيمالا، تاهايتي، هندوراس، المكسيك، نيكاراغوا، باناما (الغرب)، باراغواي (الشرق)، البيرو (ما عدا الأمازون)، الجمهورية الدومينيكية، فنزويلا (ما عدا الأمازون).
آسيا: أذربيجان، الصين (لشمال الشرقي)، كوريا الجنوبية، تاجيكستان، تايلاند (الجنوب).
أوروبا: أرمينيا.
الشرق الأوسط: إيران (ما عدا الجنوب - الشرقي)، العراق، سوريا، تركيا (الجنوب الآسيوي).
بلاد الفئة II: يوجد مقاومة للكلوروكين.
أفريقيا: بوركينافاسو، ساحل العاج، غامبيا، غانا، غينيا، ليبيريا، مدغشقر، مالي، موريتانيا، ناميبيا، نيجيريا، سينغال، سيراليون، الصومال، تشاد.
آسيا: أفغانستان، بوتانا، الهند، إندونيسيا (ما عدا إيريان جايا)، ماليزيا، نيبال، باكستان، الفلبين، سيرلانكا.
الشرق الأوسط: العربية السعودية (الغرب)، الإمارات العربية المتحدة، إيران (الجنوب الشرقي)، عمان، اليمن.
أمريكا الجنوبية: كولومبيا (ما عدا الأمازون)، الإكوادور.
جزر المحيط: جزر سالومون، فانواتو.
بلاد الفئة III: احتمال مرتفع لوجود مقاومة على الكلوروكين أو مقاومة على عدة أدوية.
أفريقيا: أفريقيا الجنوبية (النصف الشمالي)، أنغولا، بوتسوانا، بوروندي، الكامرون، جزر القمر، الكونغو، جيبوتي، إريتريا، إثيوبيا، الغابون، غينيا (الجزء المداري)، كينيا، مالاوي، مالاوي، موزامبيق، نيجيريا، أوغندا، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، رواندا، السودان، تانزانيا، توغو، زامبيا، زيمبابوي.
أمريكا الجنوبية: بوليفيا (الأمازون)، البرازيل (الأمازون)، كولومبيا (الأمازون)، الإكوادور (الشرق)، غويانا، غويانا الفرنسية (الألها)، باناما (الشرق)، البيرو (الأمازون)، سورينام، فنزويلا (الأمازون).
آسيا: بانغلاديش، كامبوديا (مقاومة للميفلوكين في مناطقها الحدودية مع تايلاند)، الصين (يونان و هيانان)، لاوس (مقاومة للميفلوكين في المنطقة الحدودية مع تايلاند)، ميانمار (مقاومة للميفلوكين في المنطقة الحدودية مع تايلاند)، تايلاند (مقاومة للميفلوكين في المناطق الحدودية الشمالية)، فييتنام (ما عدا الشريط الساحلي والدلتا).
الجزر المحيطية: إندونيسيا (إيريان جايا)، بابوازي - غينيا الجديدة.
* بصورة خاصة المتصورة النشيطة (P. Vivax).
** انتقال ضعيف: معالجة وقائية غير إجبارية مهما كانت مدة الإقامة.

ففي حال البرداء الخطيرة: تطفل الدم تطفل الدم يمكن أن يكون ضعيفاً على اللطاخة/القطرة السميكة، مع وجود تركيز عال للمتصورات في الشعيرات الدماغية. المعالجة هنا إسعافية، في شعبة العناية المشددة، وذلك بواسطة حقن بطني للكينين (كينين نموذجي: 10 - 13 مغ/ل) حتى 48 سا بعد اختفاء علامات الخطورة، ومن ثم متابعة المعالجة عن طريق الفم بواسطة الكينين أيضاً حيث يبدأ به بعد 8 ساعات بعد آخر حقنة للكينين (أنظر فصل 43). معالجة المتابعة هذه يمكن أن تكون بالميفلوكين (يبدأ به 12 ساعة بعد إيقاف الحقن). أو الأتوفاكون + بروجوانيل. الوفاة يمكن أن تحدث في حالة البدء بالمعالجة بصورة متأخرة جداً. في حال وجود قصور كلوي أو يرقان فإن جرعة الكينين يجب أن تنقص (أنظر فصل 43).

ففي حالة البرداء، مع شك كبير بوجود مقاومة متعددة: كينين مرفق بالدوكسيسيكليين (Vibramycine) حب عيار 100 مغ: 200 مغ/يوم لمدة 7 أيام.

جدول 3 - انتقاء المعالجة الوقائية المضادة للبرداء

بلاد الفئة I
- كلوروكين (Nivaquine): 100 مغ/يوم عند البالغ و 1.5 مغ/كغ/يوم عند الطفل، جرعة وحيدة.
بلاد الفئة II
- كلوروكين (Nivaquine): 100 مغ/يوم عند البالغ و 1.5 مغ/كغ/يوم عند الطفل، بالإضافة إلى بروجوانيل (Paludine) 200 مغ/يوم عند البالغ و 3 مغ/كغ/يوم عند الطفل جرعة وحيدة يوميا، أو Savarine عبارة عن مستحضر يرافق في الحبة نفسها 100 مغ من الكلورولين و 200 مغ من البروجوانيل لاستعمالها عند البالغ (حبة واحدة/يوم).
- أو أتوفاكون 250 مغ + بروجوانيل 50 مغ (Malarone): حبة واحدة/يوم مع الطعام عند البالغ والطفل الذي وزنه < 40 كغ.
- أو دوكسيسيكليين (Doxypalu) 100 مغ/يوم عند البالغ (مضاد استطباب عند المرأة الحامل) في المناطق الحدودية لشمال تايلاند/لاوس/ميانمار/كامبودجيا (مقاومة على الميفلوكين).
المعالجة الوقائية بواسطة الكلوروكين، البروجوانيل، أو الدوكسيسيكليين يجب البدء بها يوم السفر إلى البلد الموبوء ومتابعتها لمدة 4 أسابيع بعد العودة منه؛ المعالجة بواسطة الأتوفاكون + البروجوانيل يجب البدء بها يوم السفر إلى البلد الموبوء ومتابعتها 7 أيام بعد العودة منه؛ الميفلوكين يجب البدء به 10 أيام قبل السفر إلى البلد الموبوء وذلك من أجل تقويم تحمله ومتابعته تستمر 3 أسابيع بعد العودة.

3. الإسهالات المترافقة بحمى

التشخيص: زراعة الغائط وزراعة الدم.
وحدها الإسهالات الجرثومية (الشيغيللا، السالمونيلا، الإشيريشياكولي، الجراثيم المعوية - الاختراقية/المعوية النازفة، اليرزينيا، الكامبيلوباكتر) يمكن أن تبرر معالجتها بالفلووروكينولون عن طريق الفم لمدة تتراوح ما بين 5 - 10 أيام (كبديل عند الأطفال: الكوتريموكسازول) أو بالماكروليد أو بسيكلين + إعطاء سوائل (أنظر فصل 9، الجزء الأول)، الإسهالات الطفيلية لا تترافق بترفع حروري.

4. الحمى التيفية Typhoïde

تتظاهر غالباً بحمى وبشكل أقل بإسهالات (باستثناء الأطفال).
التشخيص: زراعة الدم وزراعة البراز.
المعالجة تكون بالفلووروكينولون عن طريق الفم لمدة 7 أيام أو كبديل بالسيفترياكسون 4غ/24 ساعة أو 75 مغ/كغ/يوم لمدة 5 أيام. اللقاح لا يعطي فعالية مطلقة.

5. التيفاتانات المترافقة بحمى

يجب نفي الإصابة بالبرداء وذلك بإجراء فحص اللطاخة الدموية.
الارتفاع الواضح للترانس أميناز مع غياب اللقاح يؤدي للشك بإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي (A بشكل خاص، E و B بشكل أكثر ندرة). التشخيص يتم بإجراء الفحوص المصلية والمعالجة عرضية.
الدلائل التي تؤدي للشك بالإصابة بداء البريميات Leptospirose هي التالية: إقامة في منطقة موبوءة (آسيا، الربيونيون Réunion...)، التعرض لقوارض، مخيمات، استحمام في مياه عذبة، آلام عضلية، أعراض سحائية، نزوف، ارتفاع كرياتينين الدم، ارتفاع الترانس أميناز. التشخيص يتم بزرع الدم، زرع البول، الفحوص المصلية التشخيصية.

المعالجة تكون بالأمينوبنيسيلين 500 - 1 غ/6 ساعات داخل الوريد أو بالسيكلينات لمدة 10 أيام (أنظر فصل 41).

6. خراج الكبد الأميبي

يمكن أن يتظاهر بعد عدة أشهر من العودة، حتى في حال غياب إصابة معوية. الدلائل التي تؤدي إلى الشك بالإصابة هي: الترفع الحاروري، الألم الكبدي، ارتفاع عدد الكريات البيض المتعددة النوى، ارتفاع سرعة التثفل، ارتفاع القوس الحجابي الحاجزي الأيمن، إصابة جنبية يمنية - كرد فعل - كثيرة المصادفة، صورة كثافة وحيدة أو متعددة على إيكو الكبد، التفاعل المصلي للأميب إيجابي. البزل بتوجيه الإيكو يسمح بتفريغ قيح "شوكولاتي" غير جرثومي لا يحتوي أو يحتوي بشكل قليل على الأميب. هذا وإن وجود الأميب الحال للنسج (*Entamoeba histolytica*) في البراز يساعد على التشخيص، ولكن العكس لا يسمح بنفيه. المعالجة تكون باستعمال دواء قاتل للأميب وقابل للانتشار. دواء من عائلة النيترو إيميديازول لمدة 10 أيام، مرافق بقاتل للأميب الغير اختراقي (*Intérix*) لتجنب النكس الذي يمكن أن يحصل خلال الأشهر أو السنوات اللاحقة (أنظر فصل 10 و 43) هذا وإن خطر انفجار الخراج أو في حال غياب التحسن تحت المعالجة الدوائية أو بعدها يفرض المداخلة الجراحية التي تبقى استثنائية.

تحت المعالجة، انخفاض الحرارة واختفاء الألم يحدثان خلال 1 - 3 أيام، فحص التعداد والصيغة يعود إلى الطبيعي خلال 7 - 10 أيام، سرعة التثفل تنقص إلى النصف كل أسبوع، التجمعات داخل الكبدية تُمتص خلال 3 - 6 أشهر، وأخيراً فإن الفحص المصلي يصبح سلبياً خلال بضعة أشهر.

7. الترفع الحاروري مع فرط الكريات الحمضية

Hypereosinophilie

تعود الحرارة إلى الهجرة النسيجية ليرقات الدودة بعد الإصابة الجلدية (داء البلهارسيا في مرحلته الاختراقية) أو الهضمية (داء الأسكاريس أو

المتورقة الكبدية في مرحلة الاختراق، داء الشعيرنية Trichinose، داء السهميات (Toxocarose). تترافق هذه الحرارة بعلامات تحسسية، بضخامة كبدية بآلام مفصلية، بوجع عضلي، وبرشاحات رئوية، التشخيص يتم بواسطة تفاعل مصلي.

- أحد الأدلة التي تثير الشبهة بالإصابة بالبلهارسيا في مرحلتها الاختراقية (تتأذر كاتاياما Katayama أو حرارة السفر fièvre de safarie) هي تظاهر الإصابة بعد 15 يوماً من الاستحمام في مياه عذبة. يتم التشخيص عن طريق الفحوص المصلية (البيوض لا تطرح عن طريق البراز أو البول إلا بعد شهرين من الإصابة). المعالجة تكون بإعطاء البرازيكانتيل عن طريق الفم (Biltricide) حب 600 مغ، 40 مغ/كغ جرعة وحيدة (أنظر فصل 43)، هذا الدواء يكون قليل الفعالية في مرحلة هجرة اليرقات، وفعال في مرحلة طرح البيوض.

- المتورقات تعطي صورة سريرية مشابهة. التفاعل المصلي يصبح إيجابياً بصورة مبكرة. معالجة المتورقة الكبدية تكون بإعطاء التريكلابندازول عن طريق الفم (Egateu): 10 مغ/كغ جرعة وحيدة، المتورقات الأخرى تعالج بالبرازيكانتيل (أنظر فصل 43).

- الأدلة المثيرة للشبهة بالإصابة بالفطور الشعروية Trichinose هي: تناول لحم خنزير أهلي أو وحشي، تظاهر عدة حالات بعد مأدبة مشتركة. وذمة الوجه، آلام عضلية، ارتفاع الـ C.P.K، التشخيص مصلي، المعالجة عرضية بواسطة الكورتيزونات، الأدوية البريميدازولية فعاليتها غير أكيدة على اليرقات (البندازول فموي: Zentel أو تيابندازول فموي: Mintézol) (أنظر فصل 43).

- تتأذر اليرقات المهاجرة الحشوي يعود بصورة أساسية إلى الهجرة النسيجية ليرقات الأسكاريس الحيوانية (توكسوكاروز Toxocarose)، التشخيص مصلي. المعالجة تكون بالتيابنجازول أو الالبندازول عن طريق الفم (أنظر فصل 43).

8. الحمى المتراجعة (Fievers recurrentes):

داء البوريليا الذي ينتقل عن طريق القمل أو القراد يكون مسؤولاً عن ترفع حروري راجع وضخامة طحال. يؤكد التشخيص بواسطة اللطاخة الدموية. تركز المعالجة على إعطاء الدوكسيسيكليين عن طريق الفم (Vibramycine 100 مغ): 200 مغ/يوم لمدة 7 أيام. هذا والاحتمال المرتفع لحدوث ارتكاس جاريش - هيركسمير Jarish-Herxheimer يتطلب مراقبة خاصة خلال الساعتين التاليتين لبدء المعالجة. المعالجة البديلة تكون بإعطاء البييتالاكتامين، الماكروليد والأدوية الفينيكولية.

9. حمى مع وجود طفح

يشبهه بالتشخيص عند وجود حطاطات أو حطاطات بقعية مترافقة مع قرح عائد لنقطة الإلحاق الجرثومي المسبب من قبل القراد (تيفوس بروساي في الشرق الأقصى، حمى القراد الأفريقية، الحمى المحببة للبحر المتوسط) ويؤكد بواسطة الفحص المصلي. المعالجة تكون بالدوكسيسيكليين عن طريق الفم (Vibramycine 100 mg): 200 مغ/يوم لمدة 7 أيام أو لمدة يومين بعد عودة الحرارة إلى الطبيعي. فيروسات الأربو Arbovirus تكون غالباً مسؤولة عن وجود طفح.

10. حمى مع وجود ضخامة طحال

باستثناء البرداء، فإن داء البوريليا، البروسيللا، الحمى التيفية، الليشمانيا الحشوية يشك بها أمام وجود ضخامة كبدية - طحالية، اعتلال عقد لمفاوية، نقص في الكريات البيض، تناذر التهابي، فرط غلوبولينات الدم غاما (مع ازدياد ملحوظ في الـ IgG). الطفيليات يبحث عنها بواسطة فحص النقي. تستدعي المعالجة إعطاء أنتيمونيوات الميغلومين (Glucantime)، إيزيتيونات البنتاميدين (Pentacarinat) أو الأمفوتيريسين B (أنظر فصل 43).

11 حمى مع اعتلال العقد اللمفاوية

1. الليشمانيا الحشوية: أنظر الفقرة 10

2. الإنتان بالـ VIH: أنظر الفصل 27، الجزء الأول

3. داء المثقبيات (Trypanosomose) الأفريقي (مرض النوم):

يشك بهذا الداء في مرحلته اللمفاوية الدموية، عند العودة من أفريقيا المدارية، أمام وجود قرحة الدخول، اعتلال في العقد اللمفاوية، ضخامة كبدية - طحالية حطاطات حمراء (تريبانيد Trypanides)، حكة، وذمة وجه، وأحياناً وجود علامات التهاب دماغ. الدلائل المؤيدة للتشخيص هي: ارتفاع عدد الخلايا البلاسمية، زيادة الـ IgM، تفاعل مصلي إيجابي مع وجود المثقبيات في السائل المستخرج من العقد اللمفاوية وفي الدم. تستند المعالجة على إعطاء البنتاميدين (Pentacarinat زجاجة 300 مغ) 10 حقن داخل الوريد (بواسطة محقن كهربائي) 4 مغ/كغ، مع فترة فاصلة ما بين الحقنة والأخرى قدرها 48 سا (الميلارسوبرول Arsobal يستعمل في حالة الإصابة الدماغية).

4. داء الخيطيات (Filariose) اللمفاوية الحادة:

يتظاهر بالتهاب الأوعية اللمفاوية مع اعتلال التهابي للعقد اللمفاوية. يؤكد التشخيص بترافق ارتفاع عدد الكريات الحامضة في الدم ووجود خيطيات مجهرية microfilaires في الدم أو اختبار مصلي إيجابي. تركز المعالجة على إعطاء الإيفيرميستين (Stromectol) عن طريق الفم: جرعة وحيدة 2.5 مغ/كغ تكرر 3 مرات/يوم.

12 حمى مع اعتلال عصبية قلبية أو سحائية

دائماً يجب إجراء الفحوصين التاليين: اللطاخة الدموية (داء البرداء العصبي) والبزل القطني. وجود ارتفاع في عدد الكريات اللمفاوية في السائل

الدماغي الشوكي يوجه نحو إصابة بفيروس الأربو Arbovirus (أنظر الفقرة 13)، إنتان أولي بالـ VIH (أنظر فصل 27، الجزء الأول). في حالة كون السائل الدماغي الشوكي قيحياً فالتشخيص يتجه نحو الإصابة بالتهاب السحايا بالمكورات السحائية A، C أو W₁₃₅ خصوصاً بعد سفر إلى منطقة ساحلية في فصل حاف، مع عدم أخذ اللقاح، و W₁₃₅ بعد حج في مكة المكرمة (أنظر فصل 5).

13. الداء الحاد لفيروس الأربو Arbovirus

بعد نفي وجود البرداء، التشخيص يعتمد على التفاعل المصلي. المعالجة عرضية، هذا وإن الإبلاغ عن وجود الحمى الصفراء إجباري في فرنسا. أربعة تناذرات تثير الشبهة بهذا المرض:

- حمى مؤلمة: الدنج La dengue هي الإصابة الأكثر مصادفة لداء الأربو (آسيا الجنوبية، أميركا اللاتينية، الكارييب، دول المحيط الهادي، المحيط الهندي، وبشكل أكثر ندرة أفريقيا المدارية)؛ هذا ويمكن أن يتظاهر المرض بتناذر صدمة أو أشكال نزفية (ما عدا في أفريقيا).
- التهاب سحايا و دماغ: التهاب الدماغ الياباني (الصين، كوريا، اليابان، الهند، النيبال، سيريلانكا، ميانمار، آسيا الجنوبية الشرقية، الفلبين، إندونيسيا) يكون أكثر مصادفة عند الأشخاص الغير آخذين للقاح.
- تناذر نزفي مع تناذر كلوي: فيروس هانتا Hantavirus (الصين، كوريا).
- تناذر كبدي - كلوي: الشك بالحمى الصفراء في حالة الإقامة، ولو كانت قصيرة، من دون أخذ لقاح، في أفريقيا المدارية أو في الحوض الأمازوني.

14. الحمى النزفية الإفريقية

الإقامة في أفريقيا المدارية ووجود معلومات عن وباء أو إصابة معزولة في المنطقة المزارة، يدعو إلى الحذر من احتمال إصابة إثنائية بفيروسات الإيبولا Ebola أو اللاسا Lassa، مما يتطلب عزل المريض. واتخاذ إجراءات

صحية صارمة في المشفى وإعلام المخبر عن قابلية العدوى الشديدة بواسطة العينات المأخوذة من المريض، كما يجب إبلاغ السلطات الصحية المختصة. للريبافيرين يستعمل لمعالجة حمى اللاسا Lassa، كما يقترح استعماله وقائياً في حالة التماس مع دم المصاب من قبل الفريق الطبي، وأحياناً يرفق مع الأنترفيرون.

39. الصادات الحيوية: قواعد الاستعمال

تطال المعالجة بالصادات الحيوية 30 - 40% من المرضى، وهكذا فهي تحتل المركز الثاني للميزانية الدوائية في المشافي، مع العلم أن ثلث المعالجة المحققة بالصادات الحيوية هي معالجة غير مكيفة بشكل صحيح سواء كان كمياً أو كيفياً. هذا وإذا كان وصف الصاد الحيوي يحقق بشكل صحيح سواء كان مفيداً، فإن المعالجة بالصادات الحيوية تمثل فعلاً جماعياً مهماً، وذلك لتغييرها للبيئة الجرثومية للمشفى ولمساهمتها بهذا الشكل بتوليد الإنتانات النوزوكوميالية، الاستعمال الجيد للصادات الحيوية يمر عبر معرفة واحترام قواعد الاستعمال، واتباع سياسة معالجة بالصادات الحيوية توفق ما بين الفعالية العلاجية والسيطرة على المقاومة الجرثومية والكلفة.

1. اختيار الصاد الحيوي

1. الاختيار بحسب الخصائص الجرثومية:

أ. تحديد الجرثوم المسبب:

يتعلق اختيار الصاد الحيوي بالجرثوم المعزول، أو بالجرثوم المفترض أنه مسؤول عن المرض. هذا ومن غير المهم أخذ عينة للفحص الجرثومي في حال كون التشخيص السريري كافياً:

- توافق سريري - جرثومي جيد (التهاب بلعوم، حمرة، تقيج جلد).
- حساسية العضويات المسببة على مضادات الإنتان العادية (أو إصابة بالتهاب مثانة عند امرأة شابة).
- الجرثوم المتطلب علاجه محدود (المكورات العقدية الحالة للدم B والمسببة لالتهاب البلعوم، كلوستريديام بيرفرينجيس المسؤولة عن الغنغرينة الغازية). من ناحية أخرى فإن أخذ عينة للفحص الجرثومي يعتبر ضرورياً في حالة كون الإنتان شديداً، المريض هشاً، وجود عدة جراثيم

ممكن أن تسبب الإنتان، أو في حالة كون حساسية الجرثوم للصادات الحيوية غير ثابتة (الشك بتجرثم دم، التهاب شغاف القلب الإنتاني، التهاب سحايا، إنتان بولي عال، تجمعات قيحية مختلفة، كل إنتان عند مثبطي المناعة، إنتان نوزوكوميالي، داء السل).

ب. تحديد الحساسية الجرثومية للصاد الحيوي:

يتعلق اختيار الصاد الحيوي أيضاً بحساسية الجرثوم المسبب له. المعالجة الاحتمالية بالصادات الحيوية تأخذ بالحسبان:

- معطيات جرثومية عامة، بصورة خاصة معرفة طيفه المضاد للجراثيم والمثبت على زمر جرثومية مرجعية.
- معطيات جرثومية وبيئية محلية انطلاقاً من نسبة منوية للمقاومة والتي تكون متغيرة من مشفى لآخر وحتى من شعبة لأخرى (مقاومة أكبر في شعبة العناية المشددة منها في شعبة الأمراض الداخلية).
- معطيات سريرية: وجود حالة سريرية خطيرة يفرض استعمال الصاد الحيوي الذي المقاومة الجرثومي له تكون أقل ما يمكن (حالة إنتان نوزوكوميالي بالمكورات العنقودية، حيث يجب معالجته منذ البدء بالغليكوبيبتيد).

ج. المعالجة بالصادات الحيوية ذات الخيار الثاني:

بعد تحديد الجرثوم والحصول على اختبار التحسس الجرثومي للصاد الحيوي، فإنه من المفضل اللجوء إلى تكيف المعالجة بالصادات الحيوية، هذا يعني اختيار الصاد الحيوي الفعال على الجرثوم المعزول.

2. الاختيار بحسب الخصائص الدوائية:

يجب أن يكون الصاد الحيوي فعالاً في مكان الإنتان (أو العضو المصاب بالإنتان) مما يعني أن تركيزه النسيجي يجب أن يعادل على الأقل التركيز المثبط الأصغر (وإذا كان ممكناً الـ CMB) للجرثوم المسبب. هذا الشرط يتعلق بعدة عوامل تتداخل في الحركية الدوائية للصاد الحيوي وتؤثر على وصفه.

الامتصاص: في حال عدم امتصاص صاد حيوي ما بواسطة الأنبوب الهضمي فإن هذا الصاد لا يمكن وصفه لمعالجة الإنتانات المتعممة. ولكن حتى في حالة إمكانية امتصاص الصاد الحيوي عن طريق الأنبوب الهضمي فإن هذا الامتصاص يمكن أن يتغير (الأطعمة، الحالة الوظيفية للأنبوب الهضمي، الحالة الهيموديناميكية، التفاعل ما بين الأدوية). باستثناء الفلوروكينولون حيث يحتفظ بالطريق الفموي عادة من أجل الإنتانات القليلة الشدة أو لمتابعة معالجة كان قد بدأ بها عن طريق الوريد أو العضل.

الانتشار أو (الاختراق) Diffusion: من المهم معرفة الانتشار النسيجي والخلوي للصادات الحيوية، الطريقة التي تجتاز بها بعض الحواجز الطبيعية (دموية سحائية، مشيمية، عينية، بروتينية، عظمية). في حالة التهابات شغاف القلب الإنتانية، فإن الصادات الحيوية ذات التركيزات المصلية المرتفعة يمكن أن تخترق البزاعم.

التسبدل البيولوجي Biotransformation: هناك صادات حيوية تطرح من دون أي تغيير فيها، وصادات حيوية أخرى تطرح بعد تحولها إلى مواد استقلابية ذات فعالية مضادة للإنتان متغيرة.

منتصف الحياة المصلية Demi-vie sérique: إن فترة تعادل 4 مرات لمنتصف الحياة، يجب أن تفصل ما بين جرعة وأخرى، وذلك بالنسبة لصادات حيوية ذات فعالية مضادة للجراثيم "متعلقة بالزمن" وخالية من فعالية لاحقة مضادة للجراثيم (بيتالكتامين بالنسبة للجراثيم غرام السلبية، غليكوبيبتيد بالنسبة للجراثيم غرام إيجابية). وعلى العكس من ذلك فإن الأمينوزيدات ذات الفعالية المضادة للجراثيم "المتعلقة بالجرعة" والتي تملك فعالية لاحقة مضادة للجراثيم، يمكن أن تعطى بفترات أكثر تباعدا: حقنة واحدة كل 12 ساعة من أجل منتصف حياة مقارب لساعتين، حتى أنه بالإمكان إعطاء حقنة واحدة كل 24 ساعة (ما عدا عند الأشخاص الذين عندهم نقص في الكريات البيض أو المصابين بالتهاب شغاف قلب إنتاني).

الطرح: من المهم معرفة طريق الطرح (بولي أو صفراوي)، وذلك

لمعالجة إنتان متوضع على هذا المستوى، ومن ناحية أخرى من أجل تعديل الجرعة في حالة قصور أحد هذه الطرق.

التركيزات المصلية: إن معايير للأمينوزيدات في قمة تركيزها، أو في تركيزها المتبقي، أو للغليكوبيبتيدات فقط في حالة تركيزها المتبقي، تسمح بالحفاظ على تركيزات مناسبة للمعالجة وغير سمية.

3. الاختيار بحسب المريض:

يجب أن يأخذ الصاد الحيوي بعين الاعتبار وضع المريض الصحي. عند حديث الولادة والرضيع، يجب تجنب الأدوية الفينيكولية، السيكالينات، السلفاميدات، الفلورووكينولونات، ويجب تفضيل استعمال البيتاالاكتامين، الماكروليدات، وفي حالة الضرورة تستعمل الأمينوزيدات فقط. عند المرأة الحامل فقط البيتاالاكتامينات والماكروليدات يمكن أن تستعمل بكل اطمئنان وذلك طوال فترة الحمل.

عند الشخص المسن، يجب الأخذ بالحسبان التدهور الفيزيولوجي في الوظيفة الكلوية (رغم كون الكرياتينين في الحدود الطبيعية). معادلة كوكروفت تسمح بتقدير وظيفة الكلية حسب عمر المريض:

$$\text{تصفية الكرياتينين} = (140 - \text{العمر}) \times \frac{\text{الوزن (كغ)}}{72} \times \frac{1}{1.04} \text{ (رجل) أو } 1.04 \text{ (امرأة)}$$

كرياتينين الدم (ملي مول/ل)

هذا ويجب أن يؤخذ بالحسبان وجود القصور الكلوي أو الكبدي مما يؤدي إلى تجنب استعمال بعض الصادات الحيوية أو إلى تكيف أفضل لجرعتها (الأمينوزيد والقصور الكلوي). وجود حساسية مثبتة وهامة (صدمة تحسسية، وذمة تحسسية) لصاد حيوي ما، تشكل مضاد استطباب قطعي لإعادة استعمال هذا الصاد. ولكن وجود حساسية على البنيسيللين لا تشكل مضاد استطباب قطعي لاستعمال السيفالوسبورين أو المونوباكتام لأن احتمال حدوث حساسية متصالبة ما بين البيتاالاكتامينات ضعيف (5%).

عند الشخص ذو الكريات المحببة الناقصة وذو المناعة المثبطة، فإن الصاد الحيوي يجب أن يكون قاتلاً للجراثيم.

4. الاختيار بحسب الخصائص السمية:

في حال وجود صادين حيويين ذوي فعالية متماثلة، فإنه يجب اختيار اللصاد الحيوي الأقل سمية.

5. الاختيار بحسب الخصائص البيئية:

بقدر الإمكان يجب استعمال اللصاد الحيوي ذي الطيف الضيق والمحدود، لأن استعمال اللصاد الحيوي الواسع الطيف يؤدي إلى ظهور المقاومة الجرثومية بكثرة. من المفضل استعمال الأمينوبنيسيلينات، السيفالوسبورينات والأمينوزيدات.

6. الاختيار حسب الخصائص الاقتصادية:

يجب اختيار اللصاد الحيوي الأقل كلفة في حال كون فعاليته مماثلة لصاد حيوي آخر أكثر كلفة.

2. المنهجية العملية لإستقاء اللصاد الحيوي

1. معالجة بصاد حيوي وحيد أم بصادين حيويين:

إذا كانت المعالجة بصاد حيوي وحيد هي الأساس، فإن مرافقة الصادات الحيوية فيما بينها لها عدة أهداف: الحصول على فعالية متضافرة، زيادة سرعة قتل الجرثوم، توسيع الطيف المضاد للجرثوم في حالة إنتان غير معروف السبب أو مسبب من عدة جراثيم، وأخيراً الإنقاص من حدوث طفرات جرثومية مقاومة.

استطباب مرافقة الصادات الحيوية ينصح به حسب:

- الجرثوم المسبب: بروسيللا، بسودوموناس، جراثيم معوية، سيرايبا، سيتروباكتير، أسينيتوباكثير، جراثيم فطرية.
- موضع الإصابة: التهاب شغاف القلب الإنتاني، إنتانات حوضية أو بريتانوية، إنتانات نوزوكوميلية.

- الصاد الحيوي: ريفامبيسين، فوسفوميسين، حمض الفوسيديك، كينولون لأن احتمال اصطفاء طفرات مقاومة كثير الارتفاع في حال استعمال هذه الصادات الحيوية وحيدة.
- المريض: مريض عنده نقص في الكريات البيض أو مثبط المناعة.

2. طريق الإعطاء:

يستطب الطريق الفموي في حالة كون الجرثوم المسبب حساس بشكل عام، إذا كان الإنتان غير شديد، وإذا كان التوفر البيولوجي Biodisponibilité للصاد الحيوي جيداً.

الطريق الوريدي يكون أكثر مناسبة في حالة الإنتانات الخطيرة: حقن مباشر داخل الوريد، حقن لمدة قصيرة أو مستمر (بنيسيلين G). هذا ويمكن استعمال الطريق داخل العضل بالنسبة للأمينوزيدات، للسيفترياكسون، وللتيكوبلانين، وذلك في حال غياب اضطرابات تخثرية.

3. مدة المعالجة:

مدة المعالجة بالصادات الحيوية ترتكز على قواعد خبراتية. الاتجاه الحالي هو نحو تقصير مدة المعالجة وذلك لتجنب جراثيم متعددة المقاومة. من هذا المنطلق، بالنسبة لبعض الإنتانات فإنه بالإمكان تحديد مدة معالجة مثلى.

3.1. مراجعة المعالجة وتعديلها (جدول 1)

تقوم المعالجة بعد 48 - 72 ساء: يجب الامتناع عن تغيير المعالجة الدوائية قبل 48 ساء إلا في حالة حصول تغير سريري أو ظهور نتيجة جرثومية فارضان إجراء التغيير. في الحالات الأقل خطورة، فإن مراقبة الاستجابة على المعالجة تعتمد على تطور الصورة السريرية. المراقبة بواسطة الفحوص الجرثومية تفرض نفسها في حالة غياب الاستجابة السريرية المناسبة، أو في الحالات التي نتائج الفحوص الجرثومية لها كانت إيجابية وذلك قبل البدء بالمعالجة بالصادات الحيوية. في حالة المعالجات ذات الفترة

الطويلة، فإن قياس التركيزات المصلية القمية Pic والمتبقية Residuel يجب أن تجرى بشكل روتيني بعد 48 سا ومن ثم مرتين بالأسبوع وذلك بالنسبة للأمينوزيدات أو للغليكوبيبتيدات، هذه القياسات تسمح بالتأكد من وجود عيارات فعالة وتجنب العيارات السمية، هذا ويجب تقويم المعالجة بشكل دائم على مستوى الفعالية والسمية.

جدول 1 - عناصر المراقبة

الصادات الحيوية	الآثار الجانبية الأساسية	المراقبة
- البنيسيلينات	حساسية	الاستجاب
- السيفالوسبورينات	نوبات اختلاجية	جرعة مناسبة
- الأمينوزيدات	حساسية	الاستجاب
	سمية سمعية وكلوية	وظيفة الكلية
		تركيزها المصلي
		معالجة قصيرة الأمد
- الماكروليدات وشبهاتها	عدم تحمل هضمي	مراقبة اللحف
	تحسس للضياء	جرعة مناسبة
	تدخل في التفاعل الدوائي	
- كوتريموكسازول	سمية دموية	تعداد وصيغة
	سمية جلدية	مراقبة اللحف
- فلوروكينولونات	عدم تحمل هضمي	جرعة مناسبة
	تحسس للضياء	الحذر في الاستعمال
	أثار عصبية نفسية	مراقبة اللحف
	تناثر ألم مفصلي عضلي	مراقبة الحالة العقلية
	مرض في الوتر، وتمزق الوتر	

4. مبادئ استعمال الصادات الحيوية في المستشفى

1. الصادات الحيوية تستعمل للمعالجة وللوقاية:

تكون الإنتانات ذات نمطين:

- شائعة خطيرة غير معالجة بعد أو كانت قد عولجت ولكن مع فشل المعالجة.

- نوزوكوميالية عائدة غالباً لجراثيم متعددة المقاومة فإرضة بذلك استعمال أدوية ذات طيف واسع. الاستعمال الكثيف للصادات الحيوية يؤدي إلى اصطفاء الجراثيم المقاومة وذلك اعتباراً من نبيت Commensales. هذا وإن خصائص المرضى الذين في المشفى (ناقص المناعة)، وتعدد التداخلات الاختراقية (قناطر بولية، قناطر وريدية، طعوم)، ونقل العدوى المباشر أو غير المباشر (عن طريق أيدي العاملين في المشفى) ما بين المرضى، كلها عوامل تؤدي إلى حدوث أوبئة في المشفى عائدة إلى هذه الجراثيم المتعددة المقاومة المصطفات بواسطة الصادات الحيوية.

المعالجة بالصادات الحيوية في المشفى يجب أن توفق ما بين أفضل فعالية علاجية أو وقائية فورية والنتائج بعد الاصطفاء الجرثومي.

المعالجة الوقائية بالصادات الحيوية للأمراض النوزوكوميالية تمثل بشكل خاص بالمعالجة الوقائية قبل التداخل الجراحي والمتفق عليها بشكل جيد حالياً، بينما التطهير الهضمي الانتقائي في حالة الأمراض الدموية أو في شعب العناية المشددة ما زال أمر قابل للنقاش. المعالجة الوقائية بالصادات الحيوية للأمراض الشائعة، تطبق على التهاب شغاف القلب الإنتاني، التهاب المفاصل الرئوي الحاد، المكورات السحائية، الغانغرينا الغازية والباستوريللا في حالة عضه حيوان.

2. من الناحية العملية:

إن العمل المشترك ما بين الأطباء الممارسين، الأخصائيين بالأمراض الإنتانية، أطباء المخبر والصيدلة، أمر ضروري جداً، يسمح بوضع بروتوكولات معالجة بالصادات الحيوية شافية ووقائية من أجل الحالات السريرية الأكثر شيوعاً، وبروتوكولات مراقبة دقيقة للبيئة الجرثومية للشعب المختلفة في المشفى. هذه البروتوكولات تكون من اختصاص لجنة مكافحة الأمراض النوزوكوميالية. استعمال الصادات الحيوية الموضعية من أجل تطهير "مخازن" الجراثيم المتعددة المقاومة (الأنبوب الهضمي، الحفر الأنفية) يمكن أن يكون مهماً في حالات الأوبئة، ولكن يجب أن يرفق بإجراءات صحية أخرى مطبقة بشكل جيد.

40. المضادات الإنتانية وتداخلات تفاعلات الأدوية فيما بينها

لن نذكر هنا الآثار الجانبية للمضادات الإنتانية في حال حصولها بشكل منعزل، إلا في حال تضخمها عند مرافقة المضاد الإنتاني بدواء آخر؛ وبالطبع لن نستطيع أن نشمل هنا كل الآثار الجانبية المذكورة في كتب خاصة بذلك.

* ملاحظة هامة: الرمز (1) يشير إلى مرافقة يجب أخذها بعين الاعتبار.

(2) مرافقة غير منصوح بها. (3) مرافقة ممنوعة.

1. المضادات الجرثومية

1. البنيسيلينات والكاربابينيمات:

مرافقة البنيسيلينات مع الأكلوبورينول (زيلوريك) غير منصوح بها، لأنها تزيد مع احتمال حصول الآثار الجانبية الجلدية. ومع الليتيوم فإنه يجب تجنب استعمال البنيسيلينات الحاوية على كمية صوديوم كبيرة كالبنيسيلين G أو التيكارسيلين.

2. السيفالوسبورينات:

مرافقة السيفالونين مع أمينوزيد يؤدي إلى زيادة السمية الكلوية (يجب مراقبة وظيفة الكلية)، مرافقة السيفاماندول مع السيفوبيرازون، السيفوتيتان يؤدي إلى آثار سوء استعمال.

3. الأمينوزيدات (عن الطريق الوريدي أو العضلي):

السمية الكلوية تزداد بمرافقة الأمينوزيدات مع أحد الأدوية التالية: أمفوتيريسين B (1)، سيفالونين (3)، فانكوميسين، سيكلوسبورين (1)، سيسبلاتين (1)، مدرات العروة (1)، كوليستين عن طريق العضل أو الوريد (4). تزداد السمية السمية بمرافقة الأمينوزيد مع السيسبلاتين أو مدرات العروة (1). مرافقتها مع أحد أدوية الكورار يزيد من فعاليتها (1).

4. الماكروليدات:

مرافقة أحد الماكروليدات (باستثناء السبيراميسين) مع الإيروجوتامين أو الديهيدرو إيروجوتامين يؤدي إلى احتمال الإصابة بالأرغوتية Engotisme مع نخر النهايات (3). الماكروليدات (باستثناء السبيراميسين) يزيد من التركيزات البلاسمية للبروموكريبتين (Parlodel، Bromo-Kin) مؤدياً بذلك إلى زيادة فعاليته المضادة للباركنسونية أو ظهور عسرة حركية (Dyskinesies) (2).

مرافقة الماكروليد مع السيسابريد مضاد استطبابه (اضطرابات نظم بطينية) السبيراميسين ينقص التركيزات البلاسمية لليغودوبا.

الإيريتروميسين (2) والجوزاميسين (1) تزيد من التركيز الدموي للسيكلوسبورين الجوزاسين، الروكستيروميسين، الكلاريتروميسين (1)، تؤدي إلى حدوث الضرر نفسه الناتج عن الإيريترروميسين بمرافقته مع التريازولام (هالسيون Halcion)، وذلك بزيادتها لتركيز هذا الأخير (اضطرابات في التصرف، تهدة زائدة).

مرافقة التيوفيللين مع الإيريترروميسين غير منصوح بها (2)، ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في حالة المرافقة مع الكلاريتروميسين، الجوزاميسين، الروكسيترروميسين.

5. السيكلينات:

مرافقة الأدوية التالية مع السيكلينات: أملاح الحديد، الأدوية الموضعية المعديّة - المعوية (المركبة مع Ca، Mg، A، K، AI) ينقص الامتصاص الهضمي (يجب أخذها بعد فترة من الزمن \leq ساعتين)؛ اعتلال الشبكية تؤدي إلى احتمال حصول فرط توتر داخل الجمجمة (3)، مضادات الاختلاجات تنقص التركيزات البلاسمية للدوكسي سيكلين (وذلك بتسريعها للاستقلاب الكبدي) (1)؛ فعالية مضادات التخثر تزداد (1).

6. الفلوروكينولونات:

الأدوية الموضعية المعديّة - المعوية (المركبة مع Mg ، Ca ، A_1) والسكريات تنقص من امتصاصها (إعطاء الفلوروكينولون ساعتين على الأقل بعد أخذ هذه الأدوية).

7. السلفاميدات (والتريميثوبريم):

السلفاميدات تؤدي إلى احتمال حصول نقص سكر الدم بالنسبة للمرضى الآخذين للأدوية الخافضة لسكر الدم السلفاميدية، وإلى احتمال حصول نزف عند المرضى الآخذين لمضادات التخثر الفموية (1). التركيزات الدموية وسمية الفينيتوين تزداد (2).

8. الـ 5 - imidazolés - Nitro (5-NI):

يجب تجنب - حتى في حال غياب الكحول - الأخذ في الوقت نفسه للديسولفيرام (Espéral) (احتمال حصول اضطرابات نفسية). الـ 5-NI تزيد من الفعل المضاد للتخثر للوارفارينات (كوماتدين) (1). الميترونيدازول والأوريندازول تزيد من سمية الـ 5 - فلوورو - أوراسيل (1).

9. الستريبتوغرامينات:

الستريبتوميسين يثبط استقلاب السيكلوسبورين: زيادة التركيزات البلازمية.

10. الريفامبيسين:

كحاث أنزيمي، فإنه ينقص، بواسطة تسريع الاستقلاب الكبدي، التركيزات الدموية لعدة أدوية مستقبلية في الكبد (جدول 1).

11. المضادات السلية (بالنسبة للريفامبيسين: أنظر سابقاً):

- الإيتامبول: الأدوية الموضعية المعديّة - المعوية تنقص امتصاصها (يجب أخذه ساعتين بعد تناولها).

جدول 1 - تداخل التفاعلات الدوائية مع الريفامبيسين

مرافقة مضاد استطبابها	مرافقة غير منصوح بها	مرافقة مع أخذ احتياطات عند القيام بها
أميرنافير	ومستحسن تجنبها إستروبروجيستاتيف	مضادات الكالسيوم
ديلافيردين	وبروجيستاتيف	مضادات اضطرابات النظم فئة I
أندينافير	(مضادات حمل)	مضادات تخثر فموية
لوبينافير	نيفيرابين	الأدوية الأروية المضادة للقطور
فيلنافير	ريتونافير	سيكلوسبورين وتاكروليموس
فوريكونازول		الكورتيزونات
ساكونافير		الديجوكسين
		إيفافيرينز
		إستروجينات وبروجيسترونات
		(غير مضادة للحمل)
		الهرمونات الدرقية
		الإيزونيازيد (الذي سميته الكبدية
		ترداد هنا)
		الميتادون
		المورفين
		فينيتوين
		تريبتا
		تيوفيللين ومشتقاته
		تولبوتاميد
		زيدوفودين
		زولبيديم

- الإيزونيازيد (INH): البيرازيناميد والريفامبيسين يمكن أن يزيدا من السمية الكبدية لـ INH (مراقبة سريرية وببيولوجية). الأدوية المخدرة الطيارة الهالوجينية لها نفس المفعول (إيقاف الإيزونيازيد لمدة أسبوع قبل التدخل الجراحي المبرمج وعدم أخذه إلا بعد أسبوعين). الـ INH يزيد من تركيزات الكاربامازيبيم والفينيتوين، مؤدياً إلى زيادة جرعتها (1). وينقص تركيز الكيتوكونازول (مباعدة أخذ الدوائين لفترة 12 ساعة على الأقل). مرافقته مع الديسولفيرام (Espéral) يعطي اضطرابات في التصرف والتوافق (2). أملاح وهيدروكسيدات الألمنيوم تنقص امتصاص الإيزونيازيد (أخذه قبل ساعتين على الأقل).

2. المضادات الفطرية

1. الأدوية الآزولية المضادة للفطور:

الأدوية الموضعية المعدية - المعوية (أملاح Mg , Ca , A_1) تنقص امتصاص الكيتوكونازول (يجب أخذه بعد ساعتين من تناولها)، الريفامبيسين يؤدي إلى نقص في التركيزات البلاسمية له، وللکيتوكونازول مسوغاً بذلك مبادعة أخذ الدوائين ومراقبة تركيزاتها البلاسمية (1). تزيد الأدوية الآزولية المضادة للفطور من التركيز الدموي للسيكلوسبورين وبالتالي من سميته الكلوية - وذلك بإنقاصها لاستقلابه - (2). في حال مرافقة الكيتوكونازول والإيتراكونازول مع بعض المضادات الهيستامينية (1) يؤدي إلى احتمال حصول اضطرابات نظم بطينية، وإلى زيادة فعالية الوارفارين (3) مؤدية بذلك إلى حوادث نزفية.

2. أمفوتيريسين B:

زيادة في السمية الكلوية في حال مرافقته مع الأمينوزيدات والسيكلوسبورين (1). مرافقته مع الأدوية المضادة لاضطرابات النظم والمنقصة للبوتاسيوم (المدرات بشكل خاص) تزيد من احتمال حصول Torsade de pointe.

3. الأدوية المضادة للتفطيليات

الكلوروكين: الأدوية الموضعية المعدية - المعوية (أملاح الأمونيوم، الكالسيوم، المغنيزيوم) تنقص امتصاصه.

الهالوفانترين: زيادة احتمال حصول الـ Torsade de pointe بمرافقته مع: الأدوية المنقصة للبوتاسيوم، مضادات اضطرابات النظم: فئة I_a (مثل الكينيدين)، أميودارون، بيبريدل، بريتيليم، سوتالول، وأدوية أخرى مثل: الإريترومييسين داخل الوريد، تيرفينادين، أو أي دواء أو حالة سريرية تطيل مسافة Q-T.

الميفلوكوين: قافلات B، يمكن أن تزيد من فعاليته المبطنة للقلب (1)، مرافقته مع قالفروات الصوديوم (الديباكين) يكون مضاد استطباب عند مريض الصرع.

البيريميتامين: مرافقته مع دواء حاو للميتوبريم (خاصة في حال أخذ جرعة عالية من الدوائين) يزيد من الفعالية المضادة لحمض الفوليك وبالتالي حدوث فقر دم عرطل (2).

الكينين: بتغييرها للـ PH البولية، فإن مضادات الحموضة تنقص من طرحه وبالتالي تزيد من سميته (1). تزداد فعالية مضادات التخثر الفموية باستعمال الكينين (1).

4. الأدوية المضادة للتغيروسات

1. المضادات لفيروس الحلأ:

الأسيكلوفير Aciclovir: السمية الكلوية الملاحظة عند استعمال جرعات قوية من هذا الدواء عن طريق الوريد يمكن أن تزداد في حال مرافقته بأدوية أخرى حاملة لسمية كلوية.

الفوسكارنيه Foscarnet: مرافقته مع البنتاميدين عن طريق الحقن غير منصوح به وذلك لاحتمال حدوث نقص خطر لكس الدم (1). هناك مضاد استطباب لاستعماله مع أي دواء سام للكلية وخاصة المضادات الإنتانية، أو في حالة الضرورة القصوى فإنه يجب مراقبة الوظيفة الكلوية بشكل صارم (1).

الجانسيكلوفير Ganciclovir: مرافقته مع الديدانوزين يمكن أن تؤدي إلى زيادة الآثار الجانبية لهذا الأخير وذلك لزيادة تركيزه الدموي، وإنقاص فعالية الجانسيكلوفير وذلك لنقص تركيزه الدموي (2). مرافقته مع الزيدونودين يمكن أن يزيد من السمية الدموية (1).

الفيدارابين Vidarabine: احتمال حصول اضطرابات عصبية بمرافقته مع الألوبورينول (2).

2. الأدوية المضادة للفيروس القهقري Antiretroviraux:

2. 1 المثبطات النوكليوزيدية لقالب الترانسكريبتاز (جدول 1):

الديدانوزين: الأدوية التي ينقص امتصاصها الهضمي بمرافقتها مع الديدانوزين مثل الأدوية الأزولية، التيتراسيكلينات والكينولونات يجب أن تعطى قبل ساعتين أو بعد 6 ساعات من إعطاء الديدانوزين. هذا ولم تعد هذه الحماية ضرورية بظهور حبوب الديدانوزين المقاومة للهضم. المرافقة ما بين الديدانوزين والأدوية المسؤولة عن اعتلال الأعصاب المحيطية أو عن التهاب البنكرياس يجب تجنبها أو مراقبتها بصرامة (1).

الزالسيتابين: مرافقة هذا الدواء مع الأدوية المسؤولة عن اعتلالات الأعصاب المحيطية يجب تجنبها أو مراقبتها بانتباه وخاصة الديدانوزين، الدابسون، الإيزونيازيد، الميترونيدازول (1).

الزيدوفودين: يطرح هذا الدواء عن طريق الكبد بصورة أساسية. وهكذا فإن الأدوية ذات الطرح الكبدي يمكن أن تثبط استقلاب الزيدوفودين وبالتالي تزيد من سميته الدموية بشكل خاص. مرافقة الزيدوفودين بالأدوية ذات السمية الدموية يجب تجنبها أو مراقبتها بانتباه (1). هذا وهناك مضاد استطباب لمرافقته مع الستافودين.

اللاميفودين: احتمال حصول تداخل في التفاعلات الدوائية مع اللاميفودين ضعيفة.

الستافودين: من الممكن حصول تنافس ما بين هذا الدواء والأدوية المطروحة عن نفس الطريق (الكوي). مما يبرر زيادة المراقبة في هذه الحالة. هذا ويوجد مضاد استطباب لمرافقته مع الزيدوفودين.

الأباكافير: احتمال حصول تداخل في التفاعلات الدوائية ما بين الأباكافير والأدوية المستقلبة بواسطة السيوكروم p₄₅₀ ضعيفة. تناول الإيتانول بنفس الوقت يزيد التعرض للأباكافير بنسبة 40%.

2. 2 المثبطات الغير نوكلوزيدية لقالب الترانسكريبتاز (جدول 2):

إيفافيرنيز Efavirnez: هذا الدواء حاث للسيتوكرومات الكبدية (CyP_{3A4}).
 النيفيرابين Nevirapine: هذا الدواء حاث أيضاً للسيتوكرومات الكبدية (CyP_{3A4}).

2. 3 مضادات البروتياز (جدول 3):

تستقلب مضادات البروتياز بواسطة السيتوكرومات الكبدية P₄₅₀ (CyP_{3A4})، كما أن بعضها مثل الريتونافير تكون مثبطة لهذه السيتوكرومات نفسها. لذلك يجب اتخاذ احتياطات معينة عند مرافقة هذه الأدوية مع أدوية أخرى حاثّة لهذه السيتوكرومات أو مستقبلة من قبلها. التداخل في التفاعلات الدوائية يكون مرتبط هنا باضطرابات الاستقلاب الكبدي للأدوية المرافقة مما يؤدي إلى احتمال ارتفاع تركيزها وزيادة سميتها وبنفس الوقت إلى إنقاص فعالية مضادات البروتياز.

3. مضادات فيروسية أخرى:

3. 1 ريبافيرين:

مضادات الحموضة (Mg، أمونيوم، سيميكتيكون) تنقص بشكل خفيف الامتصاص الهضمي للريبافيرين (انعكاساته السريرية قليلة). يثبط الريبافيرين في الزجاج فسفرة الزيدوفودين والاستافودين مما يؤدي إلى زيادة التنسخ للـ VIH عند الأشخاص المصابين بنفس الوقت بالـ VIH والتهاب الكبد الإنتاني C، والمعالجين بالوقت نفسه أيضاً بهذه الأدوية. هذه المرافقة الدوائية يجب مراقبتها.

3. 2 الأنتيرفيرون ألفا 27 و 2b:

إعطائه بنفس الوقت مع الأدوية المهدئة أو المنومة غير منصوح به (2)، ولذلك فمن غير المنصوح مرافقته مع المثبطات النخاعية أو الأدوية السامة للخلايا (زيادة في آثارها الجانبية) أو مع مشتقات الكزانثين (تيوفيللين أو أمينوفيللين) (نقص تركيزها الدموي).

جدول 2 - التداخل في المفعول الدوائي مع مثبطات قالب الترانسكربتاز
والذي بإمكانه إنقاص فعالية مضادات الفيروس القهقري
أو دواء آخر أو زيادة الآثار الجانبية الضارة

مضاد الفيروس القهقري	الخطر	مرافقة دوائية	مرافقة	مرافقة يجب استئصالها مع اتخاذ احتياطات
الزيدوفودين	إنقاص الفعالية	ستافودين (B)	غير منصوح بها	ريفايرين (I، D) كاربامازيبين (G) فينوباربیتال (G) فينيتوين (G) ريفامبيسين (G) أمفوتريسين B (K) مثبتات الخلايا (K) دابسون (K) فلوسيتوزين (K) جانسيكلوفير (K) بيريميتامين (J)
الديداوزين	إنقاص الفعالية	جانسيكلوفير (C)		دابسون (A) أنينافير (A) إيتراكونازول (A) كينولونازول (A) بيريميتامين (A) كينولون (A) ريتونافير (A) تيتراسيكلين (A) تاليدوميد (I) ريفايرين (K)
الزالتسيتابين	إنقاص الفعالية	لاميدوفين (B)	ديداوزين (I) ستافودين (I)	مضاد حموضة موضعي بنتاميدين (وريدي) (I) تاليدوميد (I)
اللاميدوفين	إنقاص الفعالية	زالتسيتابين (B)		تريميثوبريم (L)
الستافودين	إنقاص الفعالية	زيدوفودين (B)	توكسوروبيسين (F) زالتسيتابين (I)	ريفايرين (B) بنتاميدين (وريدي) (I) تاليدوميد (I)
	↑ آثار جانبية غير مرغوب بها			

مضاد الفيروس	الخطر	مرافقة دوائية	مرافقة	مرافقة يجب استعمالها
أباكافير	انخفاض الفعالية	مضاد استقلابها	غير منصوح بها	مع اتخاذ احتياطات
النيفيرابين	↑ آثار غير مرغوب بها	ساكنافير (N)	إيتينيل إيستراديول (N) أندينايفير (G) ريفامبيسين (G) حاثات أخرى	الإيتانول (K)
الإيفافيرينيز	↑ آثار غير مرغوب بها	كيتوكونازول (N)	ساكنافير (N)	أندينايفير (N) ميتادون (G) ريفامبيسين (G) ريفابوتين (G) حاثات أخرى
	↑ آثار غير مرغوب بها	أستيميزول (N) سيزابريد (N) ميدازولام (N) تريازولام (N)	إيتنيل - أسترايول (K)	ريبنافير (N)

* آليات التداخل في المفعول الدوائي:

- (A) انخفاض الامتصاص.
 (B) تنافس من أجل الفسفرة.
 (C) انخفاض التركيز (آلية غير محددة).
 (D) انخفاض الفعالية داخل الزجاج (آلية غير محددة).
 (E) تثبيط الفعالية.
 (F) تثبيط الفعالية.
 (G) حث السيوكروم P₄₅₀ أو سيوكروم الترافق (N) تثبيط السيوكروم P₄₅₀.
 (Conjugaison).

* الاحتياطات الواجب اتخاذها يمكن أن تكون:

- مراقبة زائدة للآثار الجانبية.
- مراقبة التركيز المصلي لأحد هذه الأدوية.
- احتمال تغيير لأحد الجرعات.
- تغيير أوقات أخذ الأدوية.

جدول 3 - التداخل في المفعول الدوائي مع مثبطات البروتياز والذي بإمكانه
إنقاص الفعالية الدوائية (لمضادات الفيروس القهقري أو لدواء آخر)
أو زيادة الآثار الجانبية الضارة

مضاد الفيروس القهقري	الخطر	مرافقة دوائية	مرافقة دوائية	مرافقة يجب استعمالها مع اتخاذ احتياطات
الساكنافير	إنقاص للفعالية	كاربامازيبين (G)	مضاد استطبابها	يجب تجنبها
		فينوباربيتال (G)		
		إيفافيرينز (G)		
		نيفيرابين (G)		
		فينيتوين (G)		
		بريميدون (G)		
		ريفامبسين (G)		
		ريفابوتين (G)		
	↑ آثار جانبية	سيزابريد (N)		ميدازولام (N)
	غير مرغوب بها			تريازولام (N)
				سيلدينافيل (N)
الإيندينافير	إنقاص الفعالية	ريفامبسين (G)		مضادات حموضة (A)
				جيدانوزين (A)
				كاربامازيبين (A)
				مثبطات مضخة البروتون (A)
				إيفافيرينز (G)
				نيفيرابين (G)
				ريفابوتين (G)
				فينوباربيتال (G)
				فينيتوين (G)
				بريميدون (G)
	↑ آثار غير مرغوب بها	نيهدروإيجوتامين (N)		إيتركونازول (N)
		سيزابريد (N)		كيوتكونازول (N)
		إيرغوتامين (N)		ريفابوتين (N)
				ألبرازولام (N)
				ميدازولام (N)
				تريازولام (N)
				نيليفيتاير (N)
				سيلدينافيل (N)
التيليفيتاير	إنقاص الفعالية	ريفامبسين (G)		ريفابوتين (G)

الفصل 40: المضادات الإنتانية وتداخلات تفاعلات الأدوية 349

مضاد الفيروس القهقري	الخطر	مرافقة دوائية مضاد استطبابها	مرافقة دوائية يجب تجنبها	مرافقة يجب استعمالها مع اتخاذ احتياطات
		إيتينيل إيستراديول (N) كاربامازيبين (G)	ميتادون (G)	فينوباربیتال (G) فينيتوين (G) بريميون (G)
	↑ آثار غير مرغوب بها	سيزابريد (N) ديهيدرو إرجوتامين (N) إيرجوتامين (N)	أندينافير (N) ريفابوتين (N) ريتونافير (N) ألبرازولام (N) ميدازولام (N) تريازولام (N) سيلدينافيل (N)	
الريتونافير	إنقاص الفعالية	إيتنيل إيستراديول	ديدالوزين (C) ميتادون (G) تيوفيلين (G)	
الليونافير الريتونافير	↑ آثار غير مرغوب بها	أمبودارون (H) سيزابريد (N) ديهيدرو إرجوتامين (N) إيرجوتامين (N) بموزيد (N) ريفامبسين (N)	أستيميزول (N) ريفابوتين (N) ميدازولام (N) تريازولام (N)	كلارتيروميسين (N) ديزيرامين (N) نيلفينافير (N) سيلدينافيل (N) ليفافيرنيز (N)
الأمبرينافير	إنقاص الفعالية	ريفامبسين (N)	كاربامازيبين (N) فينوباربیتال (G) فينيتوين (G) بريميون (N) ريفابوتين (N)	
	↑ آثار غير مرغوب بها	أستيميزول (N) سيزابريد (N) ديهيدرو إرجوتامين (N) إيرجوتامين (N)	ميدازولام (N) تريازولام (N) ديازيبام (N)	ريفابوتين (N) سيلدينافيل (N)

41. الصادات الحيوية والمضادات الفيروسية

ملاحظة: د: تصغير لداخل العضل دو: تصغير لداخل الوريد ط ف: تصغير لعن طريق الفم

الاسم العلمي	المستحضرات التجارية	طريق الإعطاء وعدد المرات	الجرعة للبالغ/يوم	الجرعة للطفل/يوم
البينسلالين: بنيسيلينينات G و V				
- بنيسيللين G	Penicilline G	دع - دو: 4 مرات/يوم محقن كهرباتي لمدة 4 ساء: 6 مرات/يوم بالنسبة للجرعات المرتفعة	1 - 50 مليون وحدة حسب الحالة	50 - 150000 وحدة/كغ 20 مليون وحدة/يوم كحد أعظمي
- بنيسيللين V	Oracilline	ط ف: 3 - 4 مرات/يوم	2 - 4 مليون وحدة	100 - 200 ألف وحدة/كغ
Ospen				
- مرافقة عدة أنماط	Bipenicilline	دع: 2 مرة/يوم	2 - 4 مليون وحدة	-
من البنيسيللين G	Bielinocilline	دع: 1 - 2 مرة/يوم	1 - 2 مليون وحدة	-
(متوسطة وطويلة المفعول)	Bielinocilline	دع: مرة واحدة/4 أيام	1 - 2 مليون وحدة	-
- بنزاثين	Extencilline	دع	1.2 - 2.4 مليون وحدة/15 يوماً	0.6 - 1.2 مليون وحدة/15 يوماً
بنيسيللين (مفعول طويل المدى)				
أليبتا لاكتامينينات: الأامينو بنيسيللينينات، البنيسيللينينات فئة A				
- أمبيسيللين	Totapen	دع، دو، ط ف 3 - 4 مرات/يوم	2 - 12 غ	50 - 350 مغ/كغ
- مشتقات الأمبيسيللين	Pro-ampiv	ط ف: 2 - 3 مرات/يوم	1 - 3 غ	50 - 100 مغ/كغ
بيغامبيسيللين	Penglobe	ط ف: 2 مرة/يوم	0.8 - 1.2 غ	25 - 50 مغ/كغ
باكامبيسيللين	Bacampicine	ط ف: 2 مرة/يوم	0.8 - 1.2 غ	25 - 50 مغ/كغ
- أموكسيسيللين	Clamoxyl	ط ف، دع، دو 2 - 4 مرات/يوم ط ف 3 - 4 مرات/يوم د	2 - 12 غ	50 - 200 مغ/كغ

الفصل 41: الصادات الحيوية والمضادات الفيروسية 351

الاسم العلمي	المستحضرات التجارية	طريق الإعطاء وعدد المرات	الجرعة للبالغ/يوم	الجرعة للطفل/يوم
- بيفامبسيلينام	Sélexid	ط ف 3 - 4 مرات/يوم	600 - 800 مغ	
البيتا لآكتامينات: البنيسيلينات فئة M				
- أوكساسيلين	Bristopen	دع - دو - ط ف 3 - 4 مرات/يوم	200 - 350 مغ/كغ	100 - 150 مغ/كغ
- كلوكساسيلين	Orbenine	دع - دو - ط ف 3 - 4 مرات/يوم	150 - 200 مغ/كغ	100 مغ/كغ
البيتا لآكتامينات: أورييدوبنيسيلين				
ميزلوسيلين	Baypen	دو: 3 مرات/يوم	150 - 250 مغ/يوم	200 مغ/كغ
بيبيراسيلين	Pipérilline	دو: 3 مرات/يوم	200 مغ/كغ	200 - 250 مغ/كغ
البيتا لآكتامينات: كاربوكسينيسيلين				
تيكارسيلين	Ticarpen	دو: 3 مرات/يوم	250 مغ/كغ	3 حقن 70 - 100 مغ/كغ
بيتا لآكتامينات + مثبطات البيتا لآكتاماز				
حمض الكلافولينيك + أموكسيسيلين (كو - أموكسيكلاف)	Augmentin	ط ف: 2 - 4 مرات/يوم دو: ببطء أو حقن دائم (بمقنة 4 - 12 غ كهربائية)	1.2 - 2 غ	40 - 80 مغ/كغ حمض الكلافولينيك > 15 مغ/كغ 100 - 200 مغ
حمض الكلافولينيك	Ciblor	ط ف: 3 - 4 مرات/يوم	Augmentin	Augmentin الـ 225/15
+ تيكارسيلين	Claventin	نو: 3 - 4 مرات/يوم	12 - 15 غ	
سولباكتام + أميسيلين	Unacim	دع: 2/يوم نو: 2 - 4 مرات/يوم	1 - 1.5 غ	
تازوباكتام	Tazocilline	نو: 3 حقن مستمرة/يوم	من 1.5/12 غ	طفل < 12 سنة
+ بيبيراسيلين				
بيتا لآكتامينات: كارباينيم				
تيناميسين	Tiénam	نو: 3 - 4 مرات/يوم	1.5 - 4 غ	طفل > 40 كغ
أو إيميبينيم -		دع: 2 مرة/يوم	1 - 1.5 غ	60 مغ/كغ

الاسم العلمي	المستحضرات التجارية	طريق الإعطاء وعدد المرات	الجرعة للبالغ/يوم	الجرعة للطفل/يوم
كليتساتين				
ميروبينيم	Meronem	نو - د: 3 - 4 مرات/يوم	4 - 1.5 غ	60 مغ/كغ
بيتالاکتامينات: مونوباکتام				
أزتریونام	Azactam	دع - دو: 3 مرات/يوم	8 - 3 غ	30 - 50 مغ/كغ
بيتالاکتامينات: سيفالوسبورينات وسيفاميسينات				
C1G: سيفالوسبورينات الجيل الأول				
سيفاكلور	Alfatil	ط ف: 2 - 3/يوم	1.5 - 0.75 غ	20 - 40 مغ/كغ
	Alfatil LP	ط ف: 2 مرة/يوم	1 - 0.75 غ	
سيفادروكسيل	Oracéfâl	ط ف: 2 مرة/يوم	2 غ	50 مغ/كغ
سيفاليسين	Kéforal	ط ف: 3 - 4 مرة/يوم	4 - 1 غ	50 - 100 مغ/كغ
	Céporèxène			
سيفالوثين	Céfalorine	دع، دو: 3 - 4 مرة/يوم	8 - 2 غ	50 - 150 مغ/كغ
	Kéfline			
سيفابيرين	Céfaloject	دع، دو: 3 - 4 مرة/يوم	6 - 2 غ	50 - 100 مغ/كغ
سيفاتريزين	Céfaperos	ط ف: 2/يوم	1 غ	15 - 35 مغ/كغ
سيفازولين	Kefzol, Céfacidal	دع، دو: 2 - 3/يوم		
	Céfazoline	ط ف: 3 - 2/يوم		
سيفرادين	Kelsef	ط ف: 3 - 4/يوم	2 غ	50 - 100 مغ/كغ
C2G: سيفالوسبورينات الجيل الثاني				
سيفاماندول	Kéfandol	دع - دو: 3 - 4/يوم	6 - 3 غ	50 مغ/كغ
سيفوروكسيم	Zinnat	دع - دو: 3 - 4/يوم	6 - 2 غ	30 - 60 مغ/كغ
سيفوروكسيم	Zinnat	ط ف: 2/يوم	500 مغ - 1 غ	20 مغ/كغ
لكسيتيل	Cépazine			
سيفاميسينات				
سيفوتيتان	Apacéf	دع، دو: 2 - 3/يوم	4 - 2 غ	-
سيفوكسيتين	Méfoxin	دع، دو: 3 - 4/يوم	6 - 3 غ	
C3G: سيفالوسبورينات الجيل الثالث				
سيفوتاكسيم	Claforan	دع، دو: 3 - 4/يوم	12 - 2 غ	50 - 300 مغ/كغ
سيفوتيام	Takétiam	دع، دو: 3 - 4/يوم	2 - 1 غ	50 - 100 مغ/كغ
سيفتازيديم	Fortum	دع، دو: 3/يوم	6 - 3 غ	50 - 100 مغ/كغ
سيفتيزوكسيم	Céfizox	دع، دو: 3 - 4/يوم	4 - 2 غ	50 - 100 مغ/كغ

353 الفصل 41: الصادات الحيوية والمضادات الفيروسية

الاسم العلمي	المستحضرات التجارية	طريق الإعطاء وعدد المرات	الجرعة للبالغ/يوم	الجرعة للطفل/يوم
سيفتر ياكسون	Rocéphine	دع: نو: 1/يوم	2 - 1 غ	50 - 100 مغ/كغ
سيفيبيم	Axépim	نو: 2 - 3/يوم	6 - 2 غ	-
سيفيبروم	Céfrom	نو: 2/يوم	4 - 2 غ	-
C3G: قموية				
سيفيكسيم	Oroken	ط ف: 2/يوم	400 مغ	8 مغ/كغ
سيفيدوكسيم	Orélox	ط ف: 2/يوم	400 - 200 مغ	8 مغ/كغ
- بروكستيل				
سيفوتيام هيكتيتيل	Takétiam, Texodil	ط ف: 2/يوم	400 مغ	
أمينوزيدات مستعملة حصراً بشكل موضعي				
باروميسين	Humagel	ط ف: 3 - 4/يوم	50 مغ/كغ	
نيوميسين	Néomycine	موضعي وط ف 4	ط ف: 1 - 2 غ	ط ف: 30 - 50 مغ/كغ
أمينوزيدات مستعملة عن طريق العضل أو الوريد (يفضل إعطاء جرعة وحيدة يومية إلا في حالة التهاب شغاف القلب الإنتاني والإنتانات العائدة للمكورات المعوية حيث لن إعطاء جرعتين ما زال مفضلاً)				
أميكاسين	Amiklin	دع - نو: 1/يوم	15 - 25 مغ/كغ	
ديبيكاسين	Débécacyl	دع - نو: 1/يوم	2 - 3 مغ/كغ	
جنتاميسين	Gentalline	دع - نو: 1/يوم	3 - 6 مغ/كغ	
إيزياميسين	Isépalline	دع - نو: 1/يوم	15 - 25 مغ/كغ	
كاناميسين	Kanycine	دع - نو: 2/يوم	15 - 25 مغ/كغ	
نيتيلميسين	Nétromicine	نو - دع: 1/يوم	4 - 8 مغ/كغ	
سيكتينو ميسين	Trobicine	دع: 1/يوم	2 - 4 مغ مرة واحدة (للمكورات البنية)	
ستريبتوميسين	Streptomycine	دع: 1/يوم موضعياً	25 - 50 مغ/كغ	
توبراميسين	Nebcine	نو - دع: 1/يوم	3 - 6 مغ/كغ	
السيكلينات الجيل الأول				
نيترو أميكالين	Hexacycline, Tétracycline	ط ف: 2 - 4/يوم	1.5 - 2 غ	8 سنوات: 50 مغ/كغ
أوكسيتيترو أسيكالين	Tetra Soluretard	دع: 1/يوم	500 - 250 مغ	8 سنوات: 125 - 250 مغ/كغ
الجيل الثاني				

الاسم العلمي	المستحضرات التجارية	طريق الإعطاء وعدد المرات	الجرعة للبالغ/يوم	الجرعة للطفل/يوم
ليميسيكالين	Tetralysal	ط ف: 2/يوم	600 مغ	
ميتاسيكالين	Physiomycine	ط ف: 2/يوم	600 مغ	< 8 سنوات: 7.5 - 15 مغ/كغ
الجيل الثالث				
دوكسيسيكالين	Vibramycine	ط ف: 1 - 2/يوم	200 مغ	< 8 سنوات: 4 مغ/كغ
	متعددة			
	Vibraveineuse	نو: حقنة متواصلة 1	200 مغ	< 8 سنوات: 4 مغ/كغ
مينوسيكالين	Mynocine	ط ف: 1/يوم	200 مغ/كغ	< 8 سنوات: 4 مغ/كغ
الماكروليدات الحقيقية				
إريثروميسين	Ery 125, 250, 500 Erythrocline 500, 1000	ط ف: 3/يوم	25 - 50 مغ/كغ	25 - 50 مغ/كغ
	Logécine-Abboticine Erythrogram Eryloci, Propiocine			
إريثروميسين + سلفافورازول	Pédiazole	ط ف: 3/يوم	2 - 3 غ	20 - 40 مغ/كغ
إريثروميسين (لاكتوبونات)	Erythrocline IV	نو: 3/يوم	2 - 3 غ	20 - 40 مغ/كغ
سبيراميسين	Rovamycine	ط ف - نو: 2 - 3	6 - 9 مليون وحدة	1.5 - 3 مليون وحدة/10 كغ
سبيراميسين + ميترونيدازول	Rodogyl	ط ف: 2 - 3/يوم	3 - 4.5 مليون وحدة	1.5 مليون وحدة/10 كغ
ميديكاميسين	Mosil	ط ف: 3/يوم	50 مغ/كغ	
جوزاميسين	Josacine	ط ف: 2/يوم	1 - 2 غ	50 مغ/كغ
روكسيتروميسين	Claramid, Rulid	ط ف: 2/يوم	300 مغ/كغ	5 - 8 مغ/كغ
كلاريتر و ميسين	Zéclar, Naxy	ط ف: 2/يوم	0.5 - 1 غ	15 مغ/كغ
ديريتر و ميسين	Dynabac	ط ف: 1/يوم	500 مغ	-
أزيثروميسين	Zithromax	ط ف: 1/يوم	250 مغ (يوم 1 - 500 مغ)	-
	Azadoze	ط ف: 1/أسبوع	1200 مغ	
	Zithromax monodose	ط ف: جرعة وحيدة	1 غ	

الماكروليدات الممنوعة:

ستربتوغرامين

355 الفصل 41: الصادات الحيوية والمضادات الفيروسية

الاسم العلمي	المستحضرات التجارية	طريق الإعطاء وعدد المرات	الجرعة للبالغ/يوم	الجرعة للطفل/يوم
بريستيناميسين	Pyostacine	ط ف: 2 - 3/يوم	2 - 3 غ	50 - 100 مغ/كغ
كينريستين	Synercid	نو: 3/يوم	22.5 مغ/كغ	-
+ دالفوربريستين				
لينكو ساميد				
لينكوميسين	Lincocine	ط ف: 3/يوم	20 - 40 مغ/كغ	25 - 50 مغ/كغ
		دع، نو: 3/يوم	10 - 30 مغ/كغ	10 - 20 مغ/كغ
كلينداميسين	Dalacine	ط ف: 3/يوم	20 - 40 مغ/كغ	25 - 50 مغ/كغ
		دع، نو: 3/يوم	10 - 30 مغ/كغ	10 - 20 مغ/كغ
		ط ف: 3 - 4/يوم	10 - 40 مغ/كغ	8 - 25 مغ/كغ
		دع: 2/يوم	≤ 600 مغ/حقنة	-
		نو: 2 - 4/يوم	10 - 40 مغ/كغ	15 - 40 مغ/كغ
		لا يوجد حقن نو مباشر		
كيتوليد			800 مغ	-
تيليتروميسين	Ketec	ط ف		
الفيثيكولات				
تيامفينيكول	Thiophénicol	دع - نو - ط ف: 3 - 1.5 - 3	3 غ	30 - 100 مغ/كغ
		يوم		
ريفاميسينات				
ريفاميسين	Rimactan « Rifadine	ط ف، نو: 1 - 2/يوم	10 - 30 مغ/كغ	10 - 30 مغ/كغ
ريفابوتين	Ansatiptine	ط ف: 2/يوم	300 مغ	
الكينولونات البولية				
حمض الناليديكسيك	Négram	ط ف: 2/يوم	30 مغ/كغ	30 مغ/كغ
حمض الأوكسولينيك	Urotrate	ط ف: 2/يوم	25 مغ/كغ	-
حمض البيبيميدك	Pipram	ط ف: 2/يوم	800 مغ	-
فلوميكين	Apirone	ط ف: 3/يوم	1200 مغ	-
نورفلوكساسين	Noroxine	ط ف: 2/يوم	800 مغ	-
روزوكساسين	Eracine	ط ف: 1/يوم	300 مغ (مكررات - بنية)	-
إينوكساسين	Enoxoz	ط ف: 2/يوم	400 - 800 مغ	-
الكينولونات الجهازية				
بيفلوكساسين	Péflacine	ط ف - نو: 2/يوم	800 مغ	
	Péflacine monodose	جرعة واحدة	800 مغ	
أفلوكساسين	Oflozet	ط ف - نو: 2/يوم	400 - 800 مغ	لا تعطى للطفل

الاسم العلمي	المستحضرات التجارية	طريق الإعطاء وعدد المرات	الجرعة للبالغ/يوم	الجرعة للطفل/يوم
سيبروفلوكساسين	Monoflocet Ciflox	جرعة وحيدة طف: 2/يوم نو: 2 - 3/يوم	1.5 - 1 غ 400 مغ - 1200	أقل من 15 عاما
لوميفلوكساسين	Uniflox Logiflox	جرعة وحيدة/يوم طف: 1/يوم	500 مغ 400 مغ	
ليفوفلوكساسين	Tavenic	طف - نو: 1 - 2/يوم	500 - 1000 مغ	
موكسيفلوكساسين	IziloX	طف	400 مغ	
بوليميكسين E	Clinomycine	طف: 3 - 4/يوم دع - نو: 2 - 3/يوم	0.1 - 0.25 مليون وحدة/كغ 0.05 - 0.1 مليون وحدة/كغ	0.1 - 0.25 مليون وحدة/كغ
بوليميكسين B	Fucidine	موضعية: قطرات، نقط أذنية، بيوض، دهانات جلدية طف - نو: 2 - 3/يوم	1.5 - 1 غ	30 - 60 مغ/كغ
حمض الفوسيديك	Fosfocine	نو: 3 حقن متواصلة 4 سا/يوم طف: 1/يوم	200 - 100 مغ/كغ 3 غ	200 - 100 مغ/كغ
فوسفومييسين	Uridoz, Monuril	نو: 3 حقن متواصلة 4 سا/يوم طف: 1/يوم	200 - 100 مغ/كغ 3 غ	200 - 100 مغ/كغ
فوسفومييسين - تروميثامول				
فانكوميسين	Vancocine Vancomycine	نو: 3/يوم أو حقن مستمر دع - نو: 1/يوم	30 مغ/كغ	20 - 60 مغ/كغ
تيكوبلاتين	Targocid	دع - نو: 1/يوم	6 مغ/كغ/12 سا خلال 1 - 4 أيام ومن ثم 6 - 12 مغ/كغ/يوم	10 - 12 مغ/كغ/سا سا خلال 2 - 4 أيام ومن ثم 10 مغ/كغ
السلفاميدات والسلفاميدات المرافقة				
سلفاديازين	Adiazine	طف: 4 - 6/يوم	100 مغ/كغ	150 مغ/كغ
سلفاميتزول	Rufol	طف: 4/يوم	600 مغ	-
سلفاسالازين	Salazopyrine	طف: 3 - 6/يوم	4 - 6 غ	-

الفصل 41: الصادات الحيوية والمضادات الفيروسية 357

الاسم العلمي	المستحضرات التجارية	طريق الإعطاء وعدد المرات	الجرعة للبالغ/يوم	الجرعة للطفل/يوم
سلفاميتروكسازول + تريمتوبريم	Bactrim	ط ف: 2/يوم	2 - 4 حبات	6/30 مغ/كغ
تريمتوبريم (كوتريموكسازول)	Bactrimfort Eusaprim Eusaprim forte	دع - نو: 2/يوم ط ف: 2/يوم	2 - 4 حقن/يوم 2 حبة/يوم	3.2/16 مغ/كغ
سلفادوكسين + بيريميتامين (المالريا)	Bactekod Fancidor	ط ف - نو - دع مرة واحدة/8 أيام	2 - 3 حبات أو حقنتين	½ - 2 حبة أو 1.4 - 1.5 حبة
تريمتوبريم النيتروفلورانات	Wellcoprim	ط ف: 1/يوم	300 مغ	-
نيتروفلورانتوين	Furadantine Microdoïne Furadoïne	ط ف: 3/يوم	150 مغ	حبة واحدة/10 كغ
نيفورزيد	Ricridène	ط ف: 3/يوم	450 مغ	10 مغ/كغ
نيفوروكسازيد الكينولينات	Ercéfuryl متعددة	ط ف: 4/يوم	800 مغ	200 - 800 مغ
تيلكيتول + تيروكيتول	Intétrix	ط ف: 3/يوم	4 - 6 كبسولات	
تيروكيتول	Intétrix pédiatrique	ط ف: 3/يوم		ملعقتين/5 كغ
نيتروكسونيل	Nibiol Nibiol suspension	ط ف: 3/يوم	300 - 600 مغ	ملعقتين/5 كغ
5 - نيتروإيميدازولات				
ميترونيدازول	Flagyl	ط ف: 3/يوم	1 - 2 غ	30 مغ/كغ
		حقن مستمر نو: 3/يوم	1.5 - 2 غ	30 مغ/كغ
		بيوض 1/يوم	500 مغ	
أونيدازول	Tiberal	ط ف: 2 - 3/يوم	1 - 1.5 غ	30 مغ/كغ
		حقن مستمر نو:	1 - 1.5 غ	20 - 30 مغ/كغ
تيفيدازول	Fasigyne	1 - 2/يوم		
سيكنيدازول	Flagentyl	ط ف: 1/يوم	1.5 - 2 غ	50 - 70 مغ/كغ
نيمورازول	Naxogyn	ط ف: 1/يوم	2 غ	30 مغ/كغ
المضادات السلية ذات الخيار الأول				
إيزونيازيد	Rinifon, INH	ط ف - نو: 1/يوم	5 مغ/كغ	10 - 15 مغ/كغ
ريفامبيسين	Rimactan	ط ف - نو: 1/يوم	10 مغ/كغ	10 - 30 مغ/كغ

الاسم العلمي	المستحضرات التجارية	طريق الإعطاء وعدد المرات	الجرعة للبالغ/يوم	الجرعة للطفل/يوم
	Rifadine			
بيرازيناميد	Pirilène	طف: 1/يوم	1.5 - 2 غ	20 - 30 مغ/كغ
إيتامبوتول	Dexambutol	طف - دو: 1/يوم	10 - 20 مغ/كغ	10 - 20 مغ/كغ
	Myambutol			
ترافقات دوائية	Rifacter	طف	حبة واحدة/12 كغ	
	Rifinah	طف	حبة واحدة/30 كغ	
الأوكساسوليدينون				
ليينزوايد	Zyvoxid	طف - دو: 2/يوم	600 مغ × 2	

المضادات الفيروسية المضادة للـ VIH

الآثار الجانبية الأساسية	الجرعة وعدد مرات الإعطاء	المبيطات النوكليوزيدية لقالب الترانسكريبتاز
نقص كريات بيض، غثيان، التهاب البنكرياس، إسهال	250 مغ غثيان، التهاب البنكرياس، إسهال	الزيدوفودين (AZT أو Retrovir) 600 مغ/يوم 2 مرة ديداتوزين Videx أو JJI 400 مغ/يوم (إذا > 60 كغ: 250 مغ غثيان، التهاب البنكرياس، إسهال) جرعة واحدة
تقرحات فموية	اعتلال عصبي، تقرحات فموية	زاسيتابين (Hivid أو JJC) 2.25 مغ/يوم 3 مرات (إذا > 40 كغ) 1.125 مغ 3 مرات/يوم
تحمل جيد	300 مغ/يوم، 2 مرة	لاميفودين (3TC أو Epivir) 300 مغ/يوم، 2 مرة
اعتلال عصبي	80 مغ/يوم (إذا > 60 كغ: 60 مغ/يوم)	ستافودين (J4T أو Zérit) 80 مغ/يوم (إذا > 60 كغ: 60 مغ/يوم)
فرط تحسس (4%) مما يشكل مضاد استطباب مطلق لإعادة استعماله	600 مغ/يوم 1 - 2 مرة	أباكافير (ABC أو Ziagen) 600 مغ/يوم 1 - 2 مرة
الأثار الخاصة بالـ AZT أو بالـ 3TC		كومبيفير (AZT 300 مغ + 3TC حبة واحدة × 2/يوم 150 مغ) تريزيفير (AZT 300mg + 3TC حبة واحدة × 2/يوم 300mg + abacavir 150mg) تيدوفوفير (Viread) 30 مغ/يوم
نفسها الخاصة بالـ AZT، 3TC، والـ ABC		المبيطات الغير نوكليوزيدية لقالب الترانسكريبتاز
تحمل جيد		نيفيرابين (Viramune) 200 مغ × 1/يوم خلال 14 يوماً ومن ثم 200 مغ × 2/يوم
		يفافير نير (Sustiva) 600 مغ/يوم جرعة واحدة
		ديلافيردين (Rescriptor) 1200 مغ/يوم 3/يوم
		مبيطات البروتياز
غثيان	1800 مغ/يوم 3/يوم	سلكينافير - HGC (Invirase)
غثيان	3600 مغ/يوم 3/يوم	سلكينافير SGC (Fortovase)
اضطرابات هضمية، خدر حول الفم، التهاب كبد، ارتفاع الثري غليسيريدي	1200 مغ/يوم 2/يوم (زيادة الجرعة تدريجياً)	زيتونايفير (Norvir)
حصىات بولية، فرط بيليروبين الدم	2400 مغ/يوم 3/يوم (800 مغ/8 سا)	أندينايفير (Crixivan)
اضطرابات هضمية	2250 مغ/يوم 2 - 3/يوم	فافيافير (Viracept)
اضطرابات هضمية، صداع، خدر	2400 مغ/يوم 2/يوم	أسيرينافير (Agénésase)
	700 مغ × 2/يوم 1400 مغ × 1/يوم 1400 مغ × 2/يوم	Fos-Ampernavir
أو مترافقة مع 200 مغ زيتونايفير		
اضطرابات هضمية، ارتفاع TG	800 + 200 مغ 2/يوم	زيتونايفير + زيتونايفير (Kaletra)
		مبيطات الاتحاد
	حقنة واحدة تحت الجلد كل 12 ما	(Fuséon) T-20

المضادات الفيروسية المضادة لفيروس الحلا

الجرعة اليومية	طريق الإعطاء وعدد المرات	مدة المعالجة (بالأيام)
أسيكلوفير (Zovirax)		
- العقبول، التهاب الدماغ العقبولي		
البالغ	30 - 45 مغ/كغ	دو: 3 مرات/يوم 15 - 21 يوماً
الطفل	1.5 غ/م ²	دو: 3 مرات/يوم 15 - 21 يوماً
- العقبول الولادي	30 مغ/كغ	دو: 3 مرات/يوم 10 - 14 يوماً
- التهاب اللثة واللم البطني		
البالغ	5 مغ/كغ/8 سا	
الطفل < 3 أشهر	250 مغ/م ² /8 سا	
حديث الولادة	20 مغ/كغ/8 سا	
- العقبول التناسلي		
الإنتان الأولي	200 مغ × 5	طف: 5 مرات/يوم 10 أيام
	5 مغ/كغ/8 سا	دو: 3/يوم 5
الإنتان المتكرر	200 مغ × 5	طف: 5/يوم 5
المعالجة الوقائية	400 مغ × 2	طف: 2/يوم أكثر من 6 - 9 أشهر
- العقبول الجلدي		
المخاطي للمريض مثبت	200 - 400 مغ × 5	طف: 5/يوم 10
	5 - 10 مغ/كغ/8 سا	دو: 3/يوم 10
المناعة		
أسيكلوفير (Zovirax): الحماق Varicelle		
حديث الولادة	20 مغ/كغ/7 سا	دو: 3/يوم 7 - 10 أيام
المرأة الحامل	15 مغ/كغ/8 سا	دو: 3/يوم 7 - 10 أيام
طفل مثبت المناعة	250 مغ/م ² /8 سا	دو: 3/يوم 7 - 10 أيام
بالغ مثبت المناعة	15 - 10 مغ/كغ/8 سا	دو: 3/يوم 7 - 10 أيام
بالغ غير مثبت المناعة	15 - 10 مغ/كغ/8 سا	دو: 3/يوم 7 - 10 أيام
ولكن مع وجود توصيات		
حشوية		
أسيكلوفير (Zovirax): داء المنطفة العيني (يجب إعطاء الدواء مبكراً $\geq 48 - 72$ سا)		
بالغ غير مثبت المناعة	800 مغ × 5	طف: 5/يوم 7
بالغ مثبت المناعة	15 - 10 مغ/كغ/8 سا	دو: 3/يوم 7 - 10
فالاسيكلوفير (Zêlitrex): العقبول التناسلي		
الإنتان الأولي	500 مغ × 2	طف: 2/يوم 10 أيام
المتكرر	500 مغ × 2	طف: 1 - 2/يوم 5 أيام
الوقاية من التكرار		

الفصل 41: الصادات الحيوية والمضادات الفيروسية 361

الجرعة اليومية	طريق الإعطاء وعدد المرات	مدة المعالجة (بالأيام)
عند الشخص ذو المناعة 500 مغ	طف: 1/يوم	6 - 9 أشهر
العادية		
عند مثبط المناعة 500 مغ × 2	طف: 2/يوم	6 - 9 أشهر
-- فالاسيكلوفير (Zélitrex): إبتان عائد للـ HSV ₁ (المقاوم للأسيكلوفير)		
التهاب الفم والثلة البدني 15 مغ/كغ	طف، نو: 3/يوم	10 أيام
- فالاسيكلوفير (Zélitrex): داء المنطقة		
بالغ < 50 عاماً عادي 1000 مغ × 3	طف: 3/يوم	7 أيام
المناعة		
داء المنطقة العيني عند 1000 مغ × 3	طف: 3/يوم	7 أيام
بالغ < 50 عاماً غير مثبط المناعة		
- غنسيكلوفير (Cymevan): إبتان عائد لفيروس الانتخال الخلوي العرطل CMV		
المعالجة الهجومية 10 مغ/كغ	نو: 2/يوم	14 - 21 يوماً
معالجة المتابعة ومن ثم 5 مغ/كغ	نو: 1/يوم	غير محدودة
3 غ	طف: 3/يوم	غير محدودة
مضادات فيروسية أخرى	طريق الإعطاء	المدة بالأيام
- فالجاسيكلوفير (Rovavicyt): إبتان عائد لفيروس الانتخال الخلوي العرطل		
المعالجة الهجومية 1800 مغ	طف: 2/يوم	21 يوم
معالجة المتابعة 900 مغ	طف: 1/يوم	غير محدودة
- فوسكارنيه (Foscavir): إبتان عائد لفيروس الانتخال الخلوي العرطل، إبتان بالـ HSV (مقاوم للأسيكلوفير)		
المعالجة الهجومية 180 مغ/كغ	نو: 2/يوم	14 - 21 يوماً
معالجة المتابعة ومن ثم 90 - 120 مغ/كغ	نو: 1/يوم	غير محدودة
- سيندوفوفير (Vistide): إبتان بغيروس الانتخال الخلوي العرطل		
المعالجة الهجومية 5 مغ/كغ	نو: 1/أسبوع	خلال 15 يوماً
ومن ثم معالجة المتابعة	نو	كل 15 يوماً
- ريبافيرين (Virazole)		
إبتان عائد للـ VRS 0.8 - 1.8 مغ/كغ/سا	ضبوب	3 - 7 أيام
حمى لاسا (Fièvre de Jassa)	نو	5 - 7 أيام
-- ريبافيرين (Rebetol)		
التهاب الكبد C 1.2 - 1.8 غ/يوم	طف: 2/يوم	6 - 9 أشهر

الجرعة اليومية	طريق الإعطاء وعدد المرات	مدة المعالجة (بالأيام)
فيروس تنفسي خلوي - فيدارابين (Vira-MP)	0.8 - 1.8 مغ/كغ/سا دع: 2/يوم	3 - 7 أيام
التهاب الكبد الإثنائي المزمن الفعال B	10 مغ/كغ ومن ثم 5 مغ/كغ دع: 2/يوم	5 أيام 20 يوم
- لاميفودين (Zeffix)	3 ملايين وحدة × 3 تحت الجلد	6 - 12 شهراً
التهاب الكبد المزمن الفعال B	10 مغ/يوم	1/أسبوع
- الديفوفير (Prévéron)	ط ف	-
التهاب الكبد المزمن B	10 مغ/يوم	-
- بيج - أنتيرفيرون ألفا (Pegasys و Viraféron Peg)	0.5 - 1 مغ/كغ و 100 مغ × 1/أسبوع تحت الجلد	6 - 12 شهراً
التهاب الكبد المزمن الفعال C	10 مغ/كغ و 100 مغ × 1/أسبوع تحت الجلد	6 - 12 شهراً
مثبط النور أمينيداز (النزلة الوافدة)	ز اناميفير (Relenza) أوسيلتاميفير (Tamiflu)	بختين حب، شراب
ز اناميفير (Relenza)	بختين	5 أيام حسب الاستطباب (وقائي أو علاجي)
أوسيلتاميفير (Tamiflu)	حب، شراب	5 أيام حسب الاستطباب (وقائي أو علاجي)
أمانتادين (Mantadix)	200 مغ/24 سا	8 - 10 أيام**
وقاية من النزلة الوافدة	طف: 1 - 2	4 - 6 أسابيع**

* مرافقة مع الأنتيرفيرون ألفا في حالة النكس.

** 8 - 10 أيام: وقاية داخل العائلة: 4 - 6 أسابيع: وقاية داخل مجمع.

42. الأدوية المضادة للفطور ومعالجة الأمراض الفطرية

من السهل تشخيص الأمراض الفطرية السطحية، والمعالجة الموضعية تكون كافية، والإنذار جيد عادة. في حال التوضع العميق، التشخيص يكون أصعب، واستعمال الأدوية المضادة للفطور عن الطريق العام يكون ضرورياً، كما أن الإنذار الحياتي والوظيفي يكون خطيراً.

1. الأمراض الفطرية المستعصية

وهي تتضمن المبيضات (المبيضات البيض *Candida albicans*) ومبيضات أخرى، أمراض فطرية جلدية (تريكوفايتون سببياً، ميكروسبوروم سببياً، إيبديدروموفيتون سببياً) والأمراض النخالية *Pityrospore* (مالاستيزيا). الأدوية الأساسية المضادة للفطور وذات الاستعمال الموضعي لخصت في الجدول 1.

1. المبيضات *Les candidose*:

المبيضات الفموية تستجيب عادة بشكل جيد على الأدوية الموضعية، ولكنها قد تكون مستعصية عند شخص مثبط المناعة بشكل شديد (أمراض دموية، إلتان عائد للـ VIH غير معالج أو معند على المعالجة بالأدوية المضادة للفيروس القهقري) وتتطلب عندئذ معالجة عن الطريق العام (*Triflucan* أو *Nizoral* عن طريق الفم). المعالجات المديدة أو المتكررة تسهل اصطفاء زمر مقاومة، تسبب النكس وتتطلب بالتالي زيادة الجرعة أو/وتغيير الدواء. التهاب المريء العائد للمبيضات (VIH) أو سبب آخر لتنشيط المناعة الشديد) يعد التهاب اختراقي موضعياً، ويتطلب في بعض الأحيان معالجة هجومية عن طريق العضل أو الوريد في البداية ومن ثم المتابعة بمعالجة عن طريق الفم (إذا كان ذلك ممكناً). إن وجود المبيضات في البراز

جدول 1 - المضادات الفطرية الموضعية والأمراض الفطرية السطحية

الاسم العلمي	الاسم التجاري	المستحضرات التجارية
الإصابة بالمبيضات للجلد، الفم، المهبل		
أدوية موضعية فعالة حصراً على المبيضات داخل الزجاج		
أمفوتريسين	Fungizone	سائل، كبسولات، محلول فموي
نيساتين	Mycostatine	محلول فموي، حبوب نسائية، فموية
الإصابة بالمبيضات للجلد، الفم، المهبل، الأمراض الجلدية الفطرية، النخالية المبرقشة:		
أدوية موضعية واسعة الطيف (مبيضات وفطور جلدية)		
المشتقات الأزولية		
بيفونازول	Amycor	مرهم، سائل، بودرة
	Amycor onychost	مرهم + بولة
	Gynomyk	بيوض
	Pévaryl	مرهم + سائل حليب جلدي، بودرة، سائل
	Gynécoprévaryl	بيوض
فنتيكونازول	Terlomexin , Lomexin	مرهم، كبسولات مهبلية
إيزوكونازول	Fazol	مرهم، خليط، بيوض، بودرة
كينوكونازول	Kétoderm	مرهم، جيلاتين نو رغو
ميكونازول	Daktarin	جيلاتين جلدي، حبوب، سائل، بودرة، جيلاتين فموي
	Gynécodaktarin	كبسولات مهبلية، جيلاتين مهبلية
	Britane	سائل، جيلاتين فموي
سيرتاكونازول	Monazole	مرهم، بيوض
سولكونازول	Myk 1%	مرهم، سائل، بودرة
تيكونازول	Trosyd	مرهم
	Gyno-Trosyd	بيوض
أوموكونازول	Fongamil	مرهم، بودرة، سائل
	Fongarex	بيوض
أوكسيكونازول	Fonx	مرهم، بودرة، سائل
سيكلوبوروكسولامين	Mycoster	مرهم، سائل، دهنة 8%
حمض أوديسيكليتريك	Mycodécyl	مرهم، بودرة، سائل
مشتقات بولية	Bétadine	سائل، بيوض، حبوب نسائية، مرهم
أمراض جلدية فطرية: السعفة الجافة الشعروية، المذح، فطر الأظفار:		
أدوية موضعية فعالة حصراً على الأمراض الجلدية الفطرية		
كريزوفولفين	Griseofulvine	حبوب
أمورولفين	Locéryl	دهنة 5%
تيربينافين	Lamisil	مرهم، حبوب
تولنافينات	Sporiline	سائل، مرهم
النخالية المبرقشة:		
كريبتات السيلينيوم	Selsun	محلول

لا يسمح بتشخيص وجود إنتان لأن المبيضات تُعد كخمائر رُمية في الجهاز الهضمي. التهاب المهبل يتطلب معالجة موضعية، ولكن في حالة التكرار المتعدد (أكثر من 4 - 6 هجمات/سنة)، فإن استعمال أحد الأدوية من المشتقات الأزولية يكون ضرورياً بالإضافة إلى القضاء على الأسباب المؤهبة. الظفر المصاب بالمبيضات يتطلب معالجة بالـ Triflucan عن طريق الفم (100 مغ/يوم) لمدة 1 - 2 شهراً.

2. الأمراض الفطرية الجلدية:

فطر الأظافر، السعفة الجازة الشعرية والإصابة الجافة المتكررة والمزمنة للجلد والعائدة للتريكوفيتون روبروم (*Trichophyton rubrum*) تتطلب معالجة بدواء عن الطريق العام عبر الفم: يُفضل التيربينافين على الجريزيوفولفين أو الكيتوكونازول، الأدوية الأخرى استطبابتها موضعية. فطر الأظافر يمكن أن يعالج بدهنات موضعية بالـ Locéryl في حال التقيد بالخطّة العلاجية أو - في حالة عدم إمكانية التقيد - بالـ Lamisil 250 مغ/يوم (تيربينافين كمعالجة عن الطريق العام)، عند الأطفال يستعمل الـ Griséofulvine.

3. الأمراض النخالية:

النخالية المبرقشة: Selsun أو أحد الأدوية الأزولية كبخاخ سائل أو شامبوان، وفي الأشكال المنتشرة أو التهابات الأجرية الشعرية يمكن استعمال الـ Nizoral لمدة 5 أيام.

2. الأمراض الفطرية العميقة

المضادة لمرض الفطرية عن الطريق العام

جدول 2 - طرق التشخيص للأمراض الفطرية الجهازية

تشخيص مرض فطري جهازي ما يعتمد على تحليل الفحص المباشر، وعلى زرع الفطر و/أو عينات تشريحية مرضية.	
- الأمراض العائدة للمبيضات	زرع الدم، فحص قعر العين، زراعة لعينة مأخوذة بشكل عقيم، فحوص مصالية.
- الإصابة بالكريبتوكوك	فحص مباشر بواسطة الحبر الصيني، زراعة، تشخيص غير مباشر بواسطة مولد الضد (مصل، سائل دماغي شوكي).
- الإصابة بالأسبيرجيلا	زراعة لعينة مأخوذة بشكل عقيم، خزعة، تصوير طبقي محوري للصدر (مقاطع رقيقة)، مولد ضد (ELISA، فحص على اللاتيكس PCR (Latex) (ما زال قيد الاختبار).
- أمراض فطرية معدية	قصة سريرية لسفر، ولو كان بعيداً، فحص مباشر، زرع، عينة تشريحية مرضية ± أجسام ضدية.

الأدوية المضادة للفطور والمستعملة لمعالجة الأمراض الفطرية العميقة تتضمن: البولييين (امفوتيريسين B ومشتقاته الدهنية)، المضادات الاستقلابية (فلوسيتوزين) المشتقات الأزولية والشينوكاندينات (جدول 3). طرق استعمالها لمعالجة الأمراض الفطرية الجهازية الأساسية ذكرت في الجدول 4.

1. الأمفوتيريسين B (AMB):

الـ AMB (Amphotericin B، Fungizone)، يجب أن تعطى عن طريق الوريد (0.7 - 1 مغ/كغ/يوم. أو كل يومين): آثارها الجانبية العامة (الترفع الحروري، القشعريرة) والوريدية يمكن إنقاصها بإعطاء الأدوية المضادة للهستامين و/أو هيميسوكسينات الهيدروكورتيزون في نفس الوقت. السمية تكون كلوية بشكل أساسي واستقلابية (نقص بوتاسيوم الدم). إعطاء الصوديوم وإطالة مدة حقنها يخفضان من هذه السمية.

جدول 3 - المضادات الفطرية عن الطريق العام ومعالجة الفطور العميقة

الدواء	الجرعة اليومية	الاستطبابات
أمفوتريسين B (Fungizone)	دو 0.7 - 1 مغ/كغ	- المبيضات الجهازية - الكريبتوكوك - الأسبيرجيلا - الهيستوبلازما وأمراض فطرية أخرى معدية
أمفوتريسين ليبوزومال (Am Bisome)	≤ 3 مغ/كغ	- أسبيرجيلا، ومبيضات اختراقية - كريبتوكوك عصبية سحائية - نقص كريات بيض مع وجود حمى
أمفوتريسين معقد دهني (Abelcet)	دو 5 مغ/كغ	- إنتان جهازى بالأسبيرجيلا والمبيضات
5 فلوروسيتوزين (Ancitol)	دو - حبوب 100 - 150 مغ/كغ	يجب مرافقته مع الأمفوتريسين؛ المبيضات الجهازية، الكريبتوكوك، الأمراض الفطرية العصبية
فلوكونازول (Triflucan)	دو أو كبسولات، محلول للشرب 100 - 800 مغ (بالغ) (طفل: 3 - 6 مغ/كغ قيد التجربة)	مبيضات جهازية وكريبتوكوك عصبية سحائية أو رئوية
أنتركونازول (Sporanox)	جلائين، محلول ودو 200 - 400 مغ	أسبيرجيلا اختراقية، هيستوبلازما وفطور أخرى معدية
فوريكونازول (Vfend)	دو وحبوب 6 مغ/كغ/12 سا اليوم الأول سيروسبوريز، مبيضات خطيرة مقاومة ومن ثم 4 مغ/كغ/12 سا دو للفلوكونازول طف < 40 كغ: 400 مغ × 2 لليوم الأول ومن ثم 200 مغ × 2/يوم طف > 40 كغ: ½ الجرعة	أسبيرجيلا اختراقية، فوزاريوز،
كينتوكونازول (Nizoral)	200 - 400 مغ (بالغ) 4 - 7 مغ/كغ/طفل	مبيضات، هيستوبلازما، وأمراض فطرية أخرى معدية
كاسبوفنجيرون دو (Caspofungin)	70 مغ/يوم اليوم الأول ومن ثم 50 مغ/يوم	أسبيرجيلا اختراقية (كخيار درجة ثانية) مبيضات اختراقية (بالغ ليس عنده نقص في الكريات البيض) (خيار درجة أولى)

* في حال اضطراب الوظيفة الكلوية.

جدول 4 - الخطة العلاجية للأمراض الفطرية الجهازية الأساسية

الإصابة بالمبيضات: [أفوتيريسين أو أحد مشتقاته الدهنية داخل الوريد \pm فلويسيتوزين] أو [فلوكونازول \pm فلويسيتوزين ما عدا في حالة الإصابة بالمبيضات كروسي أو المبيضات فلابراتا] أو كاسبوفونجين مهما كان نوع المبيضات عند البالغ غير ناقص الكريات البيض، أو فوريكونازول وحيداً (حتى في حالة الإصابة بالمبيضات كروسي) في حالة المقاومة للفلوكونازول. مدة المعالجة: 15 يوماً بعد زراعة الدم الإيجابية، أو/و بعد شفاء عضو حشوي مصاب. هذا وينصح بسحب القثطرة في حالة وجودها.

الإصابة بالكريبتوكوك السحائية: [أفوتيريسين B أو أحد مشتقاته الليبوزومية داخل الوريد \pm فلويسيتوزين] في المرحلة الهجومية (15 يوماً)، أو أفوتيريسين B الشكل الليبوزومي (في حال وجود الـ VIH)، ومن ثم المتابعة بالفلوكونازول، في حال الإصابة السريرية القليلة الخطورة يمكن استعمال الفلوكونازول منذ البداية.

وقاية ثانوية بواسطة الفلوكونازول عند مثبت المناعة. بزل قطني متكرر (30 سم³) أو إجراء تحويلة في حالة فرط التوتر داخل الجمجمة.

الإصابة بالكريبتوكوك الغير سحائية: [أفوتيريسين B داخل الوريد أو فلوكونازول] \pm فلويسيتوزين. وقاية ثانوية بواسطة الفلوكونازول عند مثبت المناعة.

الإصابة الاختراقية بالأسبرجيللا: فوريكونازول، الذي يشكل المعالجة المرجعية. أفوتيريسين B أو أفوتيريسين B دهني داخل الوريد أو أنتراكونازول (متابعة عن طريق الفم، ومن الممكن البدء به كمعالجة هجومية في حالة الأشكال الأقل خطورة). الكاسبوفونجين يشكل معالجة بديلة ذات خيار آخر.

الإصابة العفنية الفطرية Mucormycosis: أفوتيريسين B دهني داخل الوريد + جراحة، أحياناً يعطى أنتراكونازول أو بوزاكونازول.

الإصابة الفطرية المعدية: أفوتيريسين B أو إيتراكونازول، فلوكونازول بالنسبة للإصابة المخاطية بالكوكسيديوز Coccidioidomycosis.

إصابت فطرية أخرى عائدة لفطور حساسة على الأمفوتيريسين B: أفوتيريسين B أو أفوتيريسين B دهني داخل الوريد. الفوزاريوز Fusariosis والسيدوسبوريوز Scedosporiosis تتطلب المعالجة بالفوريكونازول. معالجة تجريبية عند الأشخاص ناقصي الكريات البيض: أفوتيريسين B للشكل الليبوزومي. الوقاية من المبيضات: أفوتيريسين B عن طريق الفم، نيساتين، كيتوكونازول أو فلوكونازول.

هناك بعض المستحضرات تحملها يكون أفضل من قبل المريض، وبالتالي تسمح بمعالجة لمدة أطول: أفوتيريسين B لليبوزومال (Am Bisome) والأفوتيريسين المعقد الدهني (Abelcet). الجرعات اليومية تكون أكبر (≤ 3 مغ/كغ/يوم بالنسبة للـ Am Bisome و 5 مغ/كغ/يوم بالنسبة للـ Abelcet). هذا وإن تفوق الأشكال الدهنية من ناحية الفعالية على الـ Fungizone لم تثبت بشكل قاطع، باستثناء دراسة أجريت على الأشخاص ناقصي الكريات البيض،

ولكن التحمل الأفضل لهذه الأشكال الدهنية يسمح بمعالجة لمدة أطول. مع العلم أن كلفتها مرتفعة جداً. إن أغلب الفطور ولا سيما المبيضات، الكريبتوكوك، الأسبيرجيلا حساسة على هذه الأدوية؛ بينما البسوداليشتريا بويديي (*Pseudallescheria boydii*) ولا سيما الـ *Sc. prolificans* تكون مقاومة لها بصورة عامة.

2. فلويسيتوزين (Ancotil):

يعطى عن طريق الفم أو داخل الوريد بجرعة 100 - 150 مغ/كغ/يوم موزعة على 3 - 4 مرات لأن طرحه الكلوي سريع. انتشاره السحائي، البولي والنسجي جيد، التركيز الباقي يجب أن يكون ≤ 25 مكغ/مل، والذروة المصلية يجب أن تكون > 100 مكغ/مل. سميته هضمية، كبدية وبالأخص دموية. طيفه يشمل بشكل خاص الفطور (المبيضات والكريبتوكوك) ولكن بعض الزمر مقاومة له (اختبار التحسس للمضاد الفطري ضروري). هذا وإن وجود عدد كبير من الطفريات يمنع استعماله وحيداً للمعالجة (استعماله مترافقاً مع الأمفوتيريسين B مع دواء من الفصيلة الآزولية أو الإيكنوكاندين).

3. المشتقات الآزولية:

- الكيتوكونازول (Nizoral): فعال عن طريق الفم. جرعتَه تتراوح ما بين 200 - 300 مغ/يوم، تحمله الهضمي يمكن أن يكون هشاً وخطورة حدوث التهاب الكبد - رغم ندرته - يتطلب مراقبة بيولوجية. الأدوية المضادة للحموضة تنقص امتصاصه؛ الريفامبيسين يجعله غير فعال. ينقص هذا الدواء طرح السيكلوسبورين. طيفه واسع، ولكن داخل الزجاج، أسبيرجيلوس، مبيضات غالابراتا، مبيضات كروزيي، والموكور *Mucor*، تكون مقاومة له عادة.

مراقبته مع الـ 5FC ممكنة، ولكن مع الأمفوتيريسين B نظرياً غير ممكنة، لتضاد مفعول كل منهما مع الآخر. الاستطابات النظرية للكيتوكونازول هي الأمراض الحشوية بالمبيضات (باستثناء السحايا)

والأمراض المخاطية الجلدية المزمنة بالمبيضات، بالإضافة إلى بعض الإنذانات الغريبة: الهيستوبلازما، البلاستوميكوز، باراكوسيديديوميكوز والأونتوموفتوروميكوز، ولكن حالياً المعالجة بالـ Triflucan والـ Sporanox أخذت مكانه.

• **الميكونازول (Daktarin):** امتصاصه سيئ عن طريق الفم وكذلك تحمله. من أجل هذا فإن استعماله أصبح نادراً كمضاد فطر عن الطريق العام. مستحضره للاستعمال داخل الوريد سحب من الأسواق.

• **الفلوكونازول (Triflucan):** عبارة عن مشتق آزولي ثلاثي فعال على الخمائر باستثناء المبيضات كروزيي. المبيضات غلابارنا حساسيتها متغيرة عليه، وتتعلق بجرعته، أو مقاومة له. امتصاصه لا يتأثر بالأطعمة وهو ينتشر بشكل جيد في السائل الدماغي الشوكي والبول. إنه متوفر في المشافي على شكل كبسولات 50، 100، 200 مغ، ومحلول للشرب 50 و 100 مغ وكذلك للإعطاء عن طريق الوريد 100، 200 و 400 مغ. مستحضراته للاستعمال عن طريق الحقن يجب ألا تستعمل إلا في حال عدم إمكانية استعماله عن طريق الفم، إنها لا تمتلك أية أفضلية من ناحية الفعالية بالإضافة إلى سعرها المرتفع بشكل مدهش. الجرعة اليومية يمكن أن تتغير من 50 - 800 مغ/يوم. تحمله جيد، ولكنه مع ذلك قد يعطي اضطرابات هضمية وكبدية. وأخيراً فإنه من الممكن أن يؤدي إلى ظهور مقاومة عند إعطائه لفترة طويلة عند مريض الـ VIH الذي عند إصابة مخاطية بالمبيضات.

• **الأتراكونازول (Sporanox):** عبارة عن مشتق آزولي ثلاثي جرعته اليومية تتراوح ما بين 100 - 400 مغ، تغطي الكبسولات دفعة واحدة عن طريق الفم، بعد وجبة طعامية مما يسهل امتصاصها (بينما مضادات الحموضة تنقصه). المحلول الفموي للسيكلوديكتسترين يجب أن يؤخذ والمريض صائم. الريفامبيسين ينقص تركيزاته الدموية. طيفه مماثل لطيف الكيتوكونازول بالإضافة إلى الأسبيرجيلوس. فعاليتها جيدة بشكل خاص

على الأمراض الجهازية المعدية المتضمنة للنبسيسيلوز وبعض الكروموميكوز المبيضات غلابارنا مقاومة له مثله مثل بقية المشتقات الأزولية. هذا ويوجد محلول للشرب للأنتركونازول يستعمل من أجل المبيضات الفموية البلعومية والمريئية المقاومة للفلوكونازول (شخص مصاب بالـ VIH).

المستحضر الوريدي للـ Sporanox بالسكلوديكسترين أظهر فعالية في بعض حالات الأمراض الاختراقية العائدة للأسبيرجيلوس وبعض حالات الترفعات الحرورية الغير مفسرة والمعدنة على العلاج بالصادات الحيوية عند الأشخاص ناقصي الكريات البيض. التداخل في التفاعلات الدوائية فيما بينها هو نفسه المشاهد بالنسبة لعائلة الأدوية الأزولية.

- الفاريكونازول (Vfend): طيفه يمتد ليشمل الأسبيرجيلوس سيبسيا، وكل المبيضات سيبسيا (بما فيها المبيضات كروزيي المقاومة للفلوكونازول)، بالإضافة إلى السيدوسبوريوم سيبسيا والفوزاريوم سيبسيا. هذا الدواء متوفر عن طريق الفم والوريد. وهو فعال بالنسبة للأمراض الاختراقية العائدة للأسبيرجيلوس، للأمراض العائدة للفوزاريوم والأمراض العائدة للسيدوسبوريوم. كما أنه فعال على المبيضات الجهازية. ومن الممكن أن يعطي آثاراً جانبية عينية سليمة، كبدية وحالات نادرة من التحسس للضياء.

4. الإيكنوكاندين Echinocandines:

من بين المضادات الفطرية الجديدة الفعالة على الجدار، هناك الكاسبوفونجين (Caspofungin)، متوفر في الأسواق. طيفه يغطي الأسبيرجيلوس وكل المبيضات. الكريبتوكوك والتريكوسترون مقاومة له. تحمله ممتاز باستثناء تسببه لبعض الأذيات الوريدية المحيطة. هذا ومن المستطاب استعماله في حالة الإصابة الاختراقية بالمبيضات والإصابة بالأسبيرجيلوس كعلاج ذو اختيار درجة ثانية.

5. مرافقة الأدوية المضادة للفطور:

حدوث الوفيات ما زال مرتفعاً في حالة الإصابة بالأمراض الفطرية الاخرافية. هذا ومقارنة مع الأمراض الإنتانية الأخرى فإن مرافقة هذه الأدوية فيما بينها يمكن أن يكون ذو فعالية متفوقة على الفعالية في حالة استعمال دواء وحيد. حالياً وحدها النتائج التي حصل عليها داخل الزجاج وعند الحيوان أظهرت أهمية المرافقة الدوائية: أمفوتيريسين B أو أمفوتيريسين B ليبوزومي + كاسبوفونجين، كاسبوفونجين + فوريكونازول بالنسبة للأسبيرجيللوس والمبيضات.

مرافقة الأمفوتيريسين B + فلوكونازول لا يشكل تعارضاً في مفعول الدوائين وذلك لمعالجة المبيضات الدموية عند الإنسان. هذه المرافقات ومرافقات أخرى ما زالت قيد الدراسة.

43. الأدوية المضادة للطفيليات

1. أدوية الأولي Protozooses

1. داء الأميب:

الدواء القاتل للأميب النسيجي: لمعالجة الأميب الزحاري أو الخارج المعوي (جدول 1).

جدول 1 - الأدوية القاتلة للأميب النسيجي = نيترو - 5 - إيميدازول			
الفصيلة الدوائية	Flagyl	Fasigyne	Tiberal
الاسم العلمي	ميتروليدازول	تينيدازول	أورنيديازول
مستحضراته	حب 250 - 500 مغ محلول للشرب 4%	حب 500 مغ	حب 500 مغ حقن 500 - مغ - 1 غ
الجرعة	زجاجة 500 مغ 30 مغ/كغ/24 سا		
الآثار الجانبية	لمدة 5 أيام بالنسبة للأميب الزحاري، 10 أيام بالنسبة للأميب الكبدية غثيان، آلام معدية (معرضة أو مزدادة بتناول الكحول)، صداع، نقص الكريات البيض، اعتلال عصبي في حالة المعالجة الطويلة الأمد		

2. البابيزيوز Babésiose:

معالجة لمدة 10 أيام مرافقة الكلينداميسين [Dalacine]: عند البالغ: 1.2 غ مرتين باليوم، حقناً مستمراً داخل الوريد أو 0.6 غ عن طريق الفم 3 مرات باليوم: عند الطفل 20 - 40 مغ/كغ/يوم مع الكينين عن طريق الفم: 25 مغ/كغ/يوم موزع على 3 جرعات.

3. داء الأكريات Coccidiose:

جدول 2 - الأدوية الخاصة بداء الأكريات

المسبب	إسهال	الدواء
الأكريات البوغية الخفية Cryptosporidium	غزير ومستمر عند مثبط المناعة	نيتازوكسادين (Cryptase)
متماثلة الأبواغ الجرسية Isoparabelli	غزير ومستمر عند مثبط المناعة	كوتريموكسازول**
Cyclosporacaytanensis	مسافر، مزمّن عند مثبط المناعة	كوتريموكسازول**
** Bactrim fort: حبتين \times 2/يوم \times 10 أيام.		

4. داء الجيارديا Giardiose:

كل أدوية النيترو - 5 - إيميدازول فعالة على هذا الداء وبجرعة معادلة لنصف الجرعة المستعملة لداء الأميب، أما بالنسبة للإينيدازول فهو يستعمل بجرعة وحيدة قدرها 2 غ عند البالغ. في حال داء الجيارديا المعند يعطى الألبيندازول (جدول 6): 400 مغ/يوم \times 5/يوم.

5. داء الليشمانيا Leishmanioses:

بالنسبة لداء الليشمانيا الحشوي: المعالجة العادية هي الغلوكانتيم (antimoine) البنتاميدين (Pentacarinat) والأمفوتيريسين B (Fungizone IV)، Ambisome) فعالة أيضاً.

بالنسبة لليشمانيا الجلدية المخاطية والجلدية: Glucantime أو Pentacarinat. الـ Glucantime (حقن 5 مل أو 1.5 غ منها 425 antimoine) تعطى داخل العضل (حقناً عميقاً): 15 مغ/كغ اليوم الأول، 30 مغ/كغ اليوم الثاني، 45 مغ/كغ اليوم الثالث، 60 مغ/كغ من اليوم 4 - 21، مع إمكانية إجراء سلسلة معالجة ثانية بعد انتهاء الأولى بـ 4 - 6 أسابيع.

السمية: تظاهرات تأقية anaphylactiques، إصابة كبدية كلوية، التهاب شغاف القلب، اعتلال عصبي.

الـ Pentacarinat (زجاجة 300 مغ حقن مستمر داخل الوريد < 1

ساعة) يعطى بجرعة 3 - 4 مغ/كغ/يوم (10 حقن). السمية كلوية وبنكرياسية. الـ Fungizone IV (زجاجة 50 مغ حقناً مستمراً 8 - 12 ساعة) يعطى بجرعة 0.5 - 1 مغ/كغ/يوم، مرة واحدة كل يومين (جرعة كلية = 1 - 3 غ). السمية كلوية. هذا وإن إعطاء جرعة 1 مغ داخل الوريد ببطء (خلال 15 دقيقة) كاختبار يسمح باكتشاف وجود تحسس.

الـ Ambisome يمكن أن يستعمل في حال وجود مقاومة أو احتمال وجود مقاومة على الأدوية الأنتيمونية، بجرعة كلية قدرها 18 - 24 مغ/كغ، موزعة على 6 حقن مستمرة بقر 3 - 4 مغ/كغ (من اليوم 1 إلى اليوم 5 + الحقنة السادسة في اليوم العاشر)؛ عند مثبط المناعة يمكن إعطاء 40 مغ/كغ موزعة على 10 - 20 يوماً.

6. داء الميكروسبوريديا Microsporidiose:

يعطي هذا الداء إسهالات مزمنة وغزيرة عند مثبطي المناعة (السيدا). بالنسبة للـ Encephalitozoon المعوية: البيندازول (Zentel) 400 مغ \times 2 /يوم/ 21 يوم. بالنسبة للـ Enterocytozoon bieneusi: فيتازوكسانيد (ما زال قيد الدراسة).

7. داء البرداء Paludisme:

• الأشكال الشديدة أو المختلطة أو في حالة عدم التحمل الهضمي: كينين عن طريق الحقن داخل الوريد (25 مغ/كغ/يوم)، ومن الممكن مرافقته مع الدوكسيسيكليين (200 مغ/يوم) في حالة الإصابة بالبرداء العائدة للمتصورة المنجلية (*Plasmodium falciparum*) الآتية من جنوب - شرق آسيا (إمكانية قلة تحسسها على الكينين). المدة المنصوح بها للمعالجة: 7 أيام. في حال اختفاء الترفع الحروري قبل اليوم السابع يمكن إيقاف الحقن والمتابعة عن طريق الفم، إما بالكينين أو بواسطة الميفلوكين (Lariam) وحيداً، حيث يبدأ به بعد 12 ساعة من إيقاف الكينين عن طريق الوريد. أو بإعطاء الأتوفاكون - بروجوانيل (Malarone) لمدة 3 أيام.

جدول 3 - الأدوية المستعملة لمعالجة داء البرداء

الاسم التجاري والاسم العلمي	المستحضرات	المعالجة: ب = بالغ، ط = طفل
Quinimax كينين	حب 500 مغ حقن 125، 250، 500 مغ	البرداء الشديدة أو المقاومة على مضادات البرداء الأخرى، داخل الوريد حقن مستمر (25 مغ/كغ/يوم، كحد اعظمي 1.5 - 2 غ/يوم) × 7 أيام مع جرة هجومية
Lariam méfloquine	حب 250 مغ	البرداء المقاومة للكloroquine أو المتعددة المقاومة ب: 750 مغ ومن ثم 500 مغ بعد 8 ساعات في حال الوزن < 60 كغ. 250 مغ بعد 8 ساعات أخرى ط: 25 مغ/كغ موزعة على جرعتين، بفواصل 6 - 12 ساعة خلال يوم واحد
Malarone توفلاكون + بروغوانيل	حب 250 مغ حب 100 مغ	البرداء المقاومة للكloroquine أو متعددة المقاومة، من السهل أن يطال المتصورة المنجلية ب أو ط ≤ 12 عاماً: 4 حبات دفعة واحدة/يوم × 3 أيام
Halfan هالوفانترين	حب 250 مغ ملعقة قياس 100 مغ	البرداء المقاومة للكloroquine والمتعددة المقاومة. ب: 3 جرعات، كل واحدة حبتين بمسافة 6 ساعات ما بين الجرعة والأخرى، مع تكرارها ولكن بنصف الجرعة بعد أسبوع ط: 25 مغ/كغ موزعة على 3 جرعات، مع تكرارها ولكن بنصف الجرعة بعد أسبوع
Fastidar Sulfadoxine Pyriméthamine +	حب: 500 مغ + 25 مغ حقن: 500 مغ + 25 مغ	البرداء المقاومة للكloroquine ب: 3 حبوب أو حقنتين دغ ط: ½ حبة أو ½ حقنة/10 كغ دغ
Nivaquine كلوروكين	حب 100 - 300 مغ ملعقة قياس 25 مغ	البرداء الحساسة على الكلوروكين ب + ط: 10 مغ/كغ اليوم 1 و 2 5 مغ/كغ اليوم 3، 4، 5

- داء البرداء العائد للمتصورة المنجلية من دون وجود علامات خطيرة، والمقاوم كيميائياً أو محتمل أن يكون مقاوماً (قادم من أي مكان باستثناء أميركا الوسطى وهايتي): ميفلوكوين، أتوفاكون - بروغوانيل، هالوفانترين أو سلفادوكسين - بيريميتامين، آخذين بعين الاعتبار مضادات استطباب استعمال هذه الأدوية والتي منها:
 - الميفلوكوين (Lariam): إرضاع، سوابق عصبية - نفسية، ترفع حروري صفراوي مع وجود هيموغلوبين في البول، قصور كبد شديد، فرط التحسس على الميفلوكوين، معالجة في نفس الوقت بفالبروات الصوديوم (Depakine)، أطفال وزنهم > 15 كغ.
 - الأتوفاكون - بروغوانيل (Malarone): إرضاع، قصور كبد وكلية شديد.
 - هالوفانترين (Halfan): حمل وإرضاع، تطاول مسافة Q-T الولادي (أو وجود إصابة عائلية به)؛ تطاول مسافة Q-T مرضي أو من أصل دوائي (يجب إجراء تخطيط قلب كهربائي دائماً قبل إعطاء هذا الدواء. هذا التخطيط يجب أن يبين أن $QTC > 0.44$ ثانية. كما يجب تجنب إعطاء هذا الدواء مع أدوية أخرى تؤدي إلى زيادة طول مسافة Q-T. وأخيراً يجب إعطاؤه خارج الوقعات الغذائية.
 - سلفادوكسين - بيريميتامين (Fansidar): تحسس على السلفاميدات، بداية أو نهاية الحمل (يجب الانتباه إلى إمكانية عدم فعاليته على المتصورة المنجلية ذات الأصل الآسيوي أو الآتية من شرق أفريقيا).
 - داء البرداء العائد للمتصورة المنجلية الحساسة على الكلوروكين أو العائد لمصورات أخرى (متصورة نشيطة Vivax، ببضوية Ovale، الوبائية Malariae)؛ يعطى الكلوروكين (جدول 4).
 - المعالجة الوقائية: وحدها الأدوية المضادة للبرداء مستعملة هنا، كلوروكين، بروغوانيل (مرافقاً مع الكلوروكين أو الأتوفاكون)، ميفلوكوين، دوكسيسيكليين.

8. داء المتكيسات الرئوية Pneumocystose: أنظر فصل الإنسان بالـ VIH،
(السيدا):

9. داء المقوسات Toxoplasmosis:

الاستطابات ومدة المعالجة:

- التوكسوبلاسموز المكتسب عند المرأة الحامل: Rovamycine خلال كل فترة الحمل. التوكسوبلاسموز الجنيني: Adiazine + Malocide + حمض الفولينيك للأُم حتى الولادة. هذه المرافقة الدوائية يجب متابعتها عند الطفل حديث الولادة (4 مراحل).
- كل مرحلة 3 أسابيع متتالية مع الـ Rovamycine.
- التوكسوبلاسموز عند الشخص ذو المناعة الطبيعية: Rovamycine لمدة 3 أسابيع. إذا كانت الإصابة السريرية خطيرة: Adiazine + Malocide + حمض الفولينيك لمدة 4 أسابيع.
- توكسوبلاسموز الشخص مثبط المناعة: أنظر فصل السيدا.
- معالجة المتابعة غير مستتابة إلا في حالة السيدا.

جدول 4 - أدوية التوكسوبلاسموز

الاسم العلمي	سبيراميسين	بيريميتامين	سلفاديازين*
الاسم التجاري	Rovamycine	Malocide	Adiazine
المستحضرات	حب 1.5 و 3 مليون وحدة	حب 50 مغ	حب 0.5 غ
الجرعة	ب: 6 - 9 مليون وحدة/يوم ط: 0.15 مليون وحدة/كغ/يوم (1 - 1.5 مغ/كغ/يوم)	ب: 4 - 6 غ/يوم ط: 0.10 غ/كغ/يوم	ب: 4 - 6 غ/يوم ط: 0.10 غ/كغ/يوم
الآثار الجانبية	اضطرابات هضمية	فقر دم عرطل**	اضطرابات هضمية، دموية، نقص الصفائح**

ب = بالغ ط = طفل

- * صادات حيوية أخرى يمكن مرفقتها مع البيريميتامين: السلفادوكسين (Fansidar)، الكلينداميسين (Dalacine).
- ** وقاية بإعطاء روتيني بنفس الوقت لحمض الفولينيك (Osofolate, Lederfoline).

10. داء المشعرات التناسلي *Trichomonas génitale*:

تعالج بالـ 5-NI (2 غ جرعة واحدة) (جدول 1).

11. داء المثقبيات الأفريقي (مرض النوم) *Trypanosomiasis africaine*:

- أشكال لمفاوية - دموية، من دون إصابة عصبية: بنتاميدين (سمية كلوية وبنكرياسية).
- في حالة الإصابة العصبية: زرنين (Arsobal) Trivalent، يجب إعطاؤه في الشعبة العصبية (سميته العصبية هامة).

12. داء المثقبيات الأمريكي: (مرض شاغاس *Chagas*)

Trypanosomiasis americaine:

وحدها الأشكال الحديثة الحادة تتطلب معالجة دوائية بالبنزيندازول (Radanil).

2. أدوية الشبذ *Helmenthiases*

1. داء البلهارسيا *Bilharzioses*:

يعالج بالبارزيكانتيل (Biltricide) جرعة وحيدة بعد الوقعة الغذائية: 40 مغ/كغ ما عدا الـ *S. Japonicum*: 60 مغ/كغ، حيوب 600 مغ يمكن قسمها لأربعة أقسام. الآثار الجانبية (دوار، صداع، نعس، غثيان، آلام بطنية، إسهالات) من الممكن حدوثها. هذا الدواء يوجد مضاد استطباب له خلال الأشهر الثلاثة الأولى للحمل، في حالة الإرضاع. هذا الأخير يجب أن يوقف يوم إعطاء الدواء ولمدة 72 ساعة بعده.

2. داء القليديات Gestodes (أنظر الجدول 5):

جدول 5 - أدوية القليديات

داء الشريطية Téniasis	
الشريطية المزمنة T. Saginata	نيكلوساميد Trédimine: مرتين حبتين للقرط على الريق
أو الشريطية المسلحة T. Solium	برازيكانتيل Biltricide: 10 مغ/كغ ط ف جرعة وحيدة
المحرفة القزمية Hymenolpis nana	
الإصابة العصبية بداء الكيسة المذنبة Neurocysticercose	برازيكانتيل Biltricide: 20 مغ/كغ ط ف جرعة وحيدة
المرض الكيسي Hydatidose	أو البيندازول Zentel: 15 مغ/كغ/يوم × أسبوعين
معالجة جراحية	في حالة عدم إمكانية التدخل الجراحي أو انفجار الكيسة: البينكازول
• مضاد استطباب في حالة الإصابة العينية.	

3. الأمراض الناتجة عن المتورقات Distomatose:

المتورقة الكبدية Fasciola hepatica: تريكلابيندازول (Egaten): 10 مغ/كغ/جرعة وحيدة.
متفرع الخصى Clonorchis، متأخر الخصى Opisthorchis: برازيكانتيل (Biltricide 75 مغ/كغ/يوم × 2/يوم).
المتورقة البسكية Fasciolopsis buski: نيكلوساميد (Trédimine): مرتين حبتين للمضغ على الريق.

4. داء الممسودات Nématodoses:

1. الممسودات النسيجية Nématodoses tissulaires (جدول 6).

2. الممسودات المعوية Nématodoses intestinales.

- الأنجيلوز Anguilliose: أنفيرميكتين (Stromectol) جرعة وحيدة: بالغ 4 حبات، طفل 0.2 مغ/كغ؛ أو Zentel حبة واحدة/يوم × 3 أيام؛ أو تيايندازول (Mintézol): بالغ: حبة 500 مغ/يوم × 2 يوم؛ طفل/ 25 مغ/كغ/يوم × 2 يوم.
- ممسودات معوية أخرى (جدول 7).

جدول 6 - أدوية الممسودات النسيجية

الخيار الأول	الخيار البديل
داء الخيطيات اللمفاوية Filarioses Lymphatiques أو داء اللوا Loase	ني - إيتيل - كاربامازين (Notézine) يوم 1: ¼ حبة أو 16/1 حبة (إذا كان هناك تركيز عال للخيطيات في الدم)؛ يجب مضاعفة الجرعة كل يوم حتى الوصول إلى 4 حبات/يوم مدة المعالجة = 21 يوماً** هذا ومن أجل تجنب حوادث انحلال الخيطيات، يعطى مضاد الهيستامين أو الكورتيزون
داء كلابية الذئب Onchocercose	إيفيرميكتين
داء الشعرينية Trichinose	البيندازول (Eskazole, Zentel) ثيابندازول (Mintézol)، 25 مغ/كغ/يوم حبتين كل واحدة 400 مغ/يوم × 7 أيام تكرر 1 - 2 مرة
داء السهميات Toxocarcose	البيندازول (Eskazole, Zentel) ثيابندازول (Mintézol) حبتين كل واحدة 400 مغ/يوم 25 مغ/كغ/يوم × 10 أيام × 10 أيام
داء هجرة اليرقات الجلدي Larva migrans cutanée	إيفيرميكتين

* إيفيرميكتين (Stromectol، حبوب 3 مغ) = 4 حبات للبالغ، 0.2 مغ/كغ للطفل جرعة وحيدة.
** المراقبة المجهرية للخيطيات في الدم يمكن أن تقود إلى تكرار المعالجة بعد 6 أشهر.

3. أهمية الإسراع في التشخيص والعلاج

الجرب يتطلب معالجة موضعية (Spégal، Ascabiol)، أو عامة بالإيفيرميكتين (Stromectol): 0.2 مغ/كغ أو عند البالغ: 4 حبات جرعة وحيدة. مرض القمل يعالج بتطبيق موضعي لقاتلات حشرات كلورية (ليندان، كلوفينوتان) أو بيريترين طبيعي (بلينيترين، بيرميترين، بيريترين...)، هناك العديد من الأدوية.

جدول 7 - أدوية الممسودات المعوية

الاسم التجاري	Fluverval	Combantrin	Zentel
الاسم العلمي	flubendazol	Pyrantel	Ablendazole
المستحضرات	● حب 100 مغ ● محلول للشرب 100 مغ/ملعقة قهوة	● حب 125 مغ ● محلول للشرب 125 مغ/ملعقة عيار	● حب 400 مغ ● محلول للشرب بتركيز 4%
الاستطابات:			
● الأفصورة	حبة أو ملعقة قهوة،	حبة أو ملعقة قياس/10	
Oxyurose	جرعة وحيدة	كغ جرعة وحيدة	
● داء الأسكاريس			حبة واحدة
Ascaridiose			دفعه واحدة
● داء الشعرينية	حبة أو ملعقة قهوة	حبتين أو 2 ملعقة	
الدماغي	صباحاً ومساءً × 3 أيام قياس/10 كغ × 3 أيام		
Trichocephalose			
● داء الملقوات			
Ankylostomiasis			

44. مضادات الالتهاب والأمراض الإنتانية

يجب ألا توصف مضادات الالتهاب من دون تشخيص أمام أعراض متضمنة لألم وحرارة، مع التنكير أن الحرارة في البداية يمكن أن تكون خفية. والخطر هنا أن تترك بعض الأعراض الإنتانية تتطور من دون معالجة مثل التهاب الأم الجافية الرقبية التي يمكن أن تشخص كتشنج رقبى، أو التهاب الحويضة والكلية الذي يمكن أن يشخص كآلام قطنية رئوية الخ...

إن استعمال مضادات الالتهاب في حالة الأمراض الإنتانية يجب أن يكون دائماً مسبقاً بتشخيص دقيق وحسب الحالة، بمعالجة مضادة للإنتان متناسبة مع الحالة السريرية.

1. مضادات الالتهاب الغير ستيروئيدية

- يجب ألا توصف كبديل للمسكنات أو خافضات الحرارة، وذلك نظراً لمسيتها.
- استطبائها الوحيد في ميدان الأمراض الإنتانية هو التهاب التأمور الفيروسي الحاد.
- في حالة التهابات الأذن، أنف، حنجرة لم يثبت لها أية فائدة ولا سيما في حالة التهابات الأذن الوسطى الحادة، والتهابات اللوزتين.
- في حالة التهاب الجلد والحمية تحت الجلد، مضادات الالتهاب هذه يمكن أن تؤدي إلى التهابات الضفيرة النخرية ولذلك هناك مضاد استطباب لها في هذه الحالة. عند مريض معالج لفترة طويلة بواسطة مضادات الالتهاب الغير ستيروئيدية (أو الكورتيزونات)، فإنه ليس من الضروري تغيير هذه المعالجة إذا كانت ضرورية. ولكن لسبب وجود خطورة كامنة فإن وضع المريض في المشفى من الممكن أن ينظر به.

2. الكورتيكوستيرويدات

- تستطب الكورتيكوستيرويدات كمعالجة إسعافية في بعض الحالات الإنتانية المهددة للحياة:
 - الصدمة الإنتانية: هيميسوكسينات الهيدروكورتيزون (50 مغ كل 6 ساعات).
 - التهاب الحنجرة الفيروسي الحاد عند الطفل: 0.4 - 0.6 مغ/كغ من الديكساميثازون داخل العضل (الطفل يجب أن يوضع في وسط رطب)؛ ومن ثم المتابعة عن طريق الفم/برينيزون 1 - 2 مغ/كغ/يوم خلال 48 ساعة.
 - داء المتكيسات الرئوية Pneumocystose الشديد، المعرف يكون الـ $PaO_2 < 70$ مم زئبقي: برينيزون (أو ميتيل برينيزولون)، 1 - 1.5 مغ/كغ/يوم لمدة 5 أيام مع إنقاص تدريجي خلال 21 يوماً.
 - التهاب السحايا القيحي عند الطفل أو البالغ (أنظر فصل التهاب السحايا).
 - تناذر تفعيل الخلايا البالعة الذي يحدث كاختلاط لبعض الإنتانات المنتشرة التي من ضمنها نذكر السل.
 - الحالات الخطيرة من السعال الديكي، الحمى التيفية (القلبية أو العصبية) والدفتيريا (الحنجرية).
- تستطب الكورتيكوستيرويدات في بعض أشكال السل: التهاب التأمور، التهاب السحايا (برينيزون: 1 مغ/كغ/يوم خلال 1 - 2 أسبوع ومن ثم إنقاصه تدريجياً خلال 4 - 6 أسابيع)؛ هذا وقد اقترح استعمال الكورتيكوستيرويدات من غير أن يُصنَّق في الأوضاع التالية:
 - السل الدخني الدموي المنقص للأوكسجين، التهاب الجنب أو البريتوان ذات الأشكال الشديدة والطويلة المدة، وجود عقدة لمفاوية متضخمة من دون تراجعها تحت معالجة مضادة للسل.
- تستطب الكورتيكوستيرويدات (بصورة عامة ≥ 7 أيام) في حالات مختلفة:

- التهاب الحنجرة الحاد الفيروسي عند البالغ مع وجود زلة و/أو عسرة نطق شديدة جداً.
- الحالات الشديدة لالتهاب وحيدات النوى الإنتاني خاصة التهاب اللوزات الساد.
- التهاب الجيوب الحاد الشديد الإيلام، داء البوليبات الأنفي الجيبي.
- التهاب الأذن المصلي المخاطي الزمن.
- هجمة تشنجية لالتهاب قصبات مزمن.
- إنتان طفيلي: داء الخيطيات، داء الشعريات، داء السهميات العيني.
- السيفيليس في مرحلته الثالثة للوقاية من ارتكاس هيركزيمير Herxheimer.
- ليس هناك من استطباب مثبت لاستعمال الكورتيكوزونات في حالة التهاب العضلة القلبية الفيروسي، التهاب لسان المزمار الحاد، الإنتانات البولية التناسلية، المرحلة الحادة من داء المنطقة.
- مضادات الاستطباب:
- العقبول: مضاد استطباب قطعي للكورتيكوزونات الموضعية.
- التهاب الكبد الفيروسي الحاد المزمن.
- داء البرداء الخطير.

45. المطهرات Les antiseptiques

1. تعريفات

يقضي المطهر على العضويات المجهرية الموجودة على الأنسجة الحية في حال تطبيقه عليها. التعقيم L'asepsie هو مجموعة الإجراءات الهادفة إلى منع كل دخول خارجي للعضويات المجهرية إلى الأنسجة الحية أو الأوساط الميتة.

2. ميكانيكية التأثير

على عكس الصادات الحيوية، تؤثر المطهرات بطريقة سريعة مفاجئة على مستوى الأغشية السيتوبلاسمية، الأجهزة التنفسية والبنى البروتينية. فعاليتها يمكن أن تكون مرتبطة بكميتها. هذا ويجب تطبيقها لوقت كاف لكي تكون فعالة.

3. شروط الاستعمال

تثبط فعالية المطهرات جزئياً بـ:

- وجود مواد عضوية (ضرورة للتنظيف المسبق).
 - وجود PH حامضي (كلورهيكزدين Chlohexidine).
 - وجود مواد مثل الصابون (الأمونيوم الرباعي، كلورهيكزدين، داكلن Dakin).
- هذا ويجب تجنب بعض المرافقات: المطهرات الزنبقية العضوية مع المشتقات السيودية، مطهرات الأمونيوم الرباعية أو الكلورهيكزدين مع الصابون.

من أجل هذا السبب يوصى باستعمال نفس العائلة من المطهرات لتحقيق إجرائين يقودان إلى التعقيم: للتنظيف (بالصابون مثلاً) ومن ثم تطبيق مطهر من نفس العائلة (أنظر الأمثلة في الفقرة 5).

- الفعالية الأكثر تأثير حالياً مثلت بثلاثة عائلات للمطهرات:
- المؤكسدات السيودية: صبغة اليود، الكحول لليودي، البوفيدون اليودي (Bétadine).
- المؤكسدات الكلورية: Dakin Cooper Stabilisé (مماثل لماء جافيل Javel).
- البيغوانيدات: كلورهيكزدين: Biseptine، Hibitane.

4. الآثار الجانبية

الآثار الجانبية جلدية بشكل عام: تهيج، تحسس، تحسس للضياء. السمية يمكن أن تكون خطيرة: اضطراب في الوظيفة الدرقية عند حديثي الولادة الذين طبق عليهم مواد يودية بشكل وفير.

5. الإستعمالات الأساسية، مضادات الاستطباب والمحفورات الخاصة بالاستعمال

- المطهرات المطبقة على الجلد السليم يمكن استعمالها حسب المراحل المذكورة سابقاً:
- Bétadine Scrub (بيتادين غازي) ومن ثم غسل بيتادين جلدي Bétadine dérmique.
- Hibiscrub ومن ثم غسل وبعد ذلك Hibitane.
- Biseptine (+/- غسل) ومن ثم Biseptine.
- يمكن استعمال Beladine Scrub والـ Hibiscrub لغسل الأيدي المعقم أو الجراحي.
- من أجل الأنسجة المخاطية، يوجد مستحضرات من البيتادين نسائية، للغرغرة أو عينية.
- هذا وقبل كل استعمال للمشتقات اليودية، فإنه يجب التأكد من غياب التحسس على اليود ومن غياب اضطراب في الوظيفة الدرقية.
- يجب عدم استعمال الكلورهيكزدين في المجاري السمعية أو تماس مع السحايا.

6. المطهرات وفيروس السيدا VIH

هيبوكلوريت الصوديوم هو المطهر الأكثر فعالية. محلول منه بتركيز 0.5° يزيل فعالية الفيروس خلال دقيقة واحدة (للتذكير فقط فإن مستحضرات ماء جافيل تركيزها 36°). الكحول الإيثيلي بتركيز 70° يقضي على الفيروس. ورغم أن الكحول يؤثر بشكل سريع فإن تطايره سريع جداً مما يقصر من مدة التماس. البيتاين والكلور هيكلزيدين يعتبران كقاتلين للفيروس بتركيزاتها العادية. من الناحية العملية في حال التعرض الجلدي للـ VIH فإنه يجب القيام بتنظيف سريع للجرح بالماء والصابون، ومن ثم الغسل الجيد وبعد ذلك تطبيق مطهر خلال زمن قدره على الأقل 5 دقائق (أنظر فصل السيدا).

جدول 1 - المطهرات الأساسية وفعاليتها على العضويات المجهرية المختلفة

الفيروسات	الفطريات	الجرثيم الفطرية	الجرثيم	- المؤكسدات
++	++	++	+++	اليود، صيغة اليود، للكحول اليودي البوفيدون اليودي (Betadine) الكحول، ماء جافيل، داكين (Dakin)
-/+	++	++	+++	- الكحول
-/+	++	+	+++	- البيروكسيدات H ₂ O ₂ KMnO ₄
0	+	0	+	- المعادن الثقيلة (العضوية الزئبقية) (Mercryl، Merseptyl)
-/+	0	0	+	- الكارباميلات تريكلوكاربان (Solubacter Septivon)
-/+	-/+	0	+	- الأمونيوم الرباعي Cétavulon، Biocidan، Sterlane

- Biseptine: كلور هيكلزيدين + كحول + أمونيوم رباعي

* تتأخر مطلق مع المشتقات اليودية، خطر حدوث تسمم زئبقي.
** جرثيم غرام - غير حساسة أو حساسة بشكل قليل.

46. العناية الصحية والحجر الصحي

1. العناية الصحية

هدفها حماية الفرد من الأمراض وإبقائه بصحة جيدة. وفي المشافي هدفها هو الوقاية من الإنتانات النوزوكوميالية بالنسبة للمرضى أو للفريق الطبي وذلك بإجراء تطبيقات صحية أساسية، مضاف إليها حسب الحاجة (بعض العناية السريرية الخاصة، مرضى ذوي خطورة معينة) إجراءات خاصة (مثل العزل).

1. العناية الصحية الأساسية:

الإجراءات التالية يجب أن تطبق بصرامة من قبل الفريق الصحي في المشفى، وبشكل روتيني.

1. غسل الأيدي:

أغلب الإنتانات النوزوكوميالية تنتقل عن طريق الأيدي، ولذلك فإن غسل الأيدي (بالماء والصابون، أو بالمطهرات، أو الغسل الجراحي) يبقى الإجراء الأساسي للوقاية. استطببات الطرق المختلفة لغسل الأيدي، والمواد المستعملة وطريقة الغسل كلها مشروحة في الجدول 1.

هذا وإن استعمال محاليل مائية - كحولية في هذه الأعوام الأخيرة لتطهير الأيدي أظهر أنه من الممكن أن يكون كبديل أفضل.

تعتبر اليد ناقل مفضل للعضويات الصغيرة. النبيت La flore الجلدي مكون من نموذجين: النبيت المقيم والنبيت العابر. النبيت المقيم هو النبيت الطبيعي المعتاد للجلد. والنبيت العابر يكون مركباً من عناصر ممرضة مكتسبة عن طريق تماس مُعدي (فريق العناية، أو المرضى). الغسل العادي للأيدي يسمح بإنقاص النبيت العابر (90%)؛ الغسل بالمحاليل المعقمة والغسل الجراحي يسمحان بنفي النبيت العابر وإنقاص النبيت المقيم، هذا وإن غسل

الأيدي يعتبر الطريقة الأكثر فعالية لإنقاص انتقال العنصر الممرض من مريض لآخر.

2. الطرق الوقائية الأساسية الأخرى (جدول 2):

الهدف هو حماية فريق العناية الصحية وإنقاص العدوى المتصالبة ما بين المرضى بواسطة العضويات المجهرية (انتقال عن طريق الأيدي +++):

مريض ← مريض، مريض ← موظف صحي، موظف صحي ← مريض والوسط المحيط به ← مريض.

تحفظ الأيدي بواسطة قفازات غير معقمة ذات استعمال لمرة واحدة، وذلك عند التماس مع مواد بيولوجية، المخاطيات أو الجلد الحامل لآفة مهما كانت الحالة الإنتانية للمريض. وهكذا فالأيدي المحمية بالقفازات تكون أقل تلوثاً وغسلها يكون أكثر فعالية. هذه القفازات ذات الاستعمال الوحيد يجب رميها حال انتهاء العناية. هذا وإن استعمال القفازات لا يُعني عن غسل الأيدي.

جدول 1 - الطرق الثلاثة لقفل الأيدي في المستشفى

الاستطابات، نوع الصابون، التقنية

طريقة القفل	متى؟	بماذا؟	كيف؟
غسل عادي	- قبل البدء بالعمل	صابون سائل	مدة على الأقل 30 ثانية
- قبل وبعد العناية الغير		طبيعي	- أطراف معتنى بها وقصيرة، من دون
اختراقية وعند مرضى غير			طلاء، عدم وضع مجوهرات، عدم وضع
مصابين بأمراض إنتانية			ساعة.
- عند تحضير الحقن			- غسل الأيدي، والثالث السفلي للمساعد.
- بعد خلخ القناع			- أخذ عيار من الصابون
- بعد العطس والتمخط			- التركيز على المناطق ما بين الأصابع،
- بعد الذهاب إلى المراض			حواف الأطاف، الحافة الخارجية لليد
- عند ترك القسم أو الشعبة			والإبهام.
			- مدة الغسل يجب أن تتراوح ما بين 30
			ثانية إلى دقيقة واحدة.
			- غسل جيد بالماء بعد استعمال الصابون.
			- تشييف جيد.
			- إغلاق الصنبور يتم بواسطة منشفة
			للأيدي.

طريقة الفصل	متى؟	بماذا؟	كيف؟
غسل معقم	- بعد تماس مع زحافة للتبول أو التفوط في السرير	صابون سائل معقم سابقاً	على الأقل 60 ثانية كما وصف
	- بعد كل عناية غير عقيمة	بوفيدون يودي	
	اختراقية:		
	وضع قطرة بولية دائمة،		
	قطرة وريدية قصيرة،		
	زرع دم، بذل قطين...		
	- عند العناية بمرض مطبق		
	عليهم الحجر الصحي		
	- عند العناية بمرضى مثبط المناعة		
غسل جراحي	- قبل وضع قطرة مركزية،	صابون سائل معقم	- مدة على الأقل 6 دقائق
	وضع مفجر	بوفيدون يودي	- 3 أزمنة مع غسل 3 مرات لمدة دقيقتين
		أو كلورهيكزيدين	كل مرة مع فرك الأيدي بواسطة فرشاة
		معقمة	
	- قبل كل تدخل جراحي	صابون سائل معقم	
	- في حال تدخل شعاعي	بوفيدون يودي	
	اختراقية	أو	
		كلورهيكزيدين	
تعقيم الأيدي	- على أيد نظيفة	محلول مائي كحولي	- توزيع 5 مل من السائل المعقم على
	- في حالة عدم إمكانية تحقيق		سطح اليد بأكمله (التركيز على المسافات
	غسل معقم (ما بين عنايتين		ما بين الأصابع، الإبهام، الحافة للكعبية
	قليلتي الخطورة)		لليد، الأظافر)
	- عند وجود وباء		- ترك الأيدي معرضة للهواء حتى جفافها
			(عدم التشفيف)

3. اللباس المهني:

يجب أن بحمي المعنني الصحي من العناصر الإنثانية، وأن يكون ذو كم قصير ليسمح بغسل الأيدي بشكل جيد. أن يبدل بصورة متكررة كلما كان ذلك ضرورياً (إلزامي إذا كان قد لوّثَ بسائل بيولوجي)، ويشكل أمثل كل يوم. الحلي والساعات يجب أن تتزع قبل البدء بالعمل. هذه القواعد يجب أن تكتب وتعلق على الحائط لتذكرها دائماً ولا سيما في أقسام التعقيم وغرفة العمليات حيث تضاف إلى هذه الألبسة قبة وقناع.

جدول 2 - توصيات

<p>- في حالة التماس مع دم أو بعد وخزة أو جرح: غسل أو معقم مكان الإصابة، بعد فذف لهذه السوائل سائل بيولوجي على المخاطية (الملتصحة): غسل وافر.</p>	<p>- غسل و/أو تعقيم الأيدي بعد خلع القفازات، العناية بمرضى بعد مريض سابق، القيام بفعالية بعد الأخرى.</p>
<p>- وضع القفازات: يجب في حالة خطورة التماس مع الدم، أو أي مادة أخرى ذات أصل إنساني، خطورة التماس مع المخاطيات أو الجلد المتأذي للمريض، خاصة في حال القيام بعمليات تحمل خطورة الوخز (زرع الدم، وضع أو نزع قنطرة وريدية، أخذ عينة دموية...)، أو عند استعمال أنبوب للعين البيولوجية، غسيل أو أدوات ملوثة، أو عند العناية في حال كون أيدي الممتعتي حاملة لأذيات.</p>	<p>- تغييرها عند العناية بمرضى بعد الآخر، أو القيام بفعالية بعد الأخرى</p>
<p>- وضع صداري، نظارات، في حال كون العناية تعرض لخطورة التعرض لرذاذ دموي أو لرذاذ أي مادة ذات أصل إنساني (شفط، تنظير، عمل جراحي، خزعة، استعمال أدوات أو غسيل ملوث).</p>	<p>- أقتعة</p>
<p>- أدوات ملوثة أدوات وإخزة أو قاطعة ذات استعمال وحيد: عدم وضع غمد الإبرة من جديد، عدم نزعها باليد، وضع هذه الأدوات فوراً في حاو خاص موضوع قرب مكان العناية كما يجب مراقبته إذا كان ممثلاً أولاً. أدوات قابلة لعودة الاستعمال: تحريك هذه الأدوات الملوثة بالدم أو المواد الإنسانية بحذر. للتأكد من أن هذه المواد كانت قد خضعت لإجراءات عناية (تعقيم وتطهير) مناسبة قبل عودة استعمالها.</p>	<p>- أدوات ملوثة تنظيف ومن ثم تعقيم بماء جافيل 12°، ممد بماء بارد بنسبة 10/1 (أو أي مطهر آخر مناسب)، للسطوح الملوثة برذاذ دموي أو أي مادة أخرى ذات أصل إنساني.</p>
<p>- نقل العينات البيولوجية، العينات البيولوجية، الغسيل والأدوات الملوثة بالدم أو بأية مادة أخرى التفصيل والأهوات الملوثة ذات أصل إنساني يجب أن تطرح من الشعبة بواسطة أكياس كتيمة ومغلقة بإحكام.</p>	<p>-</p>

4. تنظيف، تطهير، وتعقيم الأدوات:

هدف هذه الإجراءات هو حماية المرضى والعاملين الصحيين من الإصابة بالإنذانات عن طريق هذه الأدوات. هذا وقبل البدء بأي إجراء للتطهير أو التعقيم فإنه يجب غسل هذه الأدوات (مواد منظفة أو منظفة مطهرة).

هذا وقد صنفّت خطورة الإصابة بالإنذانات بثلاثة مستويات:

- خطورة مرتفعة: إدخال لهذه الأدوات في الجهاز الوعائي أو في أي موضع عقيم. في هذه الحالة يجب التعقيم بالبيوسيد أو الاستعمال لهذه الأدوات لمرة واحدة.
- خطورة متوسطة: التماس مع المخاطية أو الجلد المتأذي سطحياً، في هذه الحالة يجب إجراء التعقيم (بقاتل للجراثيم، قاتل للفيروسات، قاتل للفطور).
- خطورة منخفضة: التماس مع الجلد السليم للمريض، أو عدم التماس معه. في هذه الحالة يجرى تطهير ذو مستوى منخفض.

2. الإجراءات الصحية الأخرى:

هذه الإجراءات تكمل الإجراءات الأساسية السابقة، وهي تطبق من أجل الوقاية من الإنتانات عند القيام بمدخلات ذات خطورة إنتانية مرتفعة (وضع أدوات اختراقية)، أو لمرضى معينين (محجورين صحياً...)، كما تطبق من أجل الاستعمال الجيد للأدوات والمنتجات الصحية والمطهرات ومن أجل التطبيقات الصحية في محيط المشفى.

في الجدول 3 - نذكر الحقول التي تطبق فيها هذه الإجراءات الصحية الخاصة.

جدول 3 - الحقول التي تطبق فيها إجراءات صحية أخرى

التنفس الاصطناعي	غسل الأيدي
طرق العزل	التحضير للعمل الجراحي
مرض كروزفلت جاكوب Greutzfeldt Jakob	وضع قنطرة بولية
القرحات	وضع أدوات داخل الأوعية
الضمادات	زرع الدم
صيانة أجهزة معالجة الهواء للأقسام المحمية	العناية بالأدوات الطبية
العناية الصحية في قسم الأشعة	(جهاز التنظير، أدوات طبية جراحية)
العناية الصحية في قسم التحال	طرح الفضلات
العناية الصحية في قسم الاستقصاءات الوظيفية	غسيل الألبسة (نقلها.. إلخ)
العناية الصحية في المخبر	
العناية الصحية في الصيدلية	

2. الحجر الصحي

حجر المريض الصحي أو إقامة الحجر عنه يشكلان استطبaban طبيان.

هذا وإن أهداف العزل تختلف حسب طبيعة المريض وحسب طبيعة الإنتان.

- الحجر الإنتاني هدفه تجنب انتقال العنصر الإنتاني، المعروف أو المفترض، من مريض مصاب بالإنتان أو حامل للعنصر الإنتاني إلى أشخاص آخرين غير مصابين بإنتان أو غير حاملين لعنصر إنتاني، ولكن قابلين للعدوى (مرض آخرون فريق العناية).
- الحجر الوقائي هدفه تجنب انتقال أي عنصر إنتاني إلى مرضى مثبطي المناعة (عضويات مجهرية موجودة في المحيط، أو محمولة من قبل مرضى آخرين من قبل فريق العناية أو الزوار).

1. الحجر الصحي الإنتاني:

يتم انتقال الإنتان بواسطة ثلاثة طرق أساسية: الهواء، الرذاذ، التماس (بصورة مباشرة أو غير مباشرة): جدول 3.

الحجر الصحي الإنتاني الهوائي هدفه الوقاية من انتقال، اعتباراً من مسافة < 1 متر، العناصر الإنتانية المحمولة بواسطة جزيئات أصغر من 5 ميكرون ناتجة عن انتشار قطرات ملوثة مثل: السل، الحجر الإنتاني للرذاذ هدفه الوقاية من انتقال، اعتباراً من مسافة > 1 متر، العناصر الإنتانية المحمولة على الرذاذ الملوثة - قطرات < 5 ميكرون - المقذوف إما بالسعال أو العطاس. مثل: النزلة الوافدة، المكورات السحائية.

الحجر الإنتاني لانتقال الإنتان عن طريق التماس هدفه الوقاية من انتقال العناصر الإنتانية بعد تماس فيزيائي ما بين شخص مصاب بالإنتان أو حامل له وشخص مستقبل (تماس مباشر) أو بواسطة ناقل موجود في

الوسط المحيط (تماس غير مباشر). مثل الجراثيم المتعددة المقاومة، فيروس روتا Rotavirus. هذا وبالنسبة لأغلب العناصر الإنتانية، فإن إجراءات الوقاية الأساسية تكون كافية للوقاية من أي انتشار. ولكن هناك بعض العناصر الإنتانية التي يجب من أجلها إضافة طرق حجر خاصة حسب طريقة انتقالها (مثل: السل) أو أحياناً مرافقة طريقتي حجر إنتاني (مثل الحماق حيث يرافق الحجر الهوائي مع الحجر للتماس)، بالنسبة لبعض العناصر الإنتانية المتطلبة لحجر التماس، فإنه يجب اتخاذ إجراءات إضافية وذلك لوجود بنية بيولوجية خاصة لهذه العناصر (مثلاً تفضيل مطهر للأيدي مع سائل مائي كحولي عند تطبيق الحجر بالنسبة لفيروس روتا Rotavirus). الإجراءات الصحية الخاصة بكل نموذج حجر صحي ذكرت في الجدول 4.

ولكي تكون إجراءات الحجر الصحي هذه نموذجية، فإنه من الضروري تطبيق استراتيجيات حجر صحية وصارمة:

- احترام إجراءات الوقاية الأساسية.
 - عند الشك بمرض إنتاني معد فإنه يجب تطبيق عزل إنتاني مكيف حسب طريقة انتقال العدوى (تماس، رذاذ، هواء).
 - عند تطبيق العنصر الممرض فإنه يجب إعادة تقويم طرق العزل هذه (زيادتها أو إنقاصها).
 - إيقاف العزل فقط عند نهاية الفترة الإنتانية.
- بالإضافة إلى ذلك فإنه في حالة عزل جرثوم متعدد المقاومة في المخبر فإن هذا الأخير - المخبر - يجب أن يبلغ الشعبة الموجود فيها هذا الجرثوم لكي تطبق طرق عزل إنتانية مناسبة.

هذا ومن أجل إنقاص انتقال الجراثيم المتعددة المقاومة، فإنه من الممكن تطبيق فحوص تقص روتينية بالنسبة للمرضى المهيئين لحمل هذه الجراثيم: مرضى آتين من قسم العناية المشددة أو من شعبة المرضى العجزة، أو مرضى كانوا قد عولجوا بصادات حيوية قبل قبولهم في القسم الجديد.

جدول 4 - طرق الحجر الأساسية المناسبة لطرق الانتقال المشكوك بها

طبيعة الحجر	إجراءات خاصة بالمريض	إجراءات خاصة بالفريق	إجراءات خاصة بالوسط المحيط
تماس	<ul style="list-style-type: none"> - إعلام المريض - غرفة مفردة - عدد محدد للزيارات - خروج مراقب 	<ul style="list-style-type: none"> - تطبيق إجراءات الوقاية الأساسية - إعلام الفريق - غسل الأيدي - معقم بعد التماس مع المريض أو الوسط المحيط به - لبس قفازات ذات استعمال وحيد - تغليف العينات البيولوجية في مغلفة الغرفة 	<ul style="list-style-type: none"> - تنظيف الغرفة في النهاية - تنظيف متكرر للوسط المحيط بالمريض - تخصيص أدوات طبية بسيطة للغرفة - الأوراق والإضبارة خارج الغرفة - إخراج الألبسة للغسيل
هواء	<ul style="list-style-type: none"> - إعلام المريض - غرفة مفردة (إلزامياً) - باب مغلق - عدد محدد للزيارات (مع وضع قناع مناسب (مثل: وضع قناع) - خروج مراقب مع وضع - قناع - غلبة للتشمع ومناديل ذات - استعمال لمرة واحدة 	<ul style="list-style-type: none"> - تطبيق إجراءات الوقاية الأساسية - إعلام الفريق - وضع قناع مناسب (مثل: قناع خاص مضاد للسل). - غسل الأيدي - معقم بعد التماس مع المريض - لبس قفازات ذات استعمال وحيد - وضع قميص إضافي - تغليف العينات البيولوجية في الغرفة 	<ul style="list-style-type: none"> - أدوات طبية بسيطة مخصصة للغرفة - الأوراق والإضبارة خارج الغرفة - كيس الفضلات ذات الخطورة في الغرفة - إخراج الألبسة للغسيل
رذاذ	<ul style="list-style-type: none"> - إعلام المريض - غرفة مفردة - عدد محدد للزيارات (مع - وضع قناع - خروج مراقب مع قناع - غلبة للتشمع ومحارم ذات ≥ 1 متر - استعمال لمرة واحدة 	<ul style="list-style-type: none"> - تطبيق إجراءات الوقاية الأساسية - إعلام الفريق - وضع قناع تنفسي إذا كانت المسافة الفاصلة عن المريض ≥ 1 متر - غسل الأيدي - معقم بعد التماس مع المريض - وضع قميص إضافي 	<ul style="list-style-type: none"> - تنظيف الغرفة في النهاية - أدوات طبية بسيطة مخصصة للغرفة - الأوراق والإضبارة خارج الغرفة - كيس الفضلات ذات الخطورة في الغرفة - إخراج الألبسة للغسيل

جدول 5 - شروط إنهاء العزل جزئياً أو بشكل نهائي

طبيعة العزل	العامل الممرض	شروط إنهاء العزل جزئياً عند الخروج المراقب (أشعة...)	شروط إنهاء العزل بشكل نهائي
تماس	جراثيم متعددة المقاومة كلوستريديام ديفيسيل	- غسل للأيدي بمعقم - وضع قفازات ذات استعمال وحيد	- شفاء سريري ≤ 48 ساً وفحوص جرثومية بيولوجية سلبية
		- تغليف محكم للأذيات (جرح) أو للسوائل البيولوجية المنتجة أو المستعمرة (بول/غائط) - تنظيف وتطهير للنقالة والوسط المحيط بالمريض	
هواء	سل رئوي أو حنجري الحماق	- وضع أقنعة مناسبة للمريض - غياب السعال المقشع - غسل بمعقم للأيدي	- معالجة مناسبة فعالة ≤ 15 يوماً
رذاذ	النزلة الوافدة	- وضع قناع للمريض - غياب السعال - غسل بمعقم للأيدي	- شفاء سريري ≤ 48 ساعة

2. الحجر الصحي الواقعي:

هدف هذا الحجر هو وضع حاجز أمام دخول العناصر الإنتانية إلى الوسط المحيط بالمريض. الإجراءات الصحية الأساسية هي غسل الأيدي قبل الدخول إلى الغرفة، تطهير أو تعقيم الأدوات قبل الدخول إلى الغرفة أو حتى أحياناً وضع المريض في غرف ذات ضغط إيجابي ولا سيما بالنسبة للمرضى منعدمي الكريات aplasie لفترة طويلة (< 10 أيام: مثل الوقاية من داء الأسبيرجيلا Aspergillose). كما أنه يجب تحديد الزيارات، وتجميع العناية لتجرى في الوقت نفسه. احترام صارم للإجراءات الصحية الأساسية.

1. اللقاحات الأساسية (جدول 1)

جدول 1 - تصنيف

اسم اللقاح	طريق الإعطاء	لمن يعطى اللقاح	العمر الأصغر
1. اللقاحات الحية			
جرثومية BCG	داخل الجلد	أطفال	عند الولادة
فيروسية (مضعفة)			
Rougeoleux الحصبة	دع/ت ج	أطفال	9 أشهر
Rubeoleux الوردية	دع/ت ج	أطفال	12 شهراً
Ourlien النكاف	دع/ت ج	أطفال	12 شهراً
Varicelleux الحصان	دع/ت ج	طفل ذو خطورة	12 شهراً
amaril الحمى الصفراء	دع/ت ج	المسافرون	6 أشهر
2. اللقاحات الميتة الجرثومية			
السعال الديكي	دع/ت ج	أطفال	شهران
Coquelucheux	دع/ت ج	شخص معرض	6 أشهر
مضاد لداء البريميات Leptospirose			
مجزأة			
- نيفانات معطلة Tetanique الكزاز	دع/ت ج	كل الأعمار	شهران
Diphthérique الدفتيريا	دع/ت ج	أطفال + بالغون	شهران
A-C méningo سحائية	دع/ت ج	تماس/وباء	18 شهراً
Y-C-A méningo سحائية	دع/ت ج	الحجاج لمكة المكرمة/	18 شهراً
Pneumo (23) رئوية	دع/ت ج	للتماس	سنتان
مكافئ		عمر < 65 عاماً وأشخاص	
هيموفيلوس أنفلونزا (متحد)	دع/ت ج	نوي خطورة	شهران
Typhodique الحمى التيفية	دع/ت ج	أطفال	سنتان
للسعال الديكي خال من الخلايا acellulaire	دع/ت ج	أشخاص معرضون	18 شهراً

اسم اللقاح	طريق الإعطاء	لمن يعطى اللقاح	العمر الأصغر
3. اللقاحات الميتة الفيروسية			
كاملة	شلال الأطفال غير مُفَعَّل	أطفال/بالغون	6 أسابيع
النزلة الوافدة grypale	دع/ت ج	عمر < 65 عاماً، شخص ذو 6 أشهر خطورة	دع/ت ج
الكَلْب Mabique	دع	أشخاص معرضون	12 شهراً (½ جرعة من 1 - 3
التهاب الدماغ العائد للقراد	دع/ت ج	أشخاص معرضون	عاماً
التهاب الكبد A	دع	أشخاص معرضون	12 شهراً
		مسافرون	12 شهراً
التهاب الكبد B	دع/ت ج	كل الأعمار	عند الولادة

2. الاستطباقات

1. توصيات عامة:

- هناك روزنامة للقاحات في كل دولة. الجدول 2 - يبين روزنامة اللقاحات في فرنسا.
- في حال تأخر في تطبيق برنامج اللقاحات، فإنه من غير المفيد البدء من جديد بتطبيق هذا البرنامج (بالأخص اللقاحات المتعددة الحقن): من الكافي إكمال البرنامج ابتداءً من المرحلة التي توقف عندها.
- بعد أخذ لقاحين للـ B.C.G عن طريق داخل الأدمة، فإن الأشخاص الذين عندهم ارتكاس داخل الأدمة عائد للسليلين (Tuberculine) سلبي، يعتبرون ممنوعين.
- كل لقاح محقق يجب أن يسجل إما على دفتر الصحي للطفل أو على وثيقة معينة.

2. استطببات خاصة:

- بالإضافة للقاحات الموصى بها لكل المواطنين، وذلك حسب روزنامة تلقح معينة، فإنه يوجد لقاحات أخرى تعطى بصورة خاصة لأشخاص معينين وذلك لوجود خطورة مرتفعة مرتبطة إما:
- بالعمر، أمراض مرافقة (جدول 3).
 - المهنة: العاملون في الميدان الصحي (في فرنسا هناك بعض اللقاحات الإلزامية لهم) (جدول 4).
 - السفر إلى مناطق من العالم يوجد فيها احتمال إصابة بأمراض معينة (جدول 5).

جدول 2 - روزنامة اللقاحات المنصوح بها في فرنسا

منذ الشهر الأول	العمل
	لقاح الـ B.C.G يعطى للأطفال المقيمين في وسط موهب للإصابة بالسل، وهو إلزامي قبل الدخول إلى الحضانة أو المدرسة، هذا ويجب إجراء لختبار السللين Tuberculine بعد 3 - 12 شهراً.
اعتباراً من الشهر الثاني	- DTCP + لقاح شلل الأطفال عن طريق الحقن منصوح به عادة، وعن طريق الفم يستعمل فقط في حالات الوباء. هذا وينصح باستعمال Hib 3 حقن مع فاصل لقاح السعال الديكي ذو الجرثوم الكامل. شهرين ما بين اللقاح ضد التهاب الكبد B يمكن أن يبدأ به اعتباراً من الشهر الواحدة والأخرى التالي. - التهاب الكبد B حقنتان مع فاصل شهر بينهما ومن ثم حقنة بعد 5 - 12 شهراً
اعتباراً من الشهر 12	ROR ينصح بهذا اللقاح للأطفال سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً. في حال وجود وباء فإنه يمكن إعطائه اعتباراً من الشهر التاسع. اللقاح الفوري يمكن أن يكون فعالاً إذا أعطي قبل اليوم الثالث للتعرض للعنوي.
	التهاب الكبد B الحقنة الثالثة يمكن أن تعطى هذه الحقنة في الشهر الخامس أو الـ 12 بعد الحقنة الثانية.
ما بين 16 - 18 شهراً	Hib + DTCP التذكير الأول

ما بين 3 - 6 سنوات	ROR	ينصح به لكل الأطفال.
قبل عمر الـ 6 سنوات	الحقنة الثانية	
قبل عمر الـ 6 سنوات	المعمل	لقاح الـ B.C.G إلزامي قبل الدخول إلى المدرسة.
عمر الـ 6 سنوات	DTP	
	التذكير الثاني	
	ROR +	الدخول إلى المدرسة يعتبر فرصة جيدة لإعطاء الـ ROR مع التذكير الثاني للـ DTP والـ B.C.G في اليوم نفسه.
ما بين 11 - 13 عاماً	DTP - التذكير الثالث	لكن الأطفال
	التذكير الثالث	
	- السعال الديكي لكل الأطفال	
	التذكير الثاني	
	ROR -	يعطى لكل الأطفال الذين لم يأخذوه مسبقاً.
	+ التهاب الكبد B	يعطى لكل الأطفال الذين لم يأخذوه في صغرهم وذلك بإعطاء حقنتين مع شهر فاصل ما بين الحقنة والأخرى، وتعطى حقنة ثالثة بعد 5 - 12 شهراً من الحقنة الثانية.
	+ اختبار السللين	الأشخاص ذوي التفاعل السلليني السلبي يجب تلقيحهم أو إعادة تلقيحهم.
ما بين 6 - 18 عاماً	DTP	ومن ثم D-T كل 10 سنوات.
	التذكير الرابع	
	الوردية الواحدة للنساء الشابات	تتصح المرأة الشابة بأخذ اللقاح، وذلك عند استشارتها لطبيبها (لأخذ حبوب منع الحمل مثلاً).
	الغير ملقحات سابقاً	
اعتباراً من عمر الـ 18 عاماً	كزاز - شلل الأطفال	كل 10 سنوات
	التهاب الكبد B	
	الحصبة	يعطى اللقاح للطفل حديث الولادة حال ولادته وذلك إذا كانت الأم غير ملقحة سابقاً وتفاعله المصلي قبل الولادة سلبياً أو غير معروف.
اعتباراً من عمر الـ 65 عاماً	النزلة الوافدة gripe	كل سنة.
اختصارات: DTCP	اختصار للدفتيريا Diphtheria، الكزاز Tetanos، السعال الديكي Coqueluche، شلل الأطفال Polio	
	Hib: اختصار للهيموفيلوس أنفلونزا B.	

جدول 3 - استطبابات خاصة بالنسبة لجميع المواطنين

التهاب الكبد B	<p>- حديث الولادة من أم حاملة للـ AgHbs.</p> <p>- طفل <3 سنوات وموضوع في مجمع (حضانة إلخ...).</p> <p>- أطفال وبالغين في مراكز للمعاقين أو المرضى النفسيين.</p> <p>- المرضى الذين عندهم قصور كلوي، أو المجري لهم تحال اصطناعي (إجراء فحص مصلي سنوي وإعطاء جرعة تنكير حالما تنخفض الأجسام الضدية تحت مستوى العتبة الحامية ضد المرضى).</p> <p>- الممنون على المخدرات الذي يستعمل أدوية عن طريق الحقن.</p> <p>- الأناس المختلطون بالشخص الحامل للـ AgHbs.</p> <p>- شخص له علاقات جنسية مع أشخاص متعددين.</p>
التهاب الكبد A	<p>- أشخاص متعرضون للإصابة.</p> <p>- دور الحضانة، دور المعاقين، أشخاص يعملون في المياه الملوثة، أشخاص يعملون في مطاعم جماعية.</p> <p>- مسافرون إلى أماكن موبوءة.</p>
المكورات الرئوية	<p>- حقنة واحدة كل 5 سنوات.</p> <p>- أشخاص مسنون <65 عاماً.</p> <p>- المقيمون في مجمع.</p> <p>- التهاب قصبات مزمن، قصور تنفسي، مدمن على الكحول، حامل لداء كبدي مزمن، قصور قلب، سوابق إنتان رئوي أو اختراقي عائد للمكورات الرئوية.</p> <p>- مستأصلي الطحال، داء الخلايا المنجلية الهوموزيجوت <i>Drepanocytaire</i> homozygote، التناذر النفروزي، إيتان بالـ <i>VIH</i>، معالجة مثبطة للمناعة.</p>
للنزلة الوافدة Grippe	<p>- أشخاص مسنون <65 عاماً.</p> <p>- قصور تنفسي، التهاب قصبات مزمن، قصور قلب، اعتلال كلوي مزمن خطير، داء السكري، تثبيط مناعي خلوي (ما عدا الـ <i>VIH</i>)، إقامة في مأوى عجزة، تالاسميا، داء الخلايا المنجلية <i>Chépanocytose</i>.</p> <p>- طفل <3 سنوات وموضوع في مجمع (حضانة...)، أطفال معالجون لمدة طويلة بالأسبيرين (كاوازاكي <i>Kawasaki</i>).</p>

جدول 4 - استنطابات خاصة مهنية

العاملون في الميدان الصحي

في فرنسا يجب إعطاء اللقاحات التالية بشكل إلزامي (قانون صدر في 18 كانون الثاني 1991):

- التهاب الكبد B.
- الكزاز - شلل الأطفال: كل 10 سنوات.
- الدفتيريا: تذكير كل 10 سنوات مع جرعة مُنقصة من مضاد الذيفان anatoxine.
- الحمى التيفية (الأشخاص العاملون في المخبر): حقنة أولى ومن ثم جرعة تذكير كل 3 سنوات.
- B.C.G بعد إعطاء لقاحي B.C.G عن طريق دائل الأئمة، فإن الأشخاص ذوي الارتكاس الألمي (IDR) السلبي يعتبرون ممنعين ضد السل.

اللقاحات المنصوح بها:

- النزلة الوافدة: العاملون في الميدان الصحي وكل الأشخاص الذين هم بتماس روتيني وطويل مع أشخاص مؤهين للإصابة بهذا المرض.
- التهاب الكبد A: أشخاص معرضون لخطر الإصابة (حضانة، دور المعاقين، إلخ...).

جدول 5 - استطبائات خاصة عند المسافرين

1. الحمى الصفراء (Stamaril):
يخضع هذا اللقاح لقانون دولي
● إجباري عند الدخول إلى المدرسة في أغلبية الدول الإفريقية المدارية وفي الغويان الفرنسية.
● منصوص به لكل الدول الأفريقية الواقعة ما بين خطي المدار، بما فيها السنغال وكينيا، ومن أجل المناطق الأمازونية.
حقنة وحيدة داخل العضل أو تحت الجلد، تعطى في مركز مختص، وهذا المركز يعطي شهادة تثبت أخذ اللقاح.
2. الكزاز وشلل الأطفال (TP) (جرعة التذكير): منصوص به لكل المسافرين، في حال كون آخر تذكير >10 سنوات
3. الدفتيريا:
مسافرون إلى منطقة موبوءة (أوروبا الشرقية والمنطقة المدارية). جرعة مخفضة من مضاد الذيفان anatoxine الدفتيري مرافقة مع الـ TP (Revaxis).
4. الحمى التيفية (Typhim VI) (Typherox):
حقنة واحدة ومن ثم عودة التلقيح كل 3 سنوات، منصوص بها في المناطق الموبوءة اعتباراً من عمر السنتين.
5. التهاب الكبد A (Havrix 1440 للبالغين)، (Havrix 720 للطفل)، (Avaxium، Vaqta25):
حقنة وحيدة جرعة تذكير بعد 6 - 18 شهراً، وذلك للشخص غير الممنع والمسافر إلى منطقة موبوءة.
6. المكورات السحائية C-A (Meningococcique Polyosidique A+C):
حقنة وحيدة (المناعة تظهر اعتباراً من اليوم العاشر وتستمر حوالي الـ 4 سنوات) وهي تعطى للأشخاص الذين سيقومون لمدة طويلة في منطقة موبوءة أو موبوءة بشدة، وبشكل خاص اليافع والأطفال اعتباراً من الشهر الثامن عشر (اعتباراً من الشهر الثالث في حالة وجود وباء بالمكورات السحائية A).
اللقاح إجباري بالنسبة للحجاج إلى مكة المكرمة، اللقاح (Mémio Ménomune A-C-W₁₃₅)، متوفر في مراكز التلقيح الدولية) كان قد نصح به بالنسبة للحجاج إلى مكة المكرمة عام 2001.
7. الكلب:
مسافرون معرضون لتماس مع الحيوانات، إقامة طويلة أو مغامرات أو إقامة معزولة في بلاد احتمال الإصابة فيها مرتفعة (بشكل خاص عند الأطفال ما بين 1 - 15 سنة).
9. التهاب الدماغ الياباني (Jevax):
كل حالة تؤخذ على حدة لوضع الاستطباب، وذلك في المناطق الموبوءة الآسيوية، (آسيا، الهند، ...).
في حالة الإقامة الطويلة في منطقة ريفية في فترة انتقال المرض. هذا ومن المفروض أخذ الحذر عند الأشخاص المتحسين.
10. التهاب الدماغ العائد للفراد في أوروبا الوسطى (Ticovac):
آثاره الجانبية قليلة جداً وفعالته جيدة لمدة 3 سنوات. ينصح بإعطائه للمسافرين إلى أوروبا الوسطى ودول الاتحاد السوفياتي السابق، والبلاد السكندنافية وذلك في المناطق الريفية الموبوءة.

3. مضادات الاستطباب والآثار الجانبية للقاحات

جدول 6 - الآثار الجانبية المعتدلة الخطورة

1. ارتكاس موضعي:
 - بالنسبة للقاحات المبطللة المفعول: ارتكاس مبكر (الأيام الثلاثة الأولى) على شكل ألم وارتشاح.
 - بالنسبة للـ BCG: ارتكاس متأخر (الأسبوع 3 - 12): آفة متقيحة + التهاب العقد اللمفاوية النجمية.
2. ترفع حروري لمدة 1 - 3 أيام:
 - بالنسبة للقاحات المبطللة المفعول: ارتكاس مبكر (الأيام الثلاثة الأولى).
 - بالنسبة للقاحات الحية (الحصبة، الحمى الصفراء): ارتكاس متأخر (اليوم 5 إلى 11).
3. اختلاجات:
 - لقاح السعال الديكي، الحصبة: اختلاجات عائدة للحرارة المرتفعة عند الأطفال الصغار.
4. طفح
 - اللقاحات المبطللة المفعول: طفح تحسسي مبكر.
 - لقاح الحصبة: طفح إنتاني متأخر.
5. آلام مفصلية:
 - لقاح الوردية الوافدة، التهاب الكبد B: عند البالغين.
6. التهاب الغدة النكفية:
 - اللقاح المضاد للنكاف.

أسماء تجارية

جدول 7 - لقاحات متوفرة في فرنسا: أسماء تجارية

لقاحات وحيدة المكافئ

1. اللقاحات الفيروسية:

لقاحات فيروس حي مضعف:

- اللقاح المضاد للحمى الصفراء: Stamaril.

- اللقاح المضاد للحصبة: Rouvax.

- اللقاح المضاد للوردية الوافدة: Rudivax.

- اللقاح المضاد للحماق: Vaccin varicelle SB.

لقاحات فيروس ميت أو مبطل المفعول:

- اللقاح عن طريق الحقن ضد شلل الأطفال Imovax Polio.

- اللقاح المضاد للزلة الوافدة: Previgrip, Mutragrip, Influva, Immugrip, Fluvirine.

- لقاح Vaxigrip, Fluarix.

- اللقاح المضاد للكلب: Vaccin Rabique Pasteur.

- اللقاح المضاد لالتهاب الكبد B: Havrix enfant et Havrix Adulte 1400U, Avaxin Adulte A: Vaqta, nourrisson 700U.

- اللقاح المضاد لالتهاب الكبد B: Engerix enfant et nourrisson 10 Mg, Engerix B Adulte 20 Mg.

- Gen hevac B Pasteur, HB Vax DNA 5 Mg, HB Vax DNA 10 Mg, HB Vax DNA 40 Mg.

2. اللقاحات الجرثومية:

لقاحات حية مضعفة

- لقاح مضاد للسل: Vaccin BCG Pasteur Intradermique, Monovax.

لقاحات مبطل المفعول أو ميتة:

- اللقاح المضاد لداء البريميات: Spirolept, Leptospirose.

مضادات النيفان:

- مضاد نيفان النفتيريا: لا يوجد لقاح وحيد المكافئ.

- مضاد نيفان الكزاز: Vaccin Tetanique Pasteur.

لقاحات متعددة السكاكر:

- لقاح مضاد لالتهاب السحايا الدماغي الشوكي العائد للمكورات السحائية A و C:

- Vaccin méningococcique, Polyosidique A & C.

- لقاح مضاد للإنذانات الرئوية العائدة للمكورات الرئوية (23 مكافئ): Pneumo 23.

- لقاح مضاد للحمى التيفية: Typherix, Typhim.

- لقاح مضاد للإنذانات العائدة للهيموفيلوس أنفلونزا b المرافقة: Act-Hib.

لقاحات مترافقة

لقاحات فيروسية حية مضعفة

- لقاح مضاد للكاف، الحصبة والوردية الوافدة: Priorix، ROR Vax.

لقاحات مبطللة المفعول أو ميتة + مضادات الديفان + لقاحات متعددة السكاكر
● ثنائية.

- لقاح مضاد للنزلة الوافدة والكزاز: Tetagrip.

- لقاح مضاد لشلل الأطفال والكزاز: T Polio.

- لقاح مضاد لالتهابات الكبد A و B: Twinrix Adulte، Twinrix enfant.
● ثلاثية:

- لقاح مضاد للدفتيريا، الكزاز وشلل الأطفال: DTP Pasteur، DTPolio.

- لقاح مضاد للدفتيريا، الكزاز وشلل الأطفال مع جرعة منقوصة (6/1) من مضاد ديفان الدفتيريا:
Revaxis.

● رباعية:

- لقاحات مضادة للدفتيريا، الكزاز، شلل الأطفال، ولقاح السعال الديكي الخالي من الخلايا:
Tetravac-acellulaire Infamix Polio.

● خماسية:

- لقاح مضاد للدفتيريا، الكزاز، شلل الأطفال ولقاح السعال الديكي الخالي من الخلايا، الهيموفيلوس
أنفلونزا: Pentavac Infamix Polio H1B.

- لقاح مضاد للإنثانات العائدة للهيموفيلوس أنفلونزا b المرافقة، أو ضد الدفتيريا، الكزاز، السعال
الديكي بالجرثوم الكامل وشلل الأطفال Pentacoq.

المصادر

- Précis d'antibiothérapie pratique 1998-1999.
- Maladies infectieuses édition 1997.
- Maladies infectieuses édition 2000.
- Maladies infectieuses édition 2003.
- Antibiotiques Antibiothérapie "Bristol – Myers Squibb" infectiologie.
- Le POPI 2003.
- Le POPI 2001.
- المعجم الطبي الموحد.



الدار العربية للعلوم - ناشرون
Arab Scientific Publishers, Inc.

يشكل هذا الكتاب الدليل الأمثل للتشخيص السريع للأمراض الانتانية، ومن ثم الوصف الأفضل للمضاد الحيوي الأكثر فعالية والأقل كلفة. إنه موجّه للأطباء جميعاً ولطلاب الطب، لمساعدتهم على التفاعل السريع في وجه هذه الأمراض.

مصادره معروفة جداً في فرنسا، وكانت قد ساهمت إلى حد بعيد في تطوير التفكير الطبي وتحديثه.

إنه كتاب شامل لكل الأمراض الانتانية، وفي الوقت نفسه مختصر عملي ومرتب بشكل يساعد على القراءة السريعة، الفهم الجيد واتخاذ الخطوات المناسبة أمام سرير المريض.

- الجزء الأول: الانتانات حسب توّضعها
- الجزء الثاني: الانتانات حسب مسببها
- الجزء الثالث: الانتانات وبعض الحالات الخاصة
- الجزء الرابع: المضادات الانتانية



www.neelwafurat.com
لنكتب كودى - عربى - فارسى

9"789953"293956"

جميع كتبنا متوفرة على
شبكة الإنترنت

نييل وفورات. كوم
www.neelwafurat.com

الدار العربية للعلوم - ناشرون
Arab Scientific Publishers, Inc.
www.asp.com.lb

ص.ب. 13-5574 شوران 1102-2050 بيروت - لبنان
هاتف 9611-785107/8 فاكس: 9611-786230
البريد الإلكتروني: asp@asp.com.lb

توزيع

